




P III. 74
2

IX. VII. 1.







IOANNIS A TVRRE
MEDICI. AC PHILOSOPHI
RIPALTENSIS
DE SANGVINIS OFFICINA.
MOTV. AC VSV
LIBRI TRES.

In quibus celebres
RECENTIORVM AVCTORVM

OPINIONES

De Sanguificationis loco, de Circulatione Sanguinis,
de Fætus, Seminis, Lactisq; genesi, ac de nonnullis
alijs cohærentibus ventilantur, & oppugnan-
tur, vt ad VETERVM tandem placita
cuncta dicta pro posse reducantur.



MEDIOLANI,

Ex Typographia Philippi Ghisulphij. MDC LXVI
SUPERIORVM PERMISSV.

IOANNIS A TVRE

MEDICI. AC PHILOSOPHI

RIPALTIENSIS

DE SANGVINIS OFFICINA

MOTV. AC VSV

LIBRI TER.

IMPRIMATUR

F. Io. Dominicus de Cremona Sac. Theol. Magister, ac Commissa-

rius S. Officii Mediolani. RECENTIORVM

Carolus Ghioldus Theol. S. Nazarii pro Emnen.^{mo}, & Reuer.^{mo}

D. D. Cardinalis Litta Archiepiscopo

Franciscus Arbona præ Excellentissimo Senato

De sanguinis I. officio, generis, ac de nouis

alijs cohercendis veniuntur & quidam

que ad VETERVM tandem

cructa dicta pro posteritatem



MEDIOLANI
IN THEATRO S. MARCI
SALVATORVM

FERDINANDO CAROLO

MANTVÆ, MONTISFERRATI &c.

DVCIS SERENISSIMO:

IOANNES A TVRRE

MEDICVS, AC PHYLOSOPHVS

S. P. D.



Nter ceteras generosorum Principum magnanimitates SER.^{ms} DVX, non infimū habet locum ea, quæ humillimæ gratitudinis, & deuotionis insignia non despicies, hilari vultu Seruulorum, quamuis minimā, munera suscipit, & lætis vlnis amplexatur. Hanc cum apprimē scitam in magnanimo CAROLI SECVNDI Genitoris tui spiritu nobilissimam tenere sedem, itaut literatorum omnium cætus Illum. strenuum sui Propugnatorem, ac Euectorem suspiceret; trepidantem id fiduciam, & contremiscentem anhelationem meā adeo sustinuerat, ac firmarat, vt, omni sprete hæsitatione, timiditateq; hanc exiguum grati, ac deuouentis animi mei sæturam ad Ser.^{ms} pedes suos deponere decreuerim. Duplex ad hoc me causa impulerat; naturalis vna, gratiosa altera. Ea me subditum, hæc deuinctissimum effecerat. Natus enim, educatus, moratusq; Ripaltę Montisferrati, non alium Supremum in Orbe Dominum,

4
quàm CAROLVM ab incunabulis agnoueram.
Benignissimo dono, nullisq; præmissis meritis, inter
Sue Celsitudinis Curiales peculiari privilegio adscri-
ptus, Ipsum solum inter Heroes beneficum experie-
bar. Quare, cum ad tollendas e Medicina præiudi-
cialissimas humano generi nouitates, Opus de San-
guinis officina, motu, & visu construxerim, cuiam
alteri, & subdititiæ oblationis, & gratitudinis ergo,
illud offerre, donare, dicare rationabilius deberem?
Debillimum Opus, exiguum munus: At uerò, si sub
Augusto CAROLI nomine in lucem prodiret, ma-
ximum futurum. Sed verò, dum prælo tradi festi-
naret,

Mors æquo pulsans pede pauperum tabernas,

Regumq; turre

benignissimum Orbi iubar eripuit. Cuius ergo sub
auspicijs dignius tandem exeat in lucem Opus, quàm
sub FERDINANDI CAROLI tam præclari geni-
toris germinis inconcussi, Hæredis dignissimi, Suc-
cessoris indubij?

Suscipe igitur, benignissime PRINCEPS, hanc,
quantulacunque sit, memoris, deuotæq; voluntatis
meæ significationis Ideam, eamq; sic excipe, ut quis-
quis contra eam inuidus, aut æmulus blatterare,
quouis tempore audeat, miro coruscantis protectio-
nis tuæ splendore cæcutiens, & admiretur, & obmu-
tescat. Interim verò, DEVM OPTIMVM MA-
XIMVM, ut te per sæcula Populis tuis sospitem con-
feruet, humiliter deprecans, Amplitudinem tuam
summè reuereor. Ripaltæ &c.

Index Capitem primi Libri.

- Cap. I. **Q**uod Iecur fit officina sanguinis, probatur ex Galeno. pag. 4
 Cap. II. Probatur vterius, Cordi non incumbere onus sanguinem
 ex chylo gignendi, sed Iecori. 18
 Cap. III. Soluuntur rationes contrariæ Aristotelis, & Is cum Galeno quo-
 dam modo conciliatur. 24
 Cap. IV. Quænam sit Iohannis Pecqueti de Sanguinis officina rece-
 opinio. 28
 Cap. V. Quænam inde de eiusdem succi officina fuerit Thomæ Bartho-
 lini sententia; Eiusq; lepidæ ad Iecur exequiæ. 31
 Cap. VI. Observationes aliquot circa dictorum Opinantium dicta. 32
 Cap. VII. Quæ de Lacteis, earum succo, & vsu fuerit Ludouici Bilsij celebris
 Anatomici sententia. 36
 Cap. VIII. Et si dentur venæ lacteæ, ac Pecqueti Receptaculum, chylus
 tamen ad Iecur, non ad Cor migrat. 40
 Cap. IX. Lacteas venas, chylinè receptantes glandulas Veteribus quodam-
 modò innouisse, monstratur. 43
 Cap. X. Chyli per thoracicum tubulum traductionem, nulli ex aduerso
 suppositis vsibus inferuire posse, probatur. 48
 Cap. XI. Quod nullo modo illac fiat chyli traductio, inductione probatur;
 Et primò non per impulsione. 54
 Cap. XII. Chyli introductio in Lacteam thoracicam, neque attractione sit
 naturaliter. 59
 Cap. XIII. Chylus in totum per thoracicum tubulum ire non potest: Dato
 autem, quod pro parte multa absurda sequentur. 61
 Cap. XIV. Quis vsus dicto Receptaculo fuerit à Veteribus attributus; quæ
 circa ipsum sit opinio Auctoris; quidquæ sit lacteus succus in
 eo contentus. 64
 Cap. XV. Quid de lacteis tùm mesentericis, tùm thoracicis, deque earum
 lacteo succo sit tenendum. 66
 Cap. XVI. Tolluntur contrariæ obiectiones multæ. 70
 Cap. XVII. Respondetur ad experimenta contraria. 71
 Cap. XVIII. Adducitur Excellentissimi Torrini nuperrimum experimentum,
 & in propriæ sententiæ confirmationem trahitur. 77
 Cap. XIX. Tolluntur Bartholini oppositiones de Lactearum succo. 80
 Cap. XX. Quæ à dictis Auctoribus contra Galeni rationes pro Hepatis san-
 guifici ministerio opponuntur, & eorum solutio. 85
 Cap. XXI. Quicquid contra Veterum auctoritates dicunt, impugnatur, &
 ad bilem secernendam Iecur non esse dictatum, conuincitur. 88
 Cap. XXII. Examinantur officia à Pecqueto, & sequacibus Iecori attributa,
 & respuuntur. 92
 Cap. XXIII. Reiconclusio, & pro Iecore reuiuifcente Carmen. 94

Index Capitum secundi Libri.

Cap. I.	Circulationem sanguinis, si detur, qualis, & quantacunque sit, non obesse Veterum de eiusdem officina opinioni, nec novam fulcire demonstratur.	99
Cap. II.	Contrariæ rationes pro Circulationis velocitate probanda allatæ dissoluntur.	105
Cap. III.	Adducuntur quædam, quæ admittendæ Circulationi obstant plurimum, & à contrarijs solutionibus vindicantur.	108
Cap. IV.	Ostenditur causam dicti circulatorij motus insufficiantiam, & Harveiani pro eo dispositi modi incongruitas.	117
Cap. V.	Aliæ circulationi admittendæ oppositiones fiunt, & earum solutiones adductæ superantur.	125
Cap. VI.	Adduntur aliæ obiectiones ad dictam Circulationem elidendam, & adductæ responsiones refelluntur.	129
Cap. VII.	Probatum ulterius, non dari sanguinis circulationem.	137
Cap. VIII.	Sanguinem non ad Cor solum, sed & ad membra omnia naturaliter migrare per venas, probatur ex phlebotomia.	141
Cap. IX.	Sanguinem à maioribus venis ad minores, minimas, & extra naturaliter ire, à spontinis excretionibus, & à partium alitione arguitur.	146
Cap. X.	Per arterias etiam sanguinem versus Cor naturaliter moveri, ostenditur.	152
Cap. XI.	Adducuntur præcipuæ rationes Harveiani dogmatis.	155
Cap. XII.	Prima Harveiana ratio dissolvitur.	158
Cap. XIII.	Secunda Harveiana dissolvitur ratio.	165
Cap. XIV.	Tertia Harveiana ratio solvitur.	170
Cap. XV.	Solvitur quarta ratio Harveiana.	173
Cap. XVI.	Aliæ duæ probationes diluuntur, & ad oppositas auctoritates respondetur.	178
Cap. XVII.	Quod non sola contractio, Sed & distensio in pulsu sit Cordis, & arteriarum actio, probatur.	181
Cap. XVIII.	Quod eodem prorsus modo, ac tempore pulsant arteriæ, quod Cor.	189
Cap. XIX.	Quod non ob sanguinis à Corde factam propulsionem dilatentur arteriæ pulsantes.	195
Cap. XX.	Quod idem sit tum pulsus, tum respirationis usus, & is non ad sanguinem circulariter vehendum.	200
Cap. XXI.	Impugnatur Galtruchij de sanguinis circulatione sententia, & ad omnes eius rationes respondetur.	205
Cap. XXII.	Quædam sibi ex ab eodem Galtruchio factæ, & inde solutæ obiectiones refirmantur.	210

Index Capitulorum tertij Libri.

- Cap. I. **I** Nucentæ Lactææ nec veterem de lacte opinionem atterunt, nec nouam elucidant magis : lac enim in mammis, & ex sanguine, non è chylo gignitur. 219
- Cap. II. Multæ contra offeruntur Neotericorum pro chylo pugnantium rationes, obiectiones suæ, & soluuntur singulæ. 227
- Cap. III. Fætus in vtero non chylo, sed sanguine nutritur : frustra ergo putatur Lactearum inuentum quicquam conferre ad huiusmodi nouam opinionem firmandam. 236
- Cap. IV. Fætum chylo non enutrirî probatur. 239
- Cap. V. Obiectiones pro Deusingio, ac alijs contra prima superiora argumenta factæ perimuntur. 242
- Cap. VI. Obiectiones contra secundas superiores rationes, chylum excludentes factæ, vel factu faciles soluuntur. 247
- Cap. VII. Afferuntur pro fætus enutritione lactea tùm Deusingij, tùm sequacium argumenta. 250
- Cap. VIII. Soluuntur omnia supra allata Partis argumenta. 252
- Cap. IX. Tot exempla Neotericorum, à brutis sumpta, non valere in hominis vterino alimento statuendo, monstratur. 260
- Cap. X. In fætus conceptu cum semine non chylum, sed sanguinem requiri, probatur vterius. 266
- Cap. XI. Semen ex puriori sanguinis substantia, non è chylo fieri, probatur. 270
- Cap. XII. Proponuntur contrariæ ad id pro chylo facientes rationes, & diluuntur. 277
- Cap. XIII. Aliæ adducuntur rationes pro chylo facientes, & dissoluuntur. 281
- Cap. XIV. Num è sanguine alantur omnia corporis membra, disceptatur, & pro affirmatiua arguitur. 285
- Cap. XV. Contrariæ Pallierij rationes afferuntur. 289
- Cap. XVI. Vnicum succum ad totum corpus alendum, non plures requiri, probatur, & ad rationes supra positas respondetur. 291
- Ca. XVII. Non malè, imò melius per vetera, quàm per noua dogmata, multa enucleantur Naturæ ænigmata. 296

FINIS.

Index Capitulum

Cap. I.	De iurisdictione	215
Cap. II.	De iurisdictione	215
Cap. III.	De iurisdictione	215
Cap. IV.	De iurisdictione	215
Cap. V.	De iurisdictione	215
Cap. VI.	De iurisdictione	215
Cap. VII.	De iurisdictione	215
Cap. VIII.	De iurisdictione	215
Cap. IX.	De iurisdictione	215
Cap. X.	De iurisdictione	215
Cap. XI.	De iurisdictione	215
Cap. XII.	De iurisdictione	215
Cap. XIII.	De iurisdictione	215
Cap. XIV.	De iurisdictione	215
Cap. XV.	De iurisdictione	215
Cap. XVI.	De iurisdictione	215
Cap. XVII.	De iurisdictione	215
Cap. XVIII.	De iurisdictione	215
Cap. XIX.	De iurisdictione	215
Cap. XX.	De iurisdictione	215
Cap. XXI.	De iurisdictione	215
Cap. XXII.	De iurisdictione	215
Cap. XXIII.	De iurisdictione	215
Cap. XXIV.	De iurisdictione	215
Cap. XXV.	De iurisdictione	215
Cap. XXVI.	De iurisdictione	215
Cap. XXVII.	De iurisdictione	215
Cap. XXVIII.	De iurisdictione	215
Cap. XXIX.	De iurisdictione	215
Cap. XXX.	De iurisdictione	215



AD LECTOREM.

PRÆFATIO.



Quantum cuius Reipublicæ præiudicij afferat sanctionum nouitas, veterumq; immutatio legum, neminem, credo, sanæ mentis Virum vspiciam latet: Ex ijs enim sicuti inuenerat & gula pefundantur; ita & grauatur regimen, & totus rerum confunditur Ordo: hoc autem attrito, & omnis tollitur quies, & nullus non diffensionibus, ciuilibusquæ iurgijs datur aditus.

Idem dic de qualibet ritè disposita Arte: in eam enim quidquid noui inuehitur, ut quod vetera, simulquæ imbibita præcepta subsanat; sic optatam concordiam destruit, ordinem confundit, & controuersijs sat aptam viam consternit. Quod quidem, si in omnibus damnandum, potissimum in Medicina, vel detestandum, vel potius amare stendum est: cum nil eam perturbare sit potis, quin, & Orbis saluti pessima damna ferat: Si namque, ut iam Musa cecinit.

Eripit interdum, modò dat Medicina salutem; quid de lacera, quid de tricis inuoluta sperandum?

Sed enim quibusdam genijs adeò naturale est, noua semper appetere, veteraque fastidire omnia.

(Est nam cunctarum nouitas gratissima rerum.)

ut nil non incensatum relinquat, quò se singulares, & ab omnibus deos commonstrent: In quo tamen quibusque strenuis Artis Professoribus competit, omnes intendere nervos, ut huiusmodi zizania euellant, & tot nouitatum Authores carpant, eorumquæ damnosa inuenta, antequàm altius radices impingant, extirpare conentur.

Cum ergo mihi inuiscere contigerit quendam Libellum ab Excellentissimo Physico Ioanne Alcidio Genna editum, in quo duorum Authorum, nempe Ioannis Pecqueti, & Thomæ Bartholini Anatomicorum illustrum quædam opuscula de Venis Lacteis Thoracicis, deque Vasis Lymphaticis continentur;

in *his* conspexi, *hosee*, alioquin celeberrimos *Viros*, dictis nuper compertis ductibus, sanguificationis munus humano Hepati (: quod tamen iam per bis octo sacula à Medicis omnibus obtinuerat) omnino eripere, Cordiq; dicare; ex quo plurima, ad praxim pertinentia, immutari, & confundi, necesse est: Non potui igitur me continere, quin statim, arrepto calamo, totis viribus tantum paradoxum impugnare, & proscribere tentarem. Eoque magis ad hoc me accingere decreui, quod huiusmodi inuenti nescius, in quibusdam iam ante editis scriptis meis tanquam infallibile, & in Medica Arte concessum posueram, Iecur venarum esse principium; in eo sanguinem procreari; ab coque in omnes nutriendas abire partes, prout in Hippocratis, Galeni, Antecne, cæterorumq; Medicinæ Principum scriptis inuenitur clarissimis notis expressum.

Nunc omnia retrorsum videntur insedgere. Iecur bili deditum, vel cruoris inane colatorium ponitur. Sed non hæc nouitatum summa est; isosmet enim Pecquetum, & Bartholinum pro suo magis sulciendo inuento, latè subscribere, inueni, circulationi sanguinis, ab Arueio Anglo Medico celeberrimo in Medicum theatrum introductæ. Scilicet hic acutissimus Naturæ scrutator, cum Hominem Microcosmum à Philosopho dictum perspexerit, non mediocrem illi laudem, sibiq; gloriam parare meditatus, si Calicem, qui solus in eo deesse videbatur, circularem, ac perpetuum motum conscriberet; magno cum sua fame incremento, hunc ad hucusque feliciter in principio corporis succo descripsit, sicque ingeniosè, & ad viuam rem resecauit, vt plurimos habuerit, & adhuc habeat acclamatores non paucos: Hac tamen speciosa adinventionem permixta, mirum, quot coronatæ Theses elabatur, quot succulenta dogmata, quod antiquissima documenta profigentur: Nec enim hic Nonatorum cæterorum pes sistitur; sed, his nuperis traditionibus acceptatis, plurima ad Theoricam Medicinæ partem spectantia argumenta peruertuntur. Neque inconsultè hoc factum, vel sit adhuc: Libertas quippè sicuti corporis ita & ingenij non à paucis expetitur eò, vt, Veterum sibijs abdicatis, possis quis in omnibus elabi innocuè, & labor exentiatur, & labendi facilitas cuedat in Artē.

Præterea exordia lachrymabiles sæpè fines pepererunt. Latet sic forsā anguis in herba. Videbitur paulatim, in quem exitum sint tot nouitates casura. Ad Theoricam nunc istius dirigitur: sed quidnè tandem vertetur in Praxim? vt enim domus præter spem ruat, clauellum fundamenta truduntur. Purgatio, & phlebotomia omnium remediorum (diata excepta) præcipua sunt. In *his* ritè administrandis summum artificium, & prudentia summa exquiruntur; in hisq; omnis serè Medici, vel honoris, vel dedecoris alea consistit. Lapsus autem in his multi circa locum, tempus, quantitatē, & electionem, quos effugere (dimittendo) vel aduenientes tegere, sub speciosorum velorum vmbra non displicet interdum.

Es verò, sich wo aliter fetus, si non ex sanguine semen, lac. & nutritio consistunt, qui pro his phlebotomia timeatur? Si ab arterijs omnes expulsi-

siones adueniunt, si venarum solum opus reductio ad Cor est, quod vena scissa, quid scissionis locus conferet, quid purgantis electio inuabit? Si sanguis circulator, & ad Cor toties redit, quò pulsus (qui virium summa est) Æconomia seruetur, quid aliud Medicina intendet, quàm, ceteris post habitis, naturalem hunc seruare, iuuare, suscitare, vel frænare motum? Si ad coctionem iecur non facit, nec ad depurationem lien, renes; totaq; res in arterias descendent, & Cor demandans voluitur; cur nos de alio solliciti, quàm de Corde?

Huc ergo, quæso, accurrant singuli Artis Euectores, & omnium bene librato pondere, euigilent ad incrementa sophismatum. Ruginenti flamma antequàm omnia succendas, non solum, sed amphoram, non aerem, sed aquam opponant. Fateor, in hano metam iam alios celebres insudasse Viros; eaq; non leniter attriuisse paradoxa: sed quoniam iterum atque iterum. Alij insurrexerunt illorum propugnatores, qui ingenij salsitate pollentes, orienti dant oscula Soli (quis enim nonis non alliciat, si pulebra?) ideo non indecens, nec inutile futurum putavi, hanc nonijet Arcem metiri, ut, vel ipsam forsas validius repetitis, vel alijs additis, vel contrariorum nouis iaculis repulsatis, nona machinamenta cadant, vetera solidentur.

Singulis autem occurrere, mihi occupatissimo, & imbecillimo non datur: plura tamen, & potiora percurrat, nec veritati, quantum in omnibus per melicuerit, nunquam deero; quò intra huius limites coercita Iuniorum ingenia, quæ vera sunt, essi vetera, non dedignentur. In tres igitur Libros opus hoc meum diuisum est; in quorum primo Iecur venosi, alimentosiq; sanguinis officinam esse, ut Medicorum hucusque placita voluere, multis probatur rationibus, exinde solutis oppositis argumentis; non obstantibus Vasis lacteis à Pæquetto, ac lymphaticis à Bartholino inuentis; quæ data etiam, primam non urgere, nec infringere opinionem, commonstrantur. In secundo multa contra Harueianam sanguinis circulationem aguntur obiecta, elucidantur obscura, & eius Valla diruuntur. In tertio autem circa sanguinis usum introductæ nobilitates, quoad licet, extirpantur, dum de lactis generatione, ac materia plura dubia enodantur; de fatiis conceptu, ac alitione; de semine; de solidarum partium nutritione; deque alijs scitu dignissimis rebus pertrahatur; Ut in omnibus antiqua firmatur veritas, Arsq; in suo pristino nitore structur.

Tu ergo, benignissime Lector, si in hunc meum sortè incidas laborem, ne statim illum abijcias, tamquam infirmi Auctoris: sed ad rem ipsam medullitus intendens, perlegere ne dedigneris: sic enim vel in eo acquiescens, recentiores illas sententias condemnabis, vel saltem ad meliora contra ipsasmet iacula forsas incitaberis. Vtrumque mihi gratum, Arti honestum, tibiq; non inutile cadet.

Ne expectes autem à me eos dicende lepores, eas styli elegantias, easq; grammaticales titillationes, quibus supradictorum Auctorum, Neotericorumq; libri undique sunt referti: Non enim in ijs proferendis, sed in vera euulcando, scopum præfixi meum, eius dicti non injicias.

„ Quæ pura sunt, nuda videri amant ;

„ Mos est fæda coloribus abdere :

„ Vix vlla est sine suspitione delinitio :

Pusillum Opus est : æst

„ Et paruis quoque rebus inest sua sæpè voluptas .

Interim vero, Turris non immemor, vale : Ripalta Montisferrati &c.





LIBER PRIMVS,

IN QVO

DE SANGVINIS OFFICINA,

DEQVE AD EAM CHYLI MOTV

DISSERITVR,

ET

OBIECTIONES DISSIPANTVR.

CAPVT PRIMVM.

Quod Iecur sit officina sanguinis, ex Galeno probatur.



NEmini, opinor, non innotescit, si quid circa sanguinis officinam fluctuationis adhuc in Medicorum scholis adsit, consistere in reciprocis tum Cordis, tum Iecoris fautorum, qui passim, & per varia tempora insurrexere, mox intermissis, mox effervescentibus ludis: Quamvis enim visus fuerit aliquando Plato in hoc munus aduocare venas, nec sine aliquo Galeni consensu; id tamen non de specifica, veraq; sanguinis generatione, quæ ab omnibus, & à Platone ipso, non in vasis, sed in visceribus libenter reponebatur, intelligendum fuerat: sed de quadam vltiori sanguinis coctione, ac perfectione, addita, vt puto, non à tunicis tantum venarum (virtute ipsis à Iecore præstita); sed ab ipsomet etiam in ijs præexistente sanguine, qui si non aliud, sui saltem

*Quæ sanguinis
factio venis
competit.*

Lienis signi-
ficationem
comperere
negatur.

tem miscella, in sibi similem naturam nouum accedentem sanguinem vltro disponit. Tum, & quicquid de liene aliqui Neotericorum commenti sunt pro imperfecta quadam sanguificatione cuiusdam chyli portionis ab ipso attrahi, & auctoritate vacat, & ratione. Auctoritate quidem, quoniam nullus Veterum illi tale munus attribuerit: nunquam enim (vt alios reticeam) dixit Galenus, a liene sanguinem procreari, sed bene ab eo limosorem, & crassiorem sanguinis portionem ex hepate allici, vt, illius seiunctione facta, reliquus purior maneat sanguis, & peculiari illiusmet continuata coctione, aliquid purioris succi pro suimet propria alitione aliciatur; ad quod multum facere arterias, quæ ei copiosæ à Natura tributæ sunt, docet idem 4. de vsu part. cap. 15. Ratione autem: quia Natura vnicuique actioni principem aliquam partem in corpore dicauit; quæ si bina aliquando fuerit constructa, eiusdem prorsus substantiæ, naturæ, ac qualitatis vtrique, & in vtroque latere visitur, vt videre est in renibus, oculis, auribus, naribus &c.: lienis autem substantia, natura, qualitas, quantum colore, sapore crassitie, densitate, duritie, & formatione ab hepate dissent, vnicuique constat.

Nûm à iecoris carne, aut ab ipsius venulis gignatur sanguis contouertitur, & ab vtroque citatur Auct.

Parum tamē hoc pro Artis exercitatione refert.

Iecoris officium, sanguinis, ac chyli.

Alternæ fuere duorum illorum viscerum, cordis nempe, & iecoris victoriæ, viquequæ; Galeni accedente facundia, & Anatomica peritia eiusdem, facile ei fuit in suamet opinionem cunctos adducere sequaces; Vtpotē qui palpabili probatione, & congruentijs ad vnguem secundantibus, non deserta interim Cordis dignitate circa sanguine portionis perfectionem, elaborationem, Hepati vniuersum condendi sanguinis venosi negotium cooptauit. Et quamuis non deerint, qui intimius rem disquirentes, controuerferint, nûm à parenchimate, seu carne ipsius, nûm verò à venulis eiusdem, sanguis perficiatur, Alijs pro illo tenentibus, vt fecit Vesalius lib. 5. de corp. hum. fabr. cap. 7. Christophorus à Vega de Art. meden. cap. 2. & 5., Io. Baptista Cortesius Miscellan. medic. decad. 9. Epist. 5. (qui verè cū Galeni mente 4. de vsu part. 12., & alibi passim expressa, concurrunt): Alijs autē pro his, vt Iacobus Scheechius lib. de prim. instrum. sanguificat. Laurentius Iouertus decad. pri. parad. 4. Picothominius lib. 2. lect. 17. Attamen hoc parū pro Artis exercitatione refert, cui sufficit organum actionis investigare, de primaria simplici particula parū alioqui sollicitæ, cum hoc indubitatum sit, quicquid in parte illa organica vitatur, actionem quoque ipsam plus minusuē vitari: maxime quando, qui à parte venularum sunt, opem primariam eis a carne impartiri existimant; itaut hæc disceptatio tota, ferè dependeat ab illius articuli decisione, de Portæ, Surculorum, cum Cauæ Surculis coitu, vel separatione, qui etiamnum videtur anceps.

Proprium igitur iecori à Medicis attributum officium, etsi nunc iterum in controuersiam reduci tentetur, illud est, vt chylum ad se per venarum Surculos, qui in Portæ venam inferuntur, vel ipsius immediata sunt germina, attractum, in sanguinem probum pro suo alimento commutet:

Alterum

Alterum verò, ei aliorum gratia concessum, est, vt sibi superfluum sanguinem in totum corpus per suos canales, venas scilicet, distribuât, suorumque narium calore ventriculū foueat. Diceretur autem non male alterum hoc opus accidentale quoad ipsum: quia, cum lecur rationis sit expers, ac solummodò à naturalibus suis potentijis ducatur, nil aliud, quàm seipsum nutrire reuera contendit; accidit autem, vt alimentum sibi, ob principem vim fecundè agentis, superfluat multum, à quo & ventriculi calor fouetur, & quod inde à se pellitur, cæteræ partes attrahunt, & in locum dissolutæ substantiæ sibi reponunt; Quod quidem à gubernante Natura sic seriò dispositum est, vt alterum alteri membrum, quamuis inscium, elaborer, simul communicent omnia, & inuicem foueantur; quemadmodum, & de ventriculo, Corde, cerebro, ac alijs particulis, quæ pro toto, vel pro reparanda Specie laborant, fieri, supponendum; vt perbellè de ventre, & iecore idem docet *Gal. lib. 6. de placit. Hipp. & Plat. cap. 8.* Sed quoniam delicatioribus auribus quoddam hoc videretur paradoxum, age, & proprium absque illo adiecto hoc quoque munus Iecoris dicatur: quippè, cum duplex accidens sit, separabile, & inseparabile, si de ultimo habeatur sermo, nil differt, siuè proprium, siuè inseparabiliter contingens munus hoc Iecoris dicatur. Si ergo quæsierit quis, quodnam membrum in homine sanguini procreando dicatur propriè à Natura extet, liberè respondere licet, hepar esse, non Cor, à quo solus arteriacus, spirituosusque gignitur cruor.

Alterum alteri membrum quamuis inscium elaborat.

Si quid procreando Iecore dicatur non Cor.

Huius dogmatis rationes multas toto superius citato libro cumulat Galenus, desumptas à similitudine plantarum viuientium, à iecoris figura, colore, substantia; à vasis tum proprijs, tum ab eo verè emanantibus; & ab adiacentibus recrementorū expurgatorijs; Quæ adeo clare sunt, vt ferè demonstrationem pariant, & propterea Auerroes, *postquam lib. 3. de part. ani. cap. 4.* in commento Aristotelis, & Galeni sententias ritè examinauit, eosque conciliare circa sanguinis generandi locum conatus est, postmodum apertissimè concludat, hepar ex chylò primò sanguinem generare; Cuius verba sunt hæc: Et dicamus, lecur vniuersaliter habere iuuamentum necessarium corporibus animalium sanguineorum: quia est instrumentum generatiuum sanguinis venarum: Sed, cum sanguis sit necessarius ad esse animalium nutrimenti gratia, atque augmenti; ideo hoc membrum est necessarium pro esse animalium; quod ostenditur, quia est primum membrum, quod primò conuertit chylum in sanguinem.) & Vesallius, licet luxuria carpendi Galenum laboraret, licetq; de venarum origine steterit anceps, hoc tamen pro indubitato concessit, sanguinem gigni in hepate, ab eoque in Cor pertransire, vt in *supracitato lib. 5. cap. 7.* legitur. Siquidem.

Sicuti tenemus, eo loco esse arboris alendæ principium, vbi, iactò semine, videmus, ad auras germinari truncum, qui in varios ramos eò vsque

Primo Galenatio à plantarum similitudine.

que

que scienditur, vt in minima cacumina deueniatur; in terram autem varias radicum soboles profundari; ita in corpore nostro ibi principium nutritionis existimandum est esse, vbi radicationes venarum velus abdomen, quod, vt ait Hipp. lib. de hum. 4. & Arist. lib. 2. de part. ani. cap. 3, in animatis terræ vicem gerit (in eo enim sit prima alimenti concoctio, & præparatio succi, qui peruenulas sugitur) emanant; & vnde truncus magnæ venæ incipit, qui postmodum adeo ramificatur, vt in exillimas omnium extremarum, & externarum partium venulas tandem exoluatur. Sic est de hepate: nam ab ipso prodit vena Portæ, à qua innumera bilis progerminationum, hiantiumq; riuulorum soboles in ventriculum, & intestina (quasi quædam radicatio) implantatur; Ac indidem exit Cauæ truncus, partim superius, per Cordis dexteram transiens, ad membra omnia, vsque ad minima distributus, partim inferius ad omnes etiam minimas extremitates miro ramificationum implexu deriuatus.

Vasorum venalium à lecore progerminatio.

[Cor nullam venalem radicationem implantauit propriam (cum nec lien, nec ventriculus, nec intestina, nec mesenterium venas sanguiferas, quæ cordi propriè communicant, nanciscantur); nec ab eo ad omnes ideò partes per venales ductus distribuitur sanguis. Circa quod aduertendum est, venam Cauam, vbi in Iecoris gibbam implantatur, in minores, ac minimas venulas ibidem finiri, & obliterari; sicuti etiam accidit venæ Portæ in concauam intromissæ partem. Quæ venulæ an inter se coeant, ac inferantur, itaut sanguis ab hac in alteram venam commigrare, citra intermedium substantiæ Iecoris penetrandæ, liberè possit, vel non, valde dubium est: nam, etsi Vesallius ponat tanquam clarum, dictas venas per sua oscula simul communicare: attamen & ante ipsum Galenus, & post eum Curtius, Faloppiusq, qualibet adhibita diligentia, apertè testantur, huiusmodi vnionem, seu connexionem se nunquam potuisse discernere; sicuti, & Bartholinus, cum Siegelio, quauis pariter addita in bubulo hepate cura, idem fatentur.]

An Portæ, & Cauæ capillamenta inter se coeant, valde dubium est.

Quod de Corde dici non potest; id enim in abdomen nullam venalem radicationem implantauit propriam (cum nec lien, nec ventriculus, nec intestina, nec mesenterium venas sanguiferas, quæ cordi propriè communicant, nanciscantur); nec ab eo ad omnes ideò partes per venales ductus distribuitur sanguis. Circa quod aduertendum est, venam Cauam, vbi in Iecoris gibbam implantatur, in minores, ac minimas venulas ibidem finiri, & obliterari; sicuti etiam accidit venæ Portæ in concauam intromissæ partem. Quæ venulæ an inter se coeant, ac inferantur, itaut sanguis ab hac in alteram venam commigrare, citra intermedium substantiæ Iecoris penetrandæ, liberè possit, vel non, valde dubium est: nam, etsi Vesallius ponat tanquam clarum, dictas venas per sua oscula simul communicare: attamen & ante ipsum Galenus, & post eum Curtius, Faloppiusq, qualibet adhibita diligentia, apertè testantur, huiusmodi vnionem, seu connexionem se nunquam potuisse discernere; sicuti, & Bartholinus, cum Siegelio, quauis pariter addita in bubulo hepate cura, idem fatentur.

Ratio secundæ à figura, & cõformatione partis.

Figura quoque, ac conformatio Hepatis non paruum est huiusmodi veritatis argumentum: nam cum in formas varias iuxta partium contiguarum commoditatem diuidatur, & veluti quadam manu dextram ventriculi foveat, infinitasq; ac inuolutas venularum cauernulas in se contineat, non potest non dici, in ipso chylum oberrare, ex quo eius in sanguinem conuersio contingit. Cordi autem vnica forma oualis, in ferè acutum desinens, data est; & cum duplici solum ventriculo præditum sit, in suumq; corpus venulas paucissimas admittat, quatuor autem ostijs satis patentibus peruium vndique reddatur; illud potiùs ad transitum sanguini præbendum, quàm ad coquendum, & gignendum ipsum, aptum natum esse, dicendum est.

Ratio tertiæ à colore, & substantia partis.

Color etiam Iecoris, & substantia, quæ sanguini cocto, aut concreto simillima est, videtur, quod aliter esse non posse, commonstret: nam vnaqueque

vnacque pars in sui similitudinem concoctos à fe humores transfert ; unde videmus ; à ventriculo chylum dealbari ; a mammarum glandulis lacteis sanguinem in lac conuerti (vt in tertio sustinebitur Libro) , a feminalibus testibus semini fieri , a pingui corpore oleosum , seu pinguem generari succum : Ergo , cum nulla pars in homine sanguini similior sit iecore , iure dicimus , ab ipso iecore propriè sanguinem generari . Cor e contra , nec sic purpureum , sed pallidum magis ; nec molle , sed durum densumq ; nec intus sanguineum , sed membraneum , neruiq ; sibi pluri- mis præditum , neque chylum imbibere , neque sanguinis formam ipsi tribuere poterit .

Vasa item eandem sententiam comprobant : Nam à iecore derivari venas , testantur *Hippocrates lib. de alim. nam. 7. qui etiam 2. Epid. 1. Canam* vocat hepatidem , seu iecorariam nominat , *Galenus tñm cit. lib. 6. de placit. Hipp. & Plat. cap. 5. tñm lib. 4. de usu part. cap. 12. & 13. Auic. can. 1. sen. 1. doct. 5. cap. 3. ; & post eos Vallesius , Faloppius , (qui de hoc peculiarem disputationem contra Aristotelicos instituisse , fatetur lib. de anatom. obser. pag. 114.) Andreas Laurentius lib. 4. quest. 1. exercit. 6. Hieron. Capiuacius de meth. anatom. cap. 16. ; aliq ; Anatomei plures . Nec enim Vesallius , etsi plura pro Aristotele contra Galenum agat circa Cauæ capacitatem ; & alia ad hoc argumentum spectantia ; contrarium desinire audet . Sed & Bartholinus ipse *Anatom. reform. libello pri. de venis cap. 1. hanc contra Aristot. disertè sustinet positionem . Idem testatur ipsarum venarum natura quæ quæta manet , vt iecur nec pulsatiue mouetur , vt Cor ; & ab eo manantes arteriæ ; vt autem ait Poeta .**

Sic canibus catuli similes , sic matribus hedi .

Testatur earum substantia arterijs longe mollior , subtilior , simplicior , & ratiore , quæ cum iecoris , eiusq ; vasorum mollitie , subtilitate , simplicitate ; & raritate magis confert , quàm cum Cordis , eiusq ; arteriarum appendicium duritie , crassitie , compositione , & densitate . Testatur denique modus deriuationis , ac insertionis ipsarum in distamet viscera : nam si Portæ venam inspicias , ab infinitis , vt sic dicam , venularum concauæ iecorariæ regionis riuiulis in magnum Caudicem , qui postea per alios suos ramulos mille ferè canaliculos , tamquàm radices , naturales in partes omnes insinuat , eam efformari conspicias : Si Cauam consideres , ipsam etiam ex plurimis iecorariæ gibbæ venulis in Truncum , qui deinde per totum corpus suprà infraq ; copiosissima sua germina , in formam radicatæ , & ramulosæ arboris , pandit , illam enasci , & effingi , obseruabis . Cum Corde verò Portæ vena haud quaquam , nisi per iecoris carnem , vel anastomosin aliquam communicat ; Caua autem non in Cor penetrat , aut radicibus firmatur , sed per dextram illius auriculam transiens , solum veluti ostium quoddam in dextrum eius ventriculum aperit , tribusq ; valvulis aditum sibi à Cordis influxibus occlu-

Ratio quare à Vasa ; Venas enim à iecore derivari , probatur .

A Causa va-
leulis in Cor-
eantibus, ibi
suam nō esse
originem, a-
rguitur.

dit. Ad quod nescio, cur non respexerint, qui à Corde venas deriuant. Si enim canalium vsus proprius est succum contentum vehere, manifestum, ibi originem esse, à quo succus in canalem ingreditur, non vbi ab eo exit. Si ergo à lecore sanguis in Cauam, & ab hac in Cor traducitur, non e contra, manifestum, ibi, non hic, illius esse originem. Valet etiam, quod in ijs animantibus, quæ dextro Cordis ventriculo carent, nec vena hæc aperitur in Cor, sed sursum pergens, ramificatur in pectore, cui tamen tunc in lecur insertio, & incavernatio minime deest. Signum euidentius, huic, non illi suam debere productionem. Concludatur ergo, si continentia à lecore veniunt, etiam contentum ab ipso prodire, iuxta produci.

Ratio quoniam
ad adiacen-
tibus excre-
mentorum
purgatorijs.

Sed nec vllum membrum, aut vas propè Cor efformatum fuit, quod reciperet, traheret, & expurgaret excrementa, quæ necessario in coctione chyli erant progignenda, sicuti videmus, propè lecur de his prouisum opumè à Natura esse: siquidem, & renes ad serositatem expurgandam, & cystis felleam pro bile, & liene pro atro, ac sacculento succo expiando, lecori propè affore, quibus hucusque non fuit ignotum. In qualibet autem coctione excrementa quæpiam ab agente calore segregari, omnimò necesse est. Sequeretur ergo, si Cor sanguinem, coquendo, gigneret, vt impurgatus ille ad caput, pectus, lecur, lienem, cæteraq; demandaretur partes, vel totus in aliquam aut retroiret, aut protruderetur partem, in qua posset purificari, & inde ad alendas partes dispensari. Sed vtrunq; inconueniens: nam, si primum, in prospera partium succederet alitio, & vbique scatirigo excrementitia superesset, peculiaribus gignendis morbis idonea, vel saltèm fæditibus nimium obnoxia; Si secundum, deberet aliquis peculiaris dari ad illam partem ductus, qui in Corde nullus agnoscitur, nisi vel generalis in totum corpus dispensans, nempe Aorta; vel peculiaris in pulmones reieciens, quibus excernendi non nisi per tussim, à Natura conceditur facultas; & illa non omnibus data est, & quibus datur, præter naturam esse, & periculo plenam, constat. Retrogredi autem per Cauam in lecur, & à valvulis supradictis impeditur; & à contrario naturali confluxu negatur; & vbi fieret, Naturæ sagacitati, quæ semper superflua deuittat, & Cordis dignitati, quæ non agnoscit elatiorem, non parum derogaret.

CAPVT SECVNDVM.

*Probatursiterius, Cordi non incumbere onus sanguinem ex chylo gignendū,
sed lecori.*

Primasatio à
congruentia
& laudabili
seueritate.

Quod si his Galeni rationibus aliquid addere libet, adde in primis, quod neque Cordi, in quo velocissimi spiritus, & arteriaci sanguinis

guinis fucina est; quod primum, ac verè princeps totius corporis membrum dignoscitur; in quo propriè vitalis, ac pulsifica facultas, (quæ aliarum, animalis scilicet, & naturalis regina est), residet; cuique potissimum animi regimen, totiusq; corporis fouendi munus incumbit; tantum vltro debebat onus incumbere, vti sanguificatio putatur; alioqui sub onere nimio casuro. Sufficiat ei si totum viuificet, regat, foueat, Cerebro vim spiritalem, ac calorificam infuset, Heparq; ipsum suo diffusente calore consuepat. De reliquis; & Hepati alimonie concoctionem, distributionemq; & cerebro sensum, motum, ac intellectum inesse, exerceri, & ad actum deduci, sinere debet, sinitq;: Sic enim, & in Politicis fieri, videmus. Sat Regi est; vt omnibus præsit, imperet, regat: opera verò tùm status alimonie, tùm Consiliorum adhibitionis, tùm Populorum, exercituumq; ductus, quibusdam Principibus demandatur, ac ferè absoluta permittitur. Alioqui dubium, ne sub onerum multiplicitate, insultuumq; immediato robore deficeret, operum verò seruitute Regia fœdaretur Maiestas; Quorum vtrunq; graue, ac periculosa, adde, & indecens iustissimè censetur: Quippè Principibus nimium præiudicia alia censentur immediata certamina, nimium grauis ad opera ipsa descensus, nimis indecorum mechanicos ferre labores. Ea quidem; quia, si malum aliquod ab hoste contingat, immedicabile est, cum à nullo alio suppetias habitari sint; quod in alijs cessat, ob influentem à Ducibus vim; robur, & opem: Hæc verò tùm, quia sic à præcipuo, & generali diuertuntur officio; tùm quia quò quid delicatius, eò facilius læditur, deteritur, & fœdatur. Naturæ ergo prudentia, à qua cuncta, quæ sub hominis Artè cadunt, desumpta sunt, Cor, tamquam humani Orbis Regem, in medio pectoris, vt in munitissima Arce locauit sepsit, munivitq; primum; inde verò à Coquinarijs lebetibus, & expurgatorijs ductibus, quodam validissimo septo intermedio, seiunxit; vt modò de tot exploratoribus simul, & bellantibus (qui sensus sunt) in alta turricula collocatis, & quòd magis est de fidissimis ei paratis in altiori sede Consiliarijs reticeam. Absit igitur ab eo periculum, & indecentia hæc, vt in Regiam Coquina migret, in Aula contentio. Quæ adhuc dissimilia sunt, alibi euincantur priùs; quæ fœda, longius educantur omnia, & quæ propinantur ei, purissima sint; & ab omni prorsus labe remota: ecuri autem præcipua alimenti, & populationis ministeria relinquuntur; huicq; numerosissimus Venarum famulatus, tamquam præcipuo Regis Proceri, assistat, quò sine vilo labore Regi non solum, sed & vniuersæ Turbæ affluentes porrigantur vndique dapes.

Neque rerum ordo (cuius tamen tanta in naturalibus dignitas est, vt in eo nil non inconcinne secundum Naturam esse dicatur); nec viscerum situs quicquam pro sanguificando chylo annuit Cordi: Etenim ventriculus in primis ab illo distet non parùm, & infra ipsum præterea situs sit, si Cor assumendi chylum, vt in sanguinem conuerteret,

ministrato vacaret; ad quid finire, vt illo iam coctus; adhuc inferius per pylorum ad intestina descenderet; quod postmodum per tortuosos anfractus eundem à remotiori attraheret: nonnè salius fuisset, vt ad se per rectam viam à stomacho probam succi partem alliceret, in sanguinem conuertendam; excrementa verò intestinis excrenenda relinqueret? Sed nec illi Cor proximum est, nec vllum huiusmodi ductum, qui rectà è ventriculo ad se feratur, fabrefecit Natura: Signum euident, neque ad ipsum demandandum fuisse chylum. Quippè Natura nec in superfluis affluit, nec in necessarijs desistit. decur autem ex altera cum à parte ventriculi digniore, & commodiore coniugui, sit in media ferè regione corporis secundum longitudinem viuat; pluraq; vascula tamquam canales, in illuth, ac intestina porrigit: facillimè huic incumbere munerì, & in totum corpus citra tot retrocessus alimentum dispensare potest.

Tertia ratio
à capacitate.

Nec magnitudo Cordis; nec capacitas ea est, vt possit tantam chyli molem, quanta his, ter, quateruè in ventriculo singula diè disponitur, in se coquendam recipere, ac retinere, nisi succellinè, ac iugiter portionem post portionem admitteret, ac alternatim pelleret? Quod, vt singulis manifestum, à probatione non eget, si quantitas succi è ventriculo exeuntis, & ab intestinis percolati, cum Cordis alterutra cauitate comparetur. Si sit verò, quæ coctio in oculi pectus, & pectus semper, ac iterum affuso crudo, expectanda? & quis aliquid cogitandi, deliberandi diuè circa rerum regimina locus, tempus daretur? Et quis iræ, amoris, lætitiæ cæterisq; animi passionibus aditus? Iecur autem tum magnitudine præpollet; tum à capacitate non cedens, miris, innumeralibusq; venularum macandis potitur, ita ut per eos aliquid temporis succus oberrans, non possit non concoqui, percolari, ac perfici, cum alteri actioni minimè vacans, nec à coctione distrahitur, nec ab aliquo perturbatur.

Quarta ratio
à temperatūra.

Uterius: quoniam Cor calidissimum omnium corporis partium sit, ita ut vix tactus, sine inure diutius, eius ventriculorum (præcipue sinistri) caliditate ferre possit; quomodo cum chylo, qui frigida nature est, proportionem habebitum esset? Aut enim Cor à chyli temperie refrigeraretur, aut chyli vretetur; aut hic saltem in calidissimam naturam corpori, quod temperatum est, nutriendo ineptum, abiret; ubi autem alterandi subiecti non corruptio, sed eiusdem, maturatio, vnio, vel perfectio expetitur, non contrarietas, sed analogia, non oppositio, sed similitudo, non in proportio accidentium, vel substantiæ, sed moderata proportio expetitur. Quod autem chylus frigidus sit, facit, & ciborum, potulorumq; coquendorum (si sumpta simul omnia, & acervatim, non diuisim, considerentur), tum actualis, tum potentialis frigiditas, & ventriculi concoquentis substantia exanguis, membranosa, nerveaque, ac ideo frigida, vt docent cum Galeno plerique Anatomici; & si addantur vasa, per quæ ferri ipsum ad Cor, Neoterici contendunt, ipsa quoque frigidiora

Chylum frigidum esse, probatur ex causa efficiēte, & materiali.

8. frigidiōra censuit *Roslinus cit. lib. 5. cap. 22.* vbi de lacteis loquens,
 9. Frigidiōres (inquit) sunt venis reliquis, quod hæc contactu sanguinis,
 10. qui chylo calidior est, incalescunt, & tamen non ad medium tempe-
 11. ramenti statum veniunt.) Cui consentit *Barbolinus lib. 2. de venis cap.*
 12. 3. Id ipsum arguit, & acidula eiusdem qualitas, & aqueus color, & la-
 13. stea similitudo, & inodora substantia, & tenuis fluxibilitas, nulla que
 14. illius post exitum consumptio, euolutio, condensatio. Idem probat,
 15. & asserit Neotericorum Chorus non indecens, & in specie nuper citati
 16. duo, qui ob id illum lactis immediatam materiam (quamvis indignè, vt
 17. in tertio videbitur libro) autumant; circulum illum euitare cupientes,
 18. quod è chylo sanguis, & è sanguine chylus (sic lac denominant) fiat.
 19. Ergo, si in omnibus Natura gradatim incedit, iustè debuit per lecur mo-
 20. deratè calidum, vt quod ex sanguinea substantia minimùm immutata
 21. constet, chylus transire, ibique vltiùs concoqui, calefieri, purpura
 22. donari, vt Cordi alendo, spiritibus, sanguiniquè arterioso reparandis
 23. idoneus, proportionatus, & facilis redderetur.

Id ipsum
 probatur ex
 eiusdem se-
 cundis qua-
 litatibus.

Ex auctori-
 tate.

Quinta ratio
 à caloris na-
 tui foco, &
 origine.

Quinimò, & quia in Corde fons, focusque natui caloris residet ex
Arist. 3. de part. ani. 7. non nisi pericolosè in illud crudi adhuc alimenti
 moles continuatè accederet: vel enim vitalis obrueretur flamma, vel hæc
 eadem, validius agens in sibi contiguum obiectum, illud vreret, seu cor-
 rumperet. Et primum equidè euentu facillimum; sicuti enim frigi-
 diusculi aeris accessus flammam potius viuificat, ita aquæ, vel frigi-
 di, sed crudiliquoris affusio eandem retundit plurimùm, & potissimùm
 si crudum crudo semper addatur. Quantum autem facilius, & pericu-
 losius refrigeretur Cor, quàm cæteræ partes, & quare, vide *Gal. lib. de*
usu puls. cap. 2. Secundum verò non minus facile: quia validissimi con-
 tactus imbecilliori plerumque parat interitum: quæ enim lentæ, & pau-
 latim sunt mutationes, tutæ sunt, quæ repente, ac plurimùm, naturæ
 inimicæ, vt ex *Hipp. 2. aphor. 51. colligitur.* Exemplo fiat, quæ extrinse-
 cus igni accidunt: huius enim fogo si immediatè aliquid coquendum su-
 perponas, vel suffocatur ignis, vel si is vincat, exterius adurens, summa
 sua aëtiuitate viam sibi met ad intima coquenda præcludit; cum alioqui
 si vel in moderata distantia, vel mediatè, scilicet in aëre, flammæ, chali-
 be &c., illi coquendum offeratur, optimè res succedat, & perfecta ex-
 peâetur concoctio: Ità ergo, & cordi casurum, verissimillimum est in
 ipsum enim immediatè delatus chylus, vel calorem natuum extinguet,
 si hic fortè imbecillus; vel vretur ipse, si is validus extet; quæ non acci-
 dēt, si ci bus in ventriculo, tamquàm inlebere, serueat, vel, vti in mo-
 derata distantia, coquatur chylus in lecores calor enim à flammâ in-
 fluens, si fomentum continuum focus suppeditet, quamvis retundatur,
 inuincibilis est, & quamvis aëtio retardetur, vel à crudo prohibeatur in-
 terdum; is tamen semper acturus, vel tandem cuincit, vel sine disci-
 mine cedit. Sed hic dicit aliquis, ipsum Cordis ventriculum prælebere
 insequire,

Obiecto.

Responsio. inferuire, æqua proportio, si focus extra ipsum ventriculum esset, & post
 eius parietes : at quia in ipso met ignis viuit, pullulatq; semper, frustra
Aduentanti. is pro lebetes, si focus est, supponitur. Aduertat hic etiam quibus, cum
 chylum frigidum dicimus, intelligi de frigiditate illa, quæ in animali
 dari sine iactura potest; tùm & de virtuali potius, quàm de actuali : cum
 in viuente nil adeo frigidum, quod actu teporem non habeat.

Sexta ratio à
 sanguinis ve-
 nosis arterio-
 sis, diuersita-
 te.
Amplius: Cum vnica Cordis sit, ac vniformis structura, quod per
 consequens vniformis sit temperaturæ, necesse est; maximè cum non
 sit corpus adeo magnum, nec eius cavitates adeo distantes, vt alteram
 in dexterâ, alteram in læua eius parte temperiem (quicquid de actuali
 vtriusq; calore sit) possit obtinere. Si sic autem est, quomodo duplicem
 sanguinem, nempe arteriosum, qui tenuissimus, calidior, ac flauior; &
 venosum, qui mediocriter crassus, purpureus, & temperatus est, pro-
 gignere valet? Sed & caloris, saltèm actualis diuersitate concessa; nec
 à Corde sanguinis illa diuersitas emanare potest: nam in Cavam, ac
 venas alias, ab eodem propriè, ac naturaliter egrè, vel non ob sigmoi-
 des valvulas datur sanguini regressus; Qui verò ab ipso in arterias pe-
 netrat, totus, per finitrum transiens ventriculum, vniformis erit, nul-
 libi locorum ipsius substantia mutata. Ad Iecur itaque spectat venosi
 succi coniectio, & ad Cor arteriosi; sicque clara diuersitatis causa assi-
 gnabitur, & melior regendi corporis æconomia seruabitur.

**Septima ra-
 tio à Cordis
 motu.**
**Motus tribus
 de causis co-
 stritum iacu-
 modat.**
Item: Cum Cor continuè moueatur, subulsetq; non solum, sed &
 alternatim dilatetur, constringaturq; non videtur ad tantam succi mo-
 lem excoquendum habile, idquè tribus de causis. Primò quia motus,
 præcipuè dilatans, & constringens, variat mutuum alterantis, & altera-
 ti contactum, qui in coctione necessarius est, & ex hac variatione
 actionis distractio contingit. Secundò quia flammæ directos ictus con-
 torquet. Tertiò quia ob vacui metum, vel quod in angustia pellitur,
 in dilatatione reassumitur, vel quid aliud superuenit. Non primum,
 quia inutilis reditio. Si secundum, vel illud succus est similiter coquen-
 dus, vel aerium corpus. Si hoc, aeris frigiditas coctionem turbabit;
 Si illud, crudum super crudum pessimum. Aliam in habilitatis causam,
 moræ nempe in eo sanguinis pusillitatem, quam circulares supponunt,
 non afferro, vt qui adiuventæ circulationi, eiusquè consequentijs peni-
 tūs repugno. Dicet verò hic aliquis mihi: nonnè concedis, à Corde
 sanguinem arteriosum gigni? Cur ergo, & alium non poterit produce-
 re venosum? Respondetur, ad illum gignendum leui transmutatione
 opus esse, nec arteriosum sanguinem à venali in alio differre, quàm te-
 nuitate, & caliditate; quæ qualitates ab ipso Corde faciliè in sanguinis
 portionem, quæ calidiori ventriculo obtingat, imprimi possunt: At non
 sic faciliè cadet, si chylus ipse totus, vel totus incoctus sanguis ab eodem
 sanguificandus, vel immutandus, ac perficiendus esset. Iterum quis
 obijcet, Iecur etiam, & Ventriculum in respiratione non secus, ac Cor,
 moueri

moueri quodammodò: Sed iniusta obiectio: nam hic verè eorum motus non est, sed leuis tantùm, & externa à diaphragmate compressio: Cor autem, & in se ipsum, & extra se continuè mouetur.

Repetitur.

Videmus etiam, ex diuersitate temperamenti Iecoris, tam intra sanitatis limites, quam in morboſo ſtatu, variari quoque totius corporis exiſtentiam, tam quoad habitum, proceritatemq; magnitudinem, & his contraria; quàm quoad coloris, temperiei, & ſubſtantię modum. Sic qui temperato, vel modicè calido, humidoq; iecore ſunt, habitum carnoſum, ſucculentum, colorem viuidum, ac rubicundum; ſtaturam, vel altam, vel ſalcem mediocrem ſortiuntur; Qui modicè frigido, habitum demiffum, debilem, exilium venarum, pauci ſanguinis, ſtaturamq; humilem nanciſcuntur; Qui nimis calido, habitu gracili, excarni, vicerolo, calore febriculolo, colore ſtauo, vel aduſto præditi ſunt; Qui nimis frigido, humidoq; hi habitu cachectico, fluído, ſegni, calore languido, coloreq; albicante induuntur. Et ſic de alijs temperaturis dicendum. Ergo in hepate facultatis naturalis principium, & ſanguificatio- nis officina eſt.

Oſtenduntur
ab effectibus

Ad hoc idem probandum non parùm conferunt quædam coniecturæ non leues, quarum prima eſt, quod pars dextra corporis melius leua nutritur, & ideo plurimis crus, pes, brachium, manufq; dextra corpulentiora ſunt, & carnoſiora, quàm quæ in altera parte. Secunda eſt, quod eadem pars calidior quoque eſt ſiniſtra, vt in ſpecie de vtero docuit Hippocrates, & docet de manibus, pedibuſq; ac cæteris partibus experientia. Tercia quod eadem eſt habilior, validior, & agilior in plerifque. Quæ cum à Corde non proueniant, vtpotè quod potiùs in ſiniſtram magis ſeſcit, in eam mucrone pulſat, & in eam per Aortam vitales ſpiritus primò tranſmittit; vel ſaltem æqualiter in ambas partes (vt in medio poſitum) ſuas diſpergit merces; procul dubio in Iecur ipſum eorum cauſa refundenda eſt, quod, vt ſanguinis, & natiui ſpiritus indefeſſus Opifex, partem dextram potiſſimum, & viciniùs, & directiùs nutrit, fouet, roborat.

Non ratio à
coniectura.

His omnibus rationibus addatur Authoritas omnium Medicinæ Procerum. Hippocr. lib. de hom. ſtruſſ. num. 5. apertè fatetur, ſecundam diſpoſitionem à Iecore fieri, & corporis partibus ab ipſo alimentum præſtari lib. de alimento num. 7. Venarum radicationem hepar eſſe, artetiarum Cor, & ex his ſanguinem in omnia aberrare dixit. Democritus in Epiſtola ad Hippocratem idem clariùs teſtatur. Platonem eiufdem fuiſſe ſententiæ aſſerit Gal. lib. de placit. Hipp. & Plat. 8. non ſemel. Et ſic hucufque apud Auctores Medicos adeo hoc firmum, & acceptatum fuit, vt aliter putare, aut ſcribere, nulli non videretur eſſe neceſas.

Decima ra-
tio ab aucto-
ritate.

*Soluantur rationes contraria Aristotelis, & Is cum Galeno
quodammodo conciliatur.*

Cor Veteras
precipua le-
cori sangui-
ficationem
affigunt.
Dicit.

Solus quippè Aristoteles visus est huiusmodi Medico dogmati liberè
contraire, qui quibusdam fretus rationibus, *lib. 3. de partib. ani. 4.*
& alibi sæpè statuit, principium, seu fontem sanguinis esse Cor. Et
hunc Philosophorum non impigra Cohors sequuta est, adeoque sæ-
pius cum Medicis dimicarunt, ut item sub Iudice adhuc vegetam esse,
contendant. Verùm à dicta sententia Medici cum suis Principibus ne-
latum quidem vnguem ob adductas ab ijs rationes deterrii fuerant vn-
quam: sed imò firmi, inconcussi; in ea permanserant, ijs potissimum
adducti argumentis, ac signis, quæ sensibus patentia ex Anatomæ pas-
sim habebantur: Nam si hominum eadavera, seu viuorum brutorum
corpora dissecabantur, inueniebatur nonnunquam in mesaraicis qui-
busdam venis, & glandulis chylosa quædam, albâque substantia, ut
proinde ab Antiquis Arabibus vena Portæ lactea diceretur, uti videre
est apud *Resall. lib. 3. de corp. hum. fabr. cap. 5.* Cuius hæc sunt verba =
„ Dein Portæ vena ab alijs etiam Iecoris manus nuncupatur, quod
„ Iecur ea ad elaborati in ventriculo cibi attractionē, tamquam manu,
„ vtatur. Sunt qui Lacteam appellant, quod succus, quem ab intesti-
„ nis ad se defert, lacteus sit.) Apud Aristotelem quoque *lib. 1. de hist.
anim. cap. 17.* Gaza inteprete, Lactes dicebantur huiusmodi partes me-
sentericæ. Et Erasistratus non semel in hædis lactentibus lacteum
succum in ijs partibus conspexerat, teste *Gal. lib. ansang. in art. sit. cap. 5.*
Quorum valorem ducius cum proximè in truncos, & in Iecoris cavam
ducereatur (quæ propterea à Portæ nomen antiquitus promeruit): à
Iecore autem ad Cor alia non adfuit vena, quàm magna illa, quæ Caua
dicitur, in qua nunquam chylosus humor, sed semper, ac perpetuò flo-
ridus eruo, & perfectus sanguis repertus fuerit, & adhuc reperiatur;
quid aliud portendebant, quàm in Iecore ex illo chylo gigni sanguinem,
ab eoq; ad Cor, & vniuersum corpus demandari? Quippè qui sensum
negat, & confugit ad rationes, dat signum stoliditatis ingenij nescientis
assignare effectuum causas, & dubiorum enucleationes.

Cor esse ve-
narum prin-
cipium de-
gitur.

Soluebantur verò rationes Aristotelis omnes: nam primo, quod Cor
sit venarum principium, iure merito negatum fuit ex hoc præcipue, quod
Orta suis attestantur principijs: Si ergo Cor incessanter mouetur, ac pul-
sat, & venæ, si ab eo essent, pulsare deberent, prout arterijs, veris eius
germinibus, est concessum; Ad quod etiam facit illa exonerationis, de-
mandationis, aditusq; denegatio, quæ in eas Cordi fit à sygmoidibus,
ingressum quidem, non egressum ferentibus; faciuntq; alia obstacula
capite

capite præcedenti exposita, & Iecori adaptata. Nisi forsan cum Gal-
triccio diceremus, ibi venæ nomen arterijs quoque ab Aristotele con-
cedi, & sic optimè dici posse Cor venarum esse originem; quod quidem,
verissimum cum sit, nil de venoso genere concludit.

Neque insuper, natura Cordis venosa est, vt Idem ait (nisi iterum
cum venalis nomenclaturæ extensione frustra eius dicta sumantur); sed
potius arteriosa; dum ipsum carne dura, ventriculorum tunica crassiori,
& inquieta indole, à quâ venæ abhorrent, constructum fuit.

Quod verò principalem locum, hoc est in medio thoracis, & in par-
te elatiori, nobiliori, tutiori; obtineat, neque ad hoc quicquam conclu-
dit; imò e contra: nam ideo nobiliori quoque, ac seriosiori officio dica-
tum esse à natura debebat, nempe vt cunctis gratiam, calorem vitam-
que impartiretur membris; Regis instar, non autem, vt chyli coctioni,
sanguinisque procreationi, tamquam Coqus, præesset, eumque in cor-
pus alendum distribuere, vt Oeconomus.

Nullam autem venam in Cortendere, verum non est: quia imò à
vena Caua rumulus quidam procedit, qui varias venulas in Cordis cor-
pus dispergit, vt habetur ex Gal. lib. de dissect. ven., & art. cap. 2. Item,
& vena ad modum coronæ eius basim ita circumdat, vt ab inferiori Sede
ramos deorsum ad Cordis vsque mucronem dispergat, Cordis substan-
tiam petentes, sinistramque; latus vndique amplectentes, vt tradit Vesall.
lib. 3. cap. 7.

Item quod Cor in medio cauum sit, non vrget adeo, vt ei tale munus
adaptemus. Illinc enim verum est arteriæ principium, in sinistram inde
ventriculum exilientis, per totum indidem corpus dispergendæ. Et hoc
est, quod Aristoteli ansam dedit putandi, inibi tertium adesse Cordis ven-
triculum, vt idem aduertit Vesall. cit. lib. 6. cap. 12., cum tamen duo
tantum in homine, dexter nempe, & sinister, inueniantur, vt habetur
ex Hipp. lib. de Cord. num. 4. Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 9. & 13. Vesall. lib.
6. cap. 11; cæterisq; post eos omnibus Anatomen profitentibus. Quare
illud cauum cum ad arteriam spectet, aliud non arguet, quam illud esse
sanguinis arteriosi, & vitalis spiritus officinam.

Kursus (inquit Aristoteles) nullum aliud in homine membrum, præ-
ter Cor, sanguinem extra venas, & in se ipso continet; argumentum
ab eodem in venas, non è contra, sanguinem emanare. Sed parcat mihi,
si dixerò, in hoc Cordi præire Iecur, non solum enim hoc vndique veno-
sum, sanguineque scatens est; sed & ex ipsomet sanguine concreto, ac
minimum immutato, veriusq; coacto illius substantia constat, vt non
solum Hippocrates cum suis sequacibus, sed & idem Arist., sensusq; ipse
, fidem faciunt. Et Galenus 6. de placit. Hipp. & Plat. 8. Si conspice-
tur, (inquit) sanguis, caro Iecoris est effecta.) Igitur quò magis
continenti, quam contento, virtus coquendi, seu immutandi, tribuitur,
eo & hepatis, quod sanguis propriè est, (modo iam dicto), non Cordi,

D

quod

Natura Cor-
dis venosa
non est.

Eius locus
principalis
contra con-
cludit.

Et in Cordis
substantiam
venæ ingre-
diuntur.

Eius medio
cauitas arte-
riæ principii
um.



Quod in se
sanguinem
continet, ni-
hil vrget

quod in se sanguinem continet (caro autem est) gignendi sanguinis officium tribuendum. Et forsan duo ij ventriculi instar duplicis magnæ venæ ipsi Cordi inferuiunt, vt quod ob eius carnis soliditatem, venarum insertioni resistentem, ei denegatur (pro sanguinis scilicet copia excipienda) ab hisce cavitatibus, venarum officio fungentibus supplicatur.

Vnum esse
omniū prin-
cipiū alicui
est.

Vnicum (addit Aristoteles) debet esse omnium principium: Cor autem omnium partium primò consistit, perficitur, vivit, palpitat, dispensat; cæterorumquæ membrorum nobilissimum est, & verè princeps: dicendum ergo, & admittendum, etiam principium, & fontem sanguinis esse. Verum enim verò, nec huiusmodi quicquam ratio valet: sufficiens enim, vt Cor vnicum omnium dicatur principium, fontem esse vitalis facultatis, quæ sub se potentia, & animalem, & naturalem continet: Est namque Vita ipsum nutrir, sentire, moueri, intelligere, operari &c. *vt habetur 2. de ani. tex. 1. 3. Sicuti & prius dixerat tex. 3. Vita* est, quæ per ipsum corpus fit alitio, augmentatio, & diminutio.) Cognitionibus autem, tum generalibus, tum priuatis incumbere, non sibi, sed alijs membris, ab eo spiritu vitali donatis, congruit magis, vt experimenta probant: Chylus enim in ventriculo, lac in vberibus, semen in testibus, spiritus animalis in cerebro, ros in qualibet enutrita parte gignitur, & hæc adiuuante nativo calore, spirituquæ viuifico, qui à Corde quoquò insuit: Ergò dari vnum omnium principium, sicuti cæteras publicas cognitiones assignatis partibus, & priuatis cu pntis alijs non subripit, ità nec cæcori sanguinis generationem iustè poterit abrogare.

Cor primum
gigni nega-
tur, & vbi gi-
gnatur, nil
concludit.

Quod autem primò omnium partium in generatione consistat, pubet, & sanguinem contineat Cor, id quidem primò negatur: vel enim cum Galeno lib. de format. fat. cap. 3. 6., & alibi Corde prius securi gignitur; cum natura, necessitate, ac ordine prior sit vita plantæ, post animalis, ac vltimò hominis, vt perfectior; vel, vt verius autumo, omnia simul inconfusa membra gignuntur; quæ tamen nò statim ob ruditatem, & exiguitatem possunt distingui, sed paulatim crescendo discernuntur, seiunguntur, distinguuntur; exemplo herbarum, plantarumque: quarum multas in sui ortus principio diiudicare est impossibile, quas postmodum simul augeri, & distingui in dies, conspiciamus: Nec enim à Iecore, vel à Corde venas, aut arterias procreari, sed omnia à virtute seminis cum menstruo efformari, ex ipsis deriuari, ac in ea inferi, paulatimque delineari, censendum: nam nec quod gignitur, aliud ipso gignendi tempore gignere; nec quod formatur, aliud eodem actu efformare potest; cum idem simul agens, & patiens in eodem genere esse nequeat. Quod forsan annuere voluit Hippocrates lib. de loc. in hom. num. 1. dicens: Mihi quidem videtur principium corporis nullum esse, sed omnia similiter principium, & omnia finis.) Cum verò quædam principia dicuntur,

dicuntur, vt supra de Iecore dicebatur, intellige, in his radicari, ex his germinari, & ab his ea quodammodo regi. Sed secundò, quamuis illud concederetur, nec officeret; cum aliud sit quid primò consistere, gigni, & sanguinem continere; aliud verò sanguinem virtute propria generare: In embryo siquidem sanguis, vel immediatè (vt in humano) per matris venas, arteriasq; in totum formandum, formatumq; confluit corpus; vel virtualiter à matris calore ex apta iam introducta materia (vt in ouo) non à cordis virtute progignitur; cuius signum est, incubatione matris cessante, & sanguificationem cessare, & vitam; Vbi verò animal iam ex se regi, & sanguinem gignere valet, tunc non Cor solum, sed & Iecur, & vniuersa membra consistunt; itaut, non ex eo, quod quid primò gignatur, & consistat, sanguinis officinam arguere ibi liceat. Quod autem in ouo secundo prima sanguinis gutta obseruetur in corde (si verum hoc sit), id non ipsius facultate fieri, sed ex maiori materiæ, illius aptitudine ad talem formam à matris commutante calore recipiendam euenire, dicendum. Addatur, & tertio exemplum oui, cui tantum tribuat Recentes, minimè omnium hominis generationi conuenire, ab eoq; ad hanc non valere argumentationem, vt ex *professo lib. 3. cap. 7. & 8.* monstrabitur.

Illud tandem argumentum, quod nullum animal sanguinem gigneret Corde, etiam ad Iecur trahi potest, sine quo, vt ipse etiam fatetur Aristoteles, nullum huiusmodi animal est; Et sicuti verè dicere possumus, à nullo alio in Iecur membro sanguinem, qui proximè ex chylo gignatur deriuari; ità ad Cor veris à sanguifico Iecore demandari, ab illoquè simul attrahi, fatendum est. Nec hic mihi opponatur Galparis Baccini auctoritas de Matthæo Ortelio, sine Iecore, & liene inuento cum Caua intestinis annexa: vel enim fabula est, vel metaphoricè prolatum; vel vt dictum vnius, ac si nullus esset, tenendum, vel vti quid monstruosum, nullam prolata thesis facit diremptionem.

Quare satius fuerit vnà cum Auerroe, Auicena, & alijs Aristotelis dictum sic interpretari; Cor scilicet primum in se sanguinem continere, generareq; nempè vitale, ac spirituosum, esseque primum, hoc est immediatum, principium sanguinis quoque venalis, & alimentosi ex eo, quod viuificos spiritus ad Iecur transmittit, sine quibus nec hoc sanguificaret; Iecur autem esse verum fontem, & vltimum, sed immediatum principium sanguinis, ab eoq; illum ad Cor, cæteraq; membra corruari. Et hoc Medicis sufficit, quibus sat est, nosse, fontem sanguinis esse hepar, sicuti, & sensuum, ac motuum cerebrum, vt ait *Auic. prima primi doct. 6. cap. 1.*, & commentatur Iacobus de Forliuio cum alijs. Hecq; pro parte consonant ipsi Galeno, qui locis citatis concedit, sanguinem arterialem etiam iuxta Platonis sententiam gigni in Corde; nec inficiatur, Iecur pro suo munere Cordis spiritibus egere: hoc tamen ex altera addito, quod nec Cor spiritus gignere, nec nutrirì valeat, nisi à Iecore

Nec facit
Cordis ne-
cessitas.

Conciliatur
Galeno Ari-
stoteli.

sanguis ei suppeditetur ; itaut per ipsum reciproca sit egestas . & reciprocum ministerium ; Qui videtur ex Hippocrate id mutuassee *lib. de hom. strucl. num. 2.* vbi hæc habet : Sed Iecur Cordi sanguinem non præter veri fidem affatim suppeditat : nam ignis absque materia permanere neutiquam potest .

Splendet Aritoteli. fauet Iecori .

Addatur his pro coronide , ipsum quoque Aristotelem , suimet ferè oblitum , vel à veritate coactum , idem sentire ; qui eodem *lib. 3. de part. anim. sed cap. 7.* hæc formalia protulit verba : Sed enim Cor , & Iecur omnibus animalibus necessaria sunt ; alterum propter caloris originem : (locum enim adesse aliquem , quasi lares , focumquè , oportet , quò naturæ fomites , & primordia ignis natiui contineantur , & seruentur , eundemquè tutum esse , veluti arcem corporis totius , necesse est) ; alterum , Iecur dico , cibi concoquendi gratia adest .) Patet autem cuique , hic non de cibi prima coctione agere Aristotelem : nam & ipsi , & omnibus in confesso est , eam in ventriculo fieri : ergo eum de chylò coquendo dicere , ambigendum non est . Quare non immeritò , imò prudentissimè nonnulli Philosophorum , vel Principem suum deferentes , vel sic interpretantes , fontem venosi sanguinis Iecur nominant : Alij verò idem concedentes , solummodò prætendunt , sanguinem à Iecore profectum , si nutrire debeat , à Corde prius perficiendum esse . Cum his , si de mediata perfectione scilicet per transfusum quoquò in venas , medijs arteriarum anastomosibus , & sygmoidum rimulis , spiritum , vitalemquè calorem , intelligant , libens , & ego consentio : alioquin , si de immediata Cordis elaboratione agant , reluctaturus vbique ; qui à Iecore citrò vltroque sanguinem per venas dispergi , à partibusquè simul trahi , citrà Cordis ingressum , contendo , vt monstrat venarum ipsarum ramificatio , non ad Cor solum , sed ad omnes æque , ac ad ipsum , partes protensa , sanguinisquè venosi ipsius tam superioris , quàm inferioris , tam Cordi proximi , quàm remoti homonimia , & identitas .

CAPVT QVARTVM.

Quam sit Iohannis Pecqueti de sanguinis officina recens opinio .

HÆC fuit apud Medicos saltè omnes decantata , acceptata , ac indelebiliter determinata sententia de Officina sanguinis , deque Iecoris proprio munere , vsque ad proximè superiora tempora , quando erumpens fortasse Ioannes Pecquetus in cuiusdam viui canis anasomen , eum , enulsa Corde à cæteris inuolucris , similem lacti substantiam à vena quadam viderit exire , cepit , & in eo tunc , & in alijs postea dissectis canibus inuestigare illius lactei liquoris , & ductum , & originem : Ipse ergo post plures diligentes sectiones tandem inuenisse fatetur quoddam chylì

chyli Receptaculum iuxta lumbos, & renes, à quo per Spinam dorsii duo teretes, & membranei riuli ascendentes dictum humorem lacteum deferre videntur ad venas subclauias ab eo dictas (& sunt venæ, in quas Cava, Cor prætergressa, antequàm in duas iugulares scindatur, sub clauicula diuiditur, ad axillas; brachiaquæ tendentes); & in eas foraminulis quibusdam penetrant, & lac refundunt, non quidem ad iugulum ascensurum ob quasdam ab eo ibi adstructas valuias hoc impediētes; sed benè ad Cor cum remeante à membris sanguine, vt & ipsum sanguis euadat, peruenturum. Additum verò Receptaculum ipsummet chylum deferri per alia multa venosa vascula albicantia, iam olim ab Asellio Ticinensi inuenta, delineata, & inde pluribus alijs passim accepta, ac celebrata, quæ multas, variasquæ veluti radices in intestina, præcipuè tenuia, insinuant, manifestò patere dicit.

Qui Auctor, cum multas diligentias adhibuisse fateatur, vt videret, an venulæ illæ, lacteæ dictæ, ab eodem Receptaculo; aut glandulis alijs (prout dictus Asellius tradiderat, aperta; figura commonstrauerat) possent eundem succum chylosum deferre, siuè mediatè per Portam, siuè immediatè, in Iecur; nullumquæ se nec minimum talis delationis vestigium vnquam conspiciere potuisse, asserat; & ex altera semper viderit, per supradictos ductus thoracicos in subclauias seu axillares venas dictum lacteum succum deportari; Non ab re, tamquam in certa alea consistens, latis buccis, non ampliùs ad Iecur, sed ad Cor ipsum chylum, in sanguinem commutandum, permeare, nec ampliùs ad Iecur, sed ad Cor; sanguificationem spectare decantauit.

Sicquè in quodam ab eo condito Libello, cui EXPERIMENTA NOVA ANATOMIA nomen imposuit, circa id muneris Iecoris dignitati longum Vale donauit: Cui tamen, tandiù à Medicis iure purpurato membro, ne querulum omninò illud relinqueret, neuè frustra idem à Natura procreatum esse videretur, alia quatuor officia attribuit; vnum scilicet, quod vice cuiusdam pistilli ventriculū succurientis, & ab eo in intestina, indeq; in lacteas chylum exprimentis, inferuiat. Alterum, quod sit sanguinis à Corde ad partes nutriendas transmissi, & ad ipsum remigrantis, veluti colatorium quoddam. Tertium, quod bilem à sanguine expurget; Et quartum, quod ventriculi coctionem suo vegeto calore coadiuuet. Et hoc modo illud sibi condecorasse visus est, dum loco vnus quatuor illi officia, seu ministeria assignare inueniuntur. Quibus quintum addere poterat, cuius meminit Aristot. lib. 3. de part. anim. cap. 7. quod nempe, sicuti, & alia viscera, inferuiat pro sustentamento venarum, quæ cum pensiles sint, viscerum connexu stabiliuntur, vniuntur, & tutius diducuntur; sicuti de Cava inter Cor, & Iecur; de Porta inter hoc, & lienem videre est.

De huiusmodi verò ministerijs, & de modo, quo Chylus in dictum Receptaculum, in lacteas thoracicas, & in Cor commigrat, non solum

Receptaculi,
& thoracici
tubuli lactei
inuentio.

Non Iecori,
sed Cordi
sanguificationē,
conuenire
asserit Pae-
quetus.

Quatuor of-
ficia Iecori
à Paquetus
attributa.

Aliud illius
ex Aristot.
scitum.

in libello citato, sed melius in alio, cui DISSERTATIO ANATOMICA nomen inscriptum est, is pertractauit Auctor: ibi enim, cum prius per alligationem eorum vasculorum videret quidem versus Spinam, & superiora ea inaniri, versus verò mesenterium, & intestina turgere, sibi clarum visum fuit, huiusmodi commigrationem non per attractionem, sed per impulsionem fieri. Hoc statuto, modum deinde, quomodo fieri huiusmodi expressio possit, indagare contendit; & post varias dubietates, quòd nempe ad hoc valere possent ventris compressiones in exonerandis intestinis, vesica, cystiq; fellea fientes, vel arteriarum comitum vibrationes, vel constrictiones, ac dilatationes vicissitudinariae muscutorum abdominis, quæ ob respirationem continuè insurgunt; tandem ad vnicæ respirationis efficaciam se restringit. Per hanc enim (ait cap. 2.) dum pulmones dilatantur, diaphragma versus inferiora premitur, Iecurquè more cuiusdam pistilli, per intervalla succutientis, molis grauiamine, ac motu non solum è ventriculo chylum in intestina adigit, sed & eorundem dilatando porulos, illac subtilissimam impellere in lacteas alimenti partem optimè potest.

Quomodo
chylū in la-
cteas adigi,
iddē statuat.

Quam per-
plexè idem
astruat chylū
impellendi
modum, no-
ta tūc.

Circa quæ obiter notandum nobis est, quàm perplexè huiusmodi.
Idem astruat impellendi causam. Hoc posito (inquit ipse), mitto
contractionem illam, atque distentionem, qua muscoli, respirationis
opera, continuato motu agitantur, non sic enim viscera comprimunt,
vt ex intestinis chylum valeant exprimere. Mitto arteriarum circa
intestina micantium vibrationem: nam quiescentibus post ligatam
Cæliacam arterijs, nihil minus Lacteas irrepens chylus tumefacit:
Supereſt igitur, vt ad vehementem muscutorum contractionem, vel
ad continuam expirandi nec non aspirandi vicissitudinem confugia-
mus. Verùm, quia perpetuus chylū, quamdū quidem alimenta sup-
petunt, transitus iugem pariter postulat compressionis causam, qua-
lem ineptum est in muscutorum contractione, propemodum momen-
tanea, quærere; ad respirationis demum vices, meo quidem iudicio,
recurrendum.) Ecce quomodo in hoc varius, & vacillans cernitur:
si enim putat ipse, ex illa muscutorum contractione, quæ sequitur ex-
pulsionem alui, vel vesicæ, posse à ventriculo, & intestinis in Lacteas
chylum exprimi, cur postmodum inquit, ineptum esse, ad hanc causam
momentaneam confugere? Si verò rursus inquit, contractionem, ac
distentionem muscutorum, quæ à respiratione procedit, non sic viscera
comprimi, vt ex intestinis chylus exprimi valeat, cur postea reinferat,
vel ad hanc, vel ad alteram supradictam esse confugiendum? Et cur
rursus, priori seclusa, ad vltimam; insufficientem nuncupatum, se redu-
cit, in eaque firmatur, addita solum capite secundo Iecoris compressio-
ne, eandem respirationem insequente? Melius autem multò erat Ei ad
hoc, vt suam magis firmaret, ac eueheret expressionem, omnes dictas
cumulare causas, itaut per vnam, duas, tres, ac plures commodè fieret:

Sed

Sed ne sic quidem naturaliter talem fieri posse Chyli in Lacteas, aliasque Venas appulsionem, videbitur infra cap. 11. Pro nunc sufficiat Pecqueti, ac aliorum Neotericorum adinventiones memorari, quo possint earum ponderari vires in hæpatis hæmatosi, prout Illi supponunt, releganda.

CAPVT QVINTVM.

Quantum inde de Officina Sanguinis fuerit Thomæ Bartholini sententia; Eiusque lepida ad Iecur Exequia.

HVIC Pecquatianæ opinioni aliquantisper, & per quoddam tempus contrariari visus est Excellentissimus Thomas Bartholinus; Medicus Anatomicusque Danus, qui libro de LACTEIS THORACICIS edito huiusmodi lumbaribus, ac thoracicis ductibus, à se primo in homine recens strangulato admissis, inuentis, ac publicè ostentatis, chylumque per eos supra ad Cor migrare, concessio; concludit, Iecori quidem minimè denegandum esse sanguificationis officium; verum illud potius esse patiendum, itaut vel à Corde subtiliorem, à Iecore autem crassiorem chylum in sanguinem conuertere; vel partim ab vno, partim ab altero confici, prout melius naturæ placuerit, vel coegerit necessitas, per Eum dicendum, & credendum sit. Et hoc nonnullis rationibus ab eo in capite decimo quinto cumulatis egregiè comprobare visus est; quarum prima est, quod per multas suas anatomicas obseruationes clarè cognouit, à magno pancreate, & glandulis candicantes venulas plenas eodem chyloso succo, vel sero ad Iecur, & ad Portæ venam non minùs, quàm ad Receptaculum, & glandulas permeare, sicuti & iam antea obseruauerat VValleus, & omnium primus Asellius Lacæarum Inuentor tradiderat, cum alijs multis, quorum fides cum tot sint, videtur esse solius Pecqueti fidei præponenda. Altera, quod ductus thoracici, & glandularum tam sunt exigui, & foraminula adeo tenuia, vt non adsit pro toto vehendo chylo conueniens proportio. Alia, quod, læso in hydrope Iecore, læditur & sanguificatio, vnde loco sanguinis serum, phlegma, flatus in corpore acervantur, sicuti & nonnullæ aliæ exinde promanant ab offensione Iecoris, vel Thoracicarum obstructione læsiones, à quibus & vomitus, & Cordis oppressiones, & natiui caloris, ac spiritus suffocationes consequuntur. Quare his, & quibusdam alijs adductis, sibi meritò concludere videtur, sanguificandi ministerium non vni tantùm ex his partibus; sed vtrique simul competere, itaut, harum viarum altera obstrueta, diù perdurare nequeat animal, & varia symptomata cùm interitu tandè suboriantur, vt quibusdam exemplis, quæ habens prætereo, patèfacere conatur.

Verùm, non sibi diù constans, cum postmodùm, vt ipse palam asserit,

Iecur Iecur, & Cor præteritum esse sanguificationem, concludit.

Prima eiusdem ratio.

Secunda ratio.

Tertia ratio.

rit, re melius perspecta, considerata, & cognita, inuenerit, vasa ab ipso prius à glandulis, & pancreate ad Iecur concessa, plena esse, ac effundere non lacteum succum, non illius serum, sed limpidam aquam; nec conducere à Lacteis ad Iecur, sed ab hoc in Receptaculum nullamque aliam adesse semitam, quæ hinc ad Iecur pergeret; & in alteram festinans abiit sententiam, & priori palinodiam concinns, omnino, & ipse Iecori vale dixit, totum sanguificationis operam Cordi tribuens, & Ioanni Pecqueto subscribens; vt apud Eundem legere est libro de Vasis Lymphaticis inscripto: Nec amplius apud Eum valet vasorum prius monstrata exiguitas, non oscillorum pusillitas, non traducendi succi copia, non alia à se producta ratio, quin (vt lymphæ Author habeatur), adijciat, non solum chylo tenuiori vehendo, sed & crassiori; neque his tantummodò, sed & lymphæ simul ad Cor deducendæ solitarium Thoracicum tubulum apprimè suffecturum. Et sic, Iecori prius Purpura detracta, eidem lapidè sequentes Exequias cecing. DID A

Pecqueto subscribit, & Vasa Lymphatica proponit.

Hepatis Exequias Bartholinianæ.

ABI. VIATOR.
CLAVDITVR. HOC. TVMVLO.
QVI. TVMVLAUIT. PLVRIMOS.
PRINCEPS. TVI. CORPORIS. COQVVS.
ET. ARBITER.
HEPAR. NOTVM. SECVLIS.
SED.
IGNOTVM. NATVRÆ.
QVOD.
NOMINIS. MAIESTATEM. ET. DIGNITATEM.
FAMA. FIRMAUIT.
OPINIONE. CONFIRMAUIT.
TANDIV. COXIT.
DONEC. CRVENTO. IMPERIO.
SEIPSV. DECOXERIT.
ABI.
SINE. IECORE. VIATOR.
BILEMQVE. HEPATI. CONCEDE.
VT.
SINE. BILE. BENE. TIBI. COQVAS.
ILLI. PRECARE.

Et sic à duobus his recentioribus Auctoribus, verè in Anatome in signibus omnino explosa videtur antiquissima de membro à Natura sanguificationi dicato sententia Medica. Sic Antesignanis præire videntur Alomni, & Aristotelis ferè sopita, vel saltèm arctata sententia his temporibus nimium ampliata reuixit; Vt hinc videatur, etiam in opinionibus, & ingenij conceptibus sua quædam dari fata, vt modò eleuentur, modo labantur, nunquæ ortum, nunc interitum subeant, & non immerito ijs sequens adaptari Poeticum dictum.

Nec forma æterna, nec cuique est fortuna perennis.

Ambulatoria quippè est voluntas hominis, labilis opinio rerum; & quæ Sol elicit matutinus, nonnunquam tenebræ vespertinæ sepeliunt, quæ nox eruat, dies aliquando dissipat.

Iaceat nunc infælix hoc Viscus, & in Telluris viscera detrusum, per caliginosum inambulet Orcum, quoadusquè, Euridicis fortunæ capax, Orpheum aliquem lyra, vel tuba canentem experiatur in inferis: Vitam tamen fæliciori sorte; ne scilicet, ad Vitam redux, cupido quidem, sed vetito Amantis intuitu, ad pristinam denud trahatur infælicitatem; hæc maximè infausta tempestate, qua nec Principibus parcitur, & contra Heroes ipsos quilibet audere, etiam vulgaribus inscijs non videtur indignum.

CAPVT SEXTVM.

Observationes aliquot circa dictorum Opinantium dicta.

Circa talem verò opinionem nonnulla, antequàm ad vteriora progrediamur, à nobis obseruanda veniunt, quæ magnam dubietatem in simili admitenda deliberatione ipsis præferre debebant. Et primò obseruo, hosce duos Auctores Pecquetum, & Bartholinum valde, ut supra tactum est inter se dissentire, in describendis huiusmodi lacteis vasīs, & Receptaculo; nam vbi Pecquetus asserit, inueniri versus lumbos inter renes quoddam membraneum, impluuium satis amplum, in quod plurimi riuuli, ab intestinis oriundi, terminantur, & ex quo bini canaliculi procedunt, per Spinam hinc & hinc ascendentes, ac ad duas subclauias venas, prope Cauam eò loci finientes, & introeuntes, vbi Caua in axillares diuiditur, & ad radicem ferè iugularium; Bartholinus lib. de lact. Thorac. cap. 6. asserit, dictum Receptaculum in hominibus non inueniri, sed bene quasdam magnas glandulas, ab eo lumbares dictas, ut plurimum tres, in quas dicta vascula lactea ab intestinis, & pancreate deriuantur; ab ijs verò non duos canales sursum per Spinam ascendere, sed vnicum in sinistra eius parte tantum; nec in duas axillares, sed in sinistram solum inferi, ut in capite eiusdem quinto habetur, & ut lib. de dub. lact., ac alibi firmat. Vbi Pecquetus firmiter fatetur, nullum vas, nec vllum ramusculum dicto impluuii, & lacteis ductibus in iecur manare, Bartholinus lib. de lact. Thorac. cap. 15. clarè affirmat, ac testimonio Afellij Ticiensis, primi Lactearum inuentoris, Vualliæ, Higmori, ac Fallopij multa à dictis lacteis vasculis, ac pancreate, vascula in venam Portæ inferi, & in iecur tendere, eodem lacteo succo, & nonnunquam sero, referta, latè confirmat. Vbi ille quarta, vel quinta hora post pastum ait inueniri lacteum succum in dictis vasculis, ac Receptaculo, in ieiunijs verò, & fameliscenibus non inueniri; Hic è contra

Pecqueti, & Bartholini
dissentio circa
Receptaculi formam,
& thoracicarum
nomenclaturam.

Idem circa
lactearum
cum iecore
communio-
nem.

Idem circa
tempus, &
existentiam
eorum succi.

& septima, & decima post pastum hora, & pleno adhuc existente ventriculo, & quod magis est, statim aspto cibo, tradit, dictum succum aliquando, aliquando verò ferum, & quid instar euandidi lactis competiri; sicuti è contra *cap. quinto ait*, vno homine post horas quinque à pastu strangulato, qui obesus valde, & sanus erat, nullibi, nec in glandulis, nec in Lacteis chylum repertum fuisse, quod confirmauit capite decimo quinto in cadauere alio, in quo nec lacteas vnquam inuenire potuit.

Lacteorum
exilium, &
Infricuant-
scentia suo-
ci.

Secundò obseruo, hosce ambos Authores ingenuè confitèri, huiusmodi vasa, tam mesenterij, quam thoracis, a deò exilia esse, vt, si fortè vel exierit ob incisionem ab ijs albus succus, vel animat extinctum frigidum iam fuerit, aut ob incediam gracile; vix, ac ne vix quidem possint discerni, solummodoquè veluti fibrillæ albæ, aut veluti neruuli, aut pinguedinis quidam peruij, & longi processus appareant; itaut ille succus facillimè euanesceat, & oculatissimorum hominum oculos effugiat; Ex hanc esse, ait, causam dictus *Bartholinus cap. 19.*, cùr Anatomici celeberrimi non antea similem chyli semitam obseruare potuerint.

Bartholini
dissentius cit-
ea Recepta-
culum.

Obseruatur tertio, eosdem Authores non solum alterum ab altero, sed à semetipsis quoque in rerum serie referenda non raro dissentire: Nam *Bartholinus lib. cit. de lact. thorac.* modò vice Receptaculi tres in homine esse glandulas lumbares sub mesenterio positas, duas scilicet aliquantò inferiores, & vnã superiorem, quæ tamen inuicem per ramusculos communicent; modò vnãcam; modò plures esse, asserit. Nunc eas à mesenterio seiunctas, & solum antica parte cum eo connexas; nunc in mæzæreo ipso positas esse, innuere videtur. Huiusmodi rerum contrarietates ex proprijs ipsius verbis venaberis facile? Siquidem, „ quod sint tres, ipsius verba *cap. 5.* hæc sunt: In primo glandulas ple-
„ nas tres lumbares loco Pecquetiani Receptaculi, monstrauimus pu-
„ blicè) Idem *cap. 6.* asseuerat dicens: In hominibus tres glandulas
„ notauimus, duas maiores inuicem superpositas, sed mutuis ramulis lacteis
„ coniunctas inter Cavam descendentem, & Aortam in angulo, quem
„ emulgentes cum vena faciunt; tertia superior, diaphragmati vicinior,
„ eiusq; principio neruo sub appendice immersa.) Quod vnica, desu-
„ mitur ex *cap. 4.* vbi sic ait. Progressus lactearum ab omnibus in-
„ testinis, etiam cæco: frequentius tamen à tenuibus, & copiosissimæ à
„ ieiuno, vnde ad glandulam mesenterij mediam perductæ instar ca-
„ preolorum vitiū implicantur, indequè partim ad hepar, cum Porta
„ varijs insertionibus abeunt rectâ, partim ad emulgentes, partim ad
„ Cavam, quem ad modum *Vvallæus*, & omnes oculati obseruauerunt;
„ vt chylum hac semita incedere, dubitare amplius non liceat.) Quod
„ verò plures tribus sint, tradit *cit. cap. 6.* dicens: Credo tamen, varium
„ esse in varijs numerum: siquidem in quodam homine plures in me-
„ senterio

„ fenterio comparebant glandulæ , quàm in alijs hætenus à me disse-
 „ ctis) Ex quibus verbis apparet quoque , dictas glandulas esse in me-
 „ fenterio ; quemadmodum , & ex citatis verbis capitis quarti , & ex ijs ,
 „ quæ capite quinto leguntur , aptè colligitur ; cuius hæ sunt notæ : In
 „ primo lacteas mesentericas , & thoracicas chylo repletas inuenimus :
 „ in altero autem ne chyli in vasis illis vestigiū vsquā visum : nec tamen
 „ spe frustrati , aut expectatione : comparebant enim in mesenterio
 „ glandulæ lumbaræ , & in thorace ductus chylo destinati .) cum tamen
 „ è contrā *cit. cap. 6* dictas glandulas retro mesenterium reposuerit
 „ his verbis : Sicus , infra centrum mesenterij , quod subinde alteri ex-
 „ ætè superponitur , sub cæliaca , & emulgentibus circa lumbaræ ver-
 „ tebras , inter earundem musculos psoas media ferè regione inter re-
 „ nes , & capulas atrabiliaras .) Et inferiùs sic : Connexio . Postica
 „ parte adhæret vertebrae lumbaribus . Antica mesenterio perramu-
 „ sculos lacteos , qui chylum ad hanc cisternam deriuant .) Itaut certò
 „ nescias per Ipsum distinguere , an hæ glandulæ lumbaræ in mesente-
 „ rio sint , & sic eadem ab Hippocrate ; Galeno , Vesalio , cæterisque mæ-
 „ zæreo dicatæ ; an extra mesenterium nouiter inuentæ aut saltèm recens
 „ animaduersæ : quod tamen vltimum videtur concludere cap. 19. vbi
 „ dicit , lacteas glandulas nouas , glandularum mesenterij nomine facillè
 „ adhuc vsque scrutatoribus imposuisse .

Rursum cum superiùs visum sit , in allatis verbis ex capite quarto de-
 „ cerptis , & ex capite decimoquinto , & decimoseptimo ab ipso verè asse-
 „ uerari vnà cum alijs ab eo citatis Auctoribus Vvallæo , Higmoro ,
 „ Afellio &c. à mesentericis lacteis , & glandula varios ductus , & ramu-
 „ sculos ad hepar prodire , in quibus idem chylosus succus , ac in ijs , in-
 „ uenitur ; cumq; varijs rationibus prober , ob id hepatis sanguificationem
 „ non eripiendam : Libro tamen de Vasis Lymphaticis , vt sibi lymphati-
 „ corum ductuum gloriam paret , non veretur certius affirmare , dicta va-
 „ scula ad hepar tendentia non lacteum succum , non fuscum serum , sed
 „ limpidam aquam in Pecquetianum Receptaculum effundere , ac eius-
 „ dem qualitatis , cuius alia vascula in lacertis brachiorum , & crurum in-
 „ uenta , continere , diuulgat .

In alijs quoque multis modò negat , modò affirmat ; exempli gratia
 „ cap. 14. de *lact. thorac.* ait , mox sumpto cibo , thoracicas lacteas eo suc-
 „ co refert as reperiri ; capite decimo sexto id ferè negat . Cap. 13. eius-
 „ dem operis in venæ in sectione inquit sæpius serum instar lactis pro-
 „ diisse , & exemplum cuiusdam puellæ affert . At in *Defens. ad Riol.*
 „ negat , id posse fieri , nec nisi in cacochinis ; nec lac esse , sed pituitosum
 „ succum , ibidem contendit . Illic cap. 17. in principio admittit , & con-
 „ cedit , lienem acidum succum , & renes serum transcolare ; hic vtun-
 „ que inquit antiquum , & improprium esse . Item d. lib. de *lact. thorac.*
 „ tenuiorem solum succum in lacteas abire docet ; altero vero lib. *Defens.*

Aliæ diffen-
 „ siones circa
 „ lactearum in-
 „ cessus & de-
 „ lationes .

Aliæ ita circa
 „ cõsenti qua-
 „ litatem , tem-
 „ pus , visum .

etiam crassum, mechanicorum instrumentorum exemplo, infumi posse in exillima vascula, tradit.

*Ne diffusions
Casus, vel
Naturæ vitio,
non Auditorum,
impun-
dant.*

*Cur in me-
dium allata,
& quod ex
his eratur.*

Abstineat mihi hæc dictorum varietates prædictis Auctoribus vitio vertere, quos oculatissimos, & fortunatissimos veneror, & verè ingenuos demiror: Vitia quippe casus potius sunt, vel diffectorum corporum naturæ lusiones, aut illusiones ludicæ: Ea enim in plurimis varietate gaudet, & inconstantia non rarò innitens, summam sibi in hac pulchritudinem, & admirabilem quandam sapientiæ emphasim sibi poscit, parat, augeat. Singulorum porro natura ineffabilis est, & mira in quoque varietas: Cum hoc tamen in essentialibus, & ad actionem quampiam necessariò requisitis eadem Natura semper, nec, nisi coacta, vel impedita, decerrat; & ubi in similibus, quòd tale visitur, monstrum, & præternaturale quid nuncupatur. Sic quæ ad hominis naturam, vitam, dispositionem, situm figuram requiruntur, non genericè tantum, sed & speciatim earum partium, quæ principes sunt, vel Principum ministræ, nunquam aut rarissimè immutantur; quicquid de numero, magnitudine, situ, coloreve aliarum minus principum nonnuquam imò frequenter appareat, ut in venularum, præcipuè externarum, distributionibus, glandium numeris &c. videtur. Has proinde assertorum multiformitates nil ob aliud adduximus, quàm ut ex his venaremur inuentorum ductum non valdè essentialem famularum, nec sic necessarium situm, connexionem, capacitatemq; ut nutritionis summa, (quæ potissimum in sanguificatione consistit), ijs ritè, & rationabiliter demandetur. Nec enim sic (ex ætera) Cauam, vel Portam in suis insertionibus diuersificari, sicut nec intestinorum continuationem, ductum, ac inuolutiones aberrare, cernimus; ut potè quibus alimenti deductio commendata fuit.

CAPVT SEPTIMVM.

Quæ de lacteis, earum succo, & vsu fuerit Bilij sententia.

Hicce duobus Auctoribus in paucis conuenire videtur Ludouicos Bilij celeberrimus, & ipse Anatomicus: Is enim (sic referent Antonio Deusingio præsertim *lib. de chyli motu d. mm. 55. usque ad num. 65.*, & in *differtat. Epistol. de hepat. off.*, ac alibi) adinuenisse, publicèq; monstrasse proficitur, in huiusmodi venas lacteas (quas roriferas appellat) ab intestinis vaporis modo rorida m, seu tenuissimam chyli portionem recipi, eamq; per glandulas mesenterij percolatam partim ad hepar per easdem venulas, partim ad Receptaculum migrare. Hinc non solum thoracicum tubulum ascendente progerminari, sed & infra ad uterum, testes, inguinum glandes, aliasq; partes ramificari; per superiorem verò tubulum non solum in subclauias inseri venas, sed & ramos

ramos ad pericardium, ad mammas, fauces, colli glandes, caput, ac vniuersum corporis habitum ramos demandari, scribit.

Verum hunc non esse chylum, qui in sanguinem possit commutari, sed roridum tantum succum, qui pro partium irroratione, ac refrigerio inferuiat, & arbitratur ipse, & rationibus comprobatur; quarum prima est quod sanguis, quod minus per Cor transierit, eò turbidior, crassior, magisque coagulatus, cernitur; & sic is, qui per mesaraicas abijt chylus, per horam soli expositus, inspissatur, ac vitreus euadit: at is, qui per dilatatum tubulum ad subclauias ascendit, cochleari exemptus, nulla ratione coagulatur. Altera est, quod hic succus per vniuersum corpus æquè, vt in Cor, abire potest; Et ideo non tantum Cordi materia suppeditatur, vt possit sanguis confici, pro toto nutriendo corpore sufficiens. Tertia quod sicuti nemo dixit, succum illum, qui in vasis lymphaticis inter lecur, & glandulas reperitur chylum esse, ita nec alium posse dici chylum, qui in Receptaculum, & thoracicum tubulum progreditur, cum ex iisdem lacteis, eodem modo, & per easdem glandulas percolatus incedat. Quin, & pericardium non posse illius liquoris affluxu destitui, quin animal moriatur, asserit ipse, cum tamen non tanta sit chyli necessitas, quin possit, & per diem integrum, & amplius animal consistere. Tandem se monstrare posse ait, ex copiosa per dies tres, vel quatuor saluatione parum, vel nil talis roridi liquoris ad Cor ex receptaculo peruenire, cum tamen interea, dummodò sufficiens animali cibi, & potus quantitas suppeditetur, nil, vel minimum corpus debilitetur; Ex quibus sibi luce clariùs deducere posse videtur, non chylum, sed roridam quandam substantiam per similia vascula suggeri; Vt ideo nunc tandem constet, Vasa hæc, & si nomine diuersa (nam à Pecchetto lactea, à Bartholino lymphatica, à Bilsio rorifera, ab alijs chyliфера, & fortè aliter nominantur) re tamen eadem, vel annexa esse; quamuis Bartholinus anceps aliquando sit, an lactea, an lymphatica nonnulla sint, vt potè qui cupit priorem tenere opinionem de chyli itinere ad Cor: qui tamen in hoc concurrit, lympham suam eadem vestigia peragere.

Alterum verò crassiorem, & nutritiam chyli portionem per mesaraicas venas ad hepar ire, artificiosissima autopfia commonstrat egregius ille Vir: quandoquidem, vt idem refert. *Deusingius cit. lib. num. 56.* & sustinet in alio opere de hep. off. contra Bartholinum; canem viuum sine ferè sanguinis effusione aperiens, atque venas mesaraicas, arteriasquè secernens, hasce ligat, ne quid sanguinis ab his in illas possit exudare hinc canem, denuò confutum relinquit per quatuor, vel quinque horas, donec cibus, ante sectionem exhibitus, in chylum sit conuersus, eum interea aliquò liquore reficiens. Hinc aperit eum denuò, ostenditquè venas mesaraicas turbido liquore subcineritio, ac quasi vitreo refertas. Hunc autem chylum sic ad hepar delatum ibidem ab

Roridum, succum non esse sanguinis gignendo apertionibus probatur. Eiusdem prima ratio à succi, qualitate.

Secunda ratio à via non ad Cor solum, sed alio pertentia.

Tertia ratio à similitudine succi, qui inter lecur, & receptaculum reperitur cum eo, qui in thoracicum it tubulum.

Quarta ratio à necessitate liquari pericardij.

Quinta ratio ex pauca illius succi quantitate ad Cor ob continuam saluationem perueniente.

Chylum nutritum ad hepar ire per mesaraicas venas experimentum Bilsianum.

eo in cruorem commutari clarè ostendit, obseruando sanguinem citra hepar, idest in Portæ vena existentem multò magis spissum, ac turbidum esse, quàm qui hepar transgressus in Caua vena reperitur.

Deusingij ex-
ceptio à Bil-
liana senten-
tia rejicitur.

Et quamvis Deusingij aliquod dubium faciat ille motus lymphæ, qui videtur non à glandulis ad hepar, sed ab hoc ad illas esse, sicuti, & ab artubus ad interiora, vt per ligaturas probant alij Anatomici, ac præsertim Bartholinus; item & quod non omni nutriendi facultate rorem hunc prorsus destitui, sit opus: attamen hæc illius opinio est, non fundamentum rationis (qui vellet ab huiusmodi roriferis vasis viam chylo conseruari à mesenterio ad mammas, & ad vterum profectu nutriendo, & pro generatione lactis): cum ligaturarum experimentum nil certi probet in vasibus, quæ contrarios succi motus sine vlla difficultate molliuntur, & in laniatis animantibus, in quibus omnia ob mortis pauorem inordinatè fieri, supponere licet.

Huc veniant nunc, qui totam probationum vim sensibus tribuunt, rationem ex altera nihili pendentes, videantq; quantum sensatæ ille tot Virorum experientiæ, tum qualitatis, tum motus, tum viæ succi huius, ac eius continentium vasorum discrepent, ac euacillent. Nonne omnes hi oculatissimi obseruatores? nonne & omnes, perspicacissimi Anatomici, manus, oculos, & ligaturas agnouerunt, intenderunt, exercuerunt? Et quid ergo est, quod tot audiunt etiam in sensatis varietates? fallax nimium sensus est, & ni rationi obtemperet, aspernendus. Discant igitur hi omnes, sentire quidem sensus; at percipere, quid sentiant, mentis hoc esse, & principis facultatis opus: videt namq; oculus album, nigrum, sed hoc discernere, menti incumbit, & rationi: proinde dolentes parte aliqua dolorem non sentiunt, si mens absit, vel ægroter.

Si noua va-
forum sobo-
les danda sit,
quisnam eo-
rum vius ex
opinione Au-
storis statuen-
das sit.

Equidem si nouum lactei seri affluxum, si nouam vasorum sobolem à se ipsa consistentem concedere opus sit, ingenuè fateor, me huic sententiæ libentiùs subscripturum, vti quæ experimento innixa, rationi optimè omnium notericarum inhæret. Scilicet corpus nostrum duplex necessariò habet effluuium, vnum quidem ab intrinseco principio, nempe à nativo calore, qui humiditatem primogeniam, veluti lychnus oleum, viuendo absumit; alterum ab extrinseco ambientis, ventorum, ignis, solis, stellarum, motusq; calore, aut attritione, expressione, penetratione &c. quæ omnia semper dissoluunt, siccant, tabefaciunt, Ideo non absolum, si Natura prouidisset duplicem quoque instaurationem, vnam scilicet substantificæ, & calorificæ humiditatis, nempe ex sanguine; alteram rorefacientis, humectantisq; actualiter, & simul quoquo modo refrigerantis qualitatis, ex tenhi, rorido, ac subfrigido succo: Quandoquidem, & vilemus, duplicem quoq; nobis Naturam indisse appetitum, famem nempe, ac sitim, per quas cibi, ac potus egestas indicatur; illius quidem calidi, solidiq; & alimentosi, huius autem liquidi,

tenuis,

tenuis, abluentis, ac nonnunquam refrigerantis; vt duplici quoque iam dictæ instaurationi satisfiat. Et quamuis vtrique simul, & semel vt plurimum soleamus intentioni inseruire: non deest tamen, quin aliquando seiunctim, & appetatur, & impleatur vtraque, vel cibi solius, si multa in corpore subfit humiditas, vel potus, si nimia siccitas adsit, vt in febribus accidit aliquando, & in magnis æstibus, sudoribus &c.

Quamobrem, quamuis rationabilis sit, sicuti eodem tempore cibus, potusque assidue vt plurimum, ac in idem vas deglutiuntur, ita & per idem iter vtrunque simul ad alenda, irrorandaque membra deferri, hoc est per venas: attamen nec penitus extra rationem esset, quemadmodum separatim, vt diximus, quandoque appetuntur, summuntur, ac dispensantur, & quemadmodum variis finis amborum, varia substantia, variaque egestas constituitur, ita & varium esse iter, variaque vasa excipientia. Nec incongrueret, aut confunderet quicquam hæc varietas: quia, si detur, (vt dari necesse est), nil ad membra iuuanda naturaliter ire, nisi per attractionem, quæ à naturali, vel animali appetitu prodeat, non mirum, per varia quoque vasa varium succum ab egentibus partibus attrahi eò vsque, donec ad radices, quæ in aluo sunt, & ab intestinis exugunt, perueniatur.

De hac autem partium, ac Cordis irroratione suum veritati seruo locum, libenter, quoties huiusmodi Bilfsianæ ramificationis publica, & authentica habeatur fides, illi me dediturus. Interim verò Antiquorum opinio æquius subscribere ducens, nec tamen Bilfsij auctoritati repugnans, (quæ à Bartholino etiam amplectenda videretur) chylum ad hepar rectè progredi, non ad Cor, manibus, pedibusque contendam; in glandulas verò solam seniores partem vndique corruari, acervari, contineri, ac opportuno tempore, vt dicetur, distribui, & educi, autumabo; Contentus pro nunc admittere, varijs corporis transfluxibus varios ductus, ab Antiquis nonnunquam cæcos dictos, nonnunquam poros, nonnunquam cauitates; vt alienum non sit, eos à diligentissimo Artifice posse inueniri, describi, ac vsus adnotari, quemadmodum cæpit Asellius, auxit Pecquetus, addidit Bartholinus, et forsan Bilfsius perfecit. At quod nutritionis iter, & sanguinis propagatio, res adeo vniuersalis, & patens, per sic cæcas vias pergat, hoc incredibile puto, & nullatenus admittendum.

Sed & per venas totam chyli massam in Iecur, & à Iecore in totum corpus dispergi, verior dictar opinatus; nam multiplicare entia præter necessitatem, pauca signum providentiæ. Si autem per idem os, per eundem ventriculum, per eadem intestina, & vt plurimum (maximè sanitatis tempore) eadem hora, ac ad eadem membra vtriusque; reoscillationis materia deportatur, verosimilius quidem est, etiam per eosdem canaliculos eam progredi semper; maximè cum tenuissimum possit reliquo pro vehiculo inseruire; sicuti & sese inuicem contemperare: quare

Quodammodo Bilfsij opinio approbatur.

Antiquorum tamen opinioni equius subscribitur.

Totum chylum per venas in Iecur ab hoc quod totum corpus dispergi opinio verior.

quare & videmus, si mittatur sanguis, semper cum eo adesse serum.
Vasa item lactea, Auctorum suorum testimonio in venas multoties sefe
insinuunt (vel verius ab ipsis dimanant) itaut in illas eorum succus ef-
fundatur: cur ergo non in illas ingreditur primò?

CAPVT OCTAVVM.

*Et si dentur vena lactea, & Pecqueti receptaculum, chylus tamen
ad Iecur, non ad Cor traducitur.*

AT quid quæso, ijs visis, ac consideratis opinionum dissensionibus, iudicare licet? Equidem dictorum varietas, attestantium dissensio, ac attestationum inconstantia, multum de fide detrahunt: rerum autem novitas non sic vacillantia probationum genera pro sui propagatione exposcit; nec clarorum negatio valde credulos audientes rededit.

*Et lactea, &
Receptaculi,
& lacteus tu-
bulus thora-
cicus adfunt.*

Hoc verò non obstante, dicendum est, huiusmodi adesse venulas albas, tum in mesenterio, tum alibi; necnon Receptaculum, glandosum nempe corpus; ac etiam ascendentem ab eo canaliculum per sinistram spinæ latus supra ad sinistram venam axillarem pergentem; eaq; aliquando plena conspici albo succo, & plerunque sero, si animal adhuc vivum scindatur, vel homo adhuc calens, & subito strangulatus quatuor, vel quinque horis post partum anatomicæ secespitæ subijciatur. Sic videtur admittere Ioannes Riolanus in suis ad Pecquetum responsionibus. Sic testatur Carolus le Noble in suis *observat. de Lact.* Sic Plempius, Galtracchius, Bilsius, alijque Authores multi. Sic novissimè mihi testatur Excellentissimus, omniq; vera laude dignissimus Hercules Marchellus, Medicus Genuensis, qui, se multis in cane vivo dissecto palàm ea ostendisse, ad me scribit; Sicuti & præstantissimus, nec unquam satis laudatus Vir, Bartholomeus Torrinus, Medicus, & Philosophiæ primarius Lector Tautinensis, de eisdem fidem facit.

*Circa Recep-
taculi descen-
sionem va-
rietat Autho-
rum.*

Solummodò pro nunc alia Authorum discordia in Receptaculo designando consideratur, cum Bartholius tres glandulas vt plurimum asserat esse; Pecquetus quoddam corpus spongiosum, membranosumq;
„ Riolanus magnam quandam glandulam; Carolus Nobilis corpus
„ vacuum, cellulis diuisum intus, membranis tenuissimis obuolutum,
„ molliissimis glandulis distinctum, copiosa circumfusum adipe, in sinu
„ taque implicatæ fibrillarum multitudine.) Itaut quot capita, tot habeantur de eo testificationes. Nisi velimus dicere, eos Auctores simul conciliari posse hoc modo, quod Bartholinus censuerit, Receptaculum chyli propriè esse illas tres, vel plures glandulas dorso alligatas; Pecquetus & Carolus non glandulas solas, sed & membraneum, ac adiposum illarum involucrium; Riolanus autem magnum corpus glandosum ex varijs glandulis efformatum.

Vt cu-

Utunque tamen sit, & his omnibus concessis, non sic facillè negare debebant ij duo præstantissimi Viri Pecquetus, ac Bartholinus, chylum ire ad hepar; nec alij sic statim admittere, chylum partim ad hepar per lacteas, partim verò ad Cor per insinuatam viam thoracicam ascendere: Nam illud primum negari non potest, cum clarissimum esset testimonium Galeni, Valesij, Vesallij, Falloppij, Curtij, cæterorumq; veterum Medicorum, ac Anatomicorum illustrium, à vena Portæ plurima produci ramusculorum ora in ventriculi, tenuiumq; ac crassorum intestinorum internam sedem hiantia, ut chylum ab ijs excipiant, ac fugant; & ea diuersa ab alijs venis, quæ dictarum partium nutritioni inserviunt (hæc enim non intrò penetrant, nec hiant, sed per earum partium substantias variè insinuantur,) ut videre est in figurato, & fusè explicato Portæ venæ apud Vesallium exempla, & in configuratione verbali Galeni 4. de vsu part. 17. 19. & 20. necnon 6. de placit. Hipp., & Plat., Et ut Bilsius nouissimè citatus oculis cuiusque subijcere spondet in intestinis balsamo conditis, quæ apud se habet, in Respons. ad obseruat. Barbettij num. 5., ut notat Densingius dicto lib. de hepar. off. pag. 212. Per hæc enim oscula congruum erat putare, dum per ipsos recens supponitur, venas omnes ab earum finibus ad Truncum versus Cor fugere, vel potius excipere, vehereq; etiam chylum posse ad hepar traduci, nil rubedine venarum obstante; quæ ab arteriarum anastomosibus iuxta per illos admissas circulationis leges foueri poterat. Præter quàm quod per Lacteas quoque ipsas in Portæ caudicem, & in hepar immediatè insinuatæ, quæ ab Ascellio antea, & ab alijs postea figuratæ, ab ipsoq; Barthol. admittæ fuerant, permittere etiam chylo transitum debebant; nil ligaturarum experimento contrafaciente, ut ex quo difficillimum est motum naturalem indicare in vasis, quæ utrinq; continuantur, & in emoriente, ac præter naturam se habente alligatis, vellicatis, ac intortis.

Secundum verò nec sic liberè admitti debebat: nam lactea vasa, præter paucula à iccore immediatè prædeuntia, esse eiusdem Portæ venæ soboles, inficiari minimè possunt, cum à venis mesaraicis plurimæ producantur, & capillorum modo (vt ex Veterum placitis, Tractatum insequendo, insinuabitur) partim in glandulas insitæ finiant, partim in interanea penetrent. Cætera verò, quæ alibi disponuntur, nonnè tùm Cauæ, tùm ramorum eius germina esse, iustè dubitari potest? quippè ea cum dictis venis coire, inseri, interaneari, omnes illorum consistuntur Inuentores; Ut proinde meritò dicere liceat, lacteas venas cum sanguiferis eiusdem generis esse omnes. Aliiter, cur illæ in has penetrant? Et quis iustè scit, nùm ibi sit illarum principium, nùm verò finis? nùm potius à venis trahant, nùm ad illas deferant? Nerui, arteriæ, ut sunt diuersi generis vasa, diuersaq; principia nanciscuntur, ita nec in se mutuo penetrant, coeunt, inferuntur, nec in venas. Sed & sicuti tria tantum corporis principia ponuntur, ita tria esse illis, ac toti inserviientium

Nis omni-
bus datæ,
chylus ad
hepar, non
ad Cor mi-
grat.

Lacteas enim
alijs venis
esse eiusdè
generis. pro-
bat.

ductum sola genera, est arbitrandum: nec enim rami sine trunco, nec truncus sine principio. Neque hic aliquis dicat, principium earum esse Receptaculum: nam nec ad id omnes lacteæ continuantur, nec ab eo truncus aliquis exit. Sed & plurimas illarum esse venarum, mesaraicarum germina, tradit *Riolanus in Opusc. non. contr. Barthol.*, & confirmat. *Deusing cit. Opere de chyli motu, & alijs.* Quemadmodum Hyperus, ac Regius eas iuicem confundit, & coire in ipso pancreate arbitrantur. Si ergo plurimæ mesaraicarum sunt, reliquæ aliarum venarum germina erunt: nam eadem specie debet esse vnus speciei origo, idemq; progermina. ionis modus. Quæ verò pro, et quæ contra hanc positionem dubia afferri, & quomodo dissolui possint, ponitur infra capitibus 15. & 16.

Quedam venarum iecoris, & Pancreatis confluit à Faloppio adducta.

Adde his, quod præter canaliculos, qui à supracitatis Auctoribus VVallæo Higinoro, Afellio, &c. ponuntur à Pancreate ad Iecur peruenire, alia quoq; non incelebris confluxio ab eodem emanat, à nemine, quod sciam, præterquam à Faloppio, animaduersa in sua *Anatom. pag. 17.* & his notis depicta: Aliquando reperiuntur rami venarum à Portæ truncopar hepar disseminati, qui ab extremo apice sinistræ fibræ ex hoc viscere egrediuntur, & per ligamentum, quo in illo latere hepar aliquando septo transuerso iungitur, repentes, atq; ipsi septo communiati descendunt per posteriora, ad dorsum vsque, ibiq; iunguntur sub pancrea cum quibusdam alijs venis ab eodem Portarum truncopar extra hepar obortis. Ad quid autem hæc vasorum vnio, nisi pro nutrimenti, & succorum communione?

De tubi illius rarietate originis vel finis dubium.

Insertio autem tubuli thoracici non in Cor, nec in Cauam sub, vel propè Cor, sed in axillarem sinistram tantum, & rarissimè in dextram fieri, ab omnibus ponitur, nec vltra in venis latè obseruatur, aut ipsius motus cernitur. Et sic de eo eadem viget dubietas, num scilicet ab axillari sit illius origo, & in Receptaculum terminus, nùm è contra: in quo definiendo, si quid exempla valeant, primum potius definiendum erit: siquidem eundem ortus modum, eundemq; ad inferiora progressum per Spinæ dextram agnoscit *Arygoz* vena, sine pari dicta, quæ supra Cor à Cauæ dextro latere conuascitur, & infra Iecur, vt Faloppius aduertit, in Cauæ ramos inseritur. Quis verò dixerit, Eam infra suum habere principium?

Quid de lacteo fluco in Receptaculo & lacteis re. vero dicat.

Quid ergo ex depicta lactei succi vbertate, per thoracicum tubulum sectionis tempore mota, arguere possumus aliud, quam spinalis medullæ, vertebrarum, neruorum ab ipsis prodeuntium, eiusdem glandosissimi tubuli superfluum exalimonia lacteam serositatem, quæ multis pro corpore vñibus possit inservire? Et quid per sic facile latitantem furculum, quo non est minor quælibet ad pedes, & manus diducta vena, de chyli ad totius nutrimentum parandum destinati deductione concipere, vel sperare possumus? Quid quæso aliud ex reperto quoq; in lumbis, &c.

sed mesentericis glandulis lacteo humore arguere licet, quàm earum pinguium, glandosarum, & membracearum partium confectum alimentum, vel in eas ab adiacentibus attractam serositatem? Et quòd ex dictis glandulis, quæ semunciam, vel paulò plus lactei feri pro qualibet in seipsis recondere valent, de chyli traductione in corpus alendum pingere, vel cogitare quimus, cum ipse, in ventriculo confectus, in intestinisq; (facibus seiunctis) iuncto sero, cæterisq; excrementosis humoribus, quos cum ipso ad secundum coquiltium ferri, omnibus innotuit, ad libras pondere ascendat? Et quid credulitatis ad id perhibet illa exilitas vasculorum ad Receptaculum procedentium, eorumq; in ipsum introitus, sola ratione, & imaginatione discretus, vt idem testatur *Barthol. cap. 6.* verbo Connexio? & ex altera tot vasorum à mesenterio in Portam, heparq; prouentus? Mihi quidem hic modus similis videretur eorum intellectioni, qui latas vias prætereuntes, in semitulas, & varicosos viculos se coniungunt. Nisi forsan dicremus, necessitatis tempore, obituata scilicet via hepatis, Naturam posse hac semita aliquid chyli ad Cor traducere; quò animal eo meliori, quo licet, modo interim nutriatur, prout reuera ingeniosè opinatus est *Riolanus* in suo nouo iudicio de ven. lact. etiamsi tunc nec deesset alia via per supracitatum venarum mazandrum, à *Faloppio* descriptum.

Necessitas
tempore per
lacteam se-
mitam posse
chylum aliquid
ad Cor de-
duci, admit-
titur.

Præcipuè autem hæc conuincuntur, si vera sit tùm *Riolani*, tùm *Bilij* Autopsia, qua ab ijs lacteas non solum supra ad subclauias, venas, sed & ad inferiora tendere, relatum est. Si enim chylus ille succus esset, & ad Cor deducendus, cur ad inferiora veheretur? & cur superius non ad Cor tantum, sed & ad mammas, & caput? & cur vaporis modo in lacteas ab intestinis pertransit, tenuissima, quamuis aliquando alba, consistentia donatus? Sed iam tempus est, vt ad dictorum enucleationem, & probationem deueniamus.

CAPVT NONVM.

Lactæas venas, chyliuè receptantes glandulas Veteribus quodammodò innotuisse, probatur.

HIC itaque animaduertendum in primis nobis est, huiusmodi glandularum, lactearumq; venarum nouum non omnino esse inuentum, sed & antea, & antiquitus quodammodò innotuisse. Illud solummodò, meo iudicio, nouum, quod à Modernis Auctoribus datum est de dictis partibus, earumque proprijs officijs, ac vñbus iudicium: Etenim, si legatur *Hippocrates lib. de gland. num. 3.* ibi hæc habet: Glandulæ autem in intestinis maiores sunt, quàm alibi in corpore, & pascuntur humectationem nimiam ex intestinis exprimentes. Habent præterea etiã renes glandulas: nam & hi multa humiditate exantantur.)

Hippocrates
de lacteo
glandularum
succo, & ea-
rum venulis
sententia.

Sed clarior, & ferè Neotericorum adiunctionem diuinans, sub num. r. de prædictis glandulis, de earum venulis, & albo succo mentionem facit, dicens: De glandularum naturæ sic habet. Natura ipsis est spongiosa: sunt enim raræ, & pingues, & neque carnes sunt reliquo corpori similes, neque aliud quid simile corpori: sed friabiles sunt, & venulas multas habent: Si verò disseces, sanguis largus erumpit specie albus, & velut pituita. Tangenti autem velut laxæ apparent, & si multa vi ipsas digitis compresseris, glandula humorem oleosum remittit, qui & ipse conteritur vt plurimum, ac disperit.) Quæ sententia, si cum grano salis ponderetur, videbimus, adunguem omnia describi in glandulis, earumque venis genericè, quæcunque hi nostri aui Auctores in suis lumbaribus nouerunt, aiunt ipsi, inuentis obseruauerunt, tam quoad venularum implantatarum copiam, quàm circa album illarum succum, illiusque facilem euanescentiam, & oleositatem, a multis in impluuiio dissecto adnotatam.

Huius rhe-
mæci tabuli
commemo-
ratio quadi.

Sed & de tubulo thoracico, in sinistra clauiculæ parte à vena Cava suborto, nonnè idem Hippocrates lucem quandam lib. de off. nat. num. 14. exhibuit? Cæterum (inquit) hepatis vena in lumbo vsque ad magnum verticulum infernè etiam verticulis se ingerit, inde sublimis eleuata per hepar, & per septum transversum in Cor; & hæc quidem rectà ad clauiculas procedit. Inde verò aliæ quidem ad collum, aliæ ad scapulas, aliæ deorsum reflexæ iuxta verticula, ac costas declinant, à sinistris quidem vna propè clauiculas, & dextris autem in quendam ipsarum locum.) Cum autem Anatomici vulgariter ex hac sublimi Cauæ sede nullam aliam venam; deorsum reflexam; versus lumbos deriuent, quàm à dextra parte eam, sine pari distam; Hippocrates autem hic aliam à clauicula sinistra cò tendentem nemoret; patet, non de alia, quàm de albo hoc sinistro tubulo posse loqui, & sic per Eum nò à lumbis sursum ad Subclauias, sed e contra à subclauijs deorsum ad lumbos talem ductum commigrare; Ipsum enim venas nominare eas etiam, quæ album fundunt sanguinem, ex proximè anteriori citata sententia de gland. num. 1. constat.

Galenus de
pancreate,
glandulis, &
earum venis
sententia.

Si legatur itidem Galenus, is non semel magni glandosi corporis, & cæterarum mesenterij glandium, venularumque, ad eas effluentur distributarum meminit. Sic 4. de vsu part. cap. 19. hæc leguntur: Primò namque (scilicet natura) toti mesenterio venas effecit proprias, natriendis intestinis ipsi dicata, haudquaquam ad hepar traijcientes: Verùm, vt Herophilus, dicebat, in glandulosa quædam corpora desinunt hæ venæ; cum cæteræ omnes sursum ad Portas ferantur.) Vides hic, Lector, quomodo Galenus è viuo eas pingit venulas, quas ab intestinis in Pancreas, & glandulas desinentes describere Asellius, Pecquetus, ac Bartholinus. Sic lib. de dissect. ven. & art. cap. 1. hæc ait: Sunt autem & aliæ venæ in tenuiorum intestinorum medio me-
senterio,

„ fenterio, quæ ad glandulas quasdam ea regione positas pertinent.)
 „ De glandulis verò sic loquitur *lib. 5. de usu part. cap. 2.* Magno indi-
 „ gebat locus hic præsidio, quo vasa in ipso distribuenda, ac discinden-
 „ da munirentur; Cuius haud ignara Natura glandulosum quoddam
 „ corpus fabricata, quod Pancreas appellamus, substrauit, ac in omni-
 „ bus circumdedit, diuisione quæ repleuit, vt nullum ipsorum facile iam
 „ findatur, aut sine fulcimento sit.) *Et lib. 4. cap. 2.* Plurimis verò
 „ vasorum, quæ admodum sublimia, atque erecta ad hepar porrige-
 „ bantur, quæ mutuo coeunt, hanc ipsorum partem iniurijs magis ob-
 „ noxiam cum exploratum haberet: corpus quoddam carnisforme in-
 „ seruit, quas glandulas appellamus, quæ vtique, velut cunei quidam,
 „ vasorum diuisionibus incubantes, fulcimentum ipsis tutum sugge-
 „ runt.) Ex quibus locis patet, Galeno notissima fuisse pancreas, glan-
 „ desque alias, & venulas ad ipsas pertinentes.

Idem de Vessallo dicendum: nam *lib. 5. de corp. hum. fabr. c. 6.* in mesen-
 terij centro magnum corpus glandosum esse, docet, vbi primas vasorum
 distributiones fieri, asserit, & in qualibet vasorum scissione alias glan-
 dulas disponit, præter magnum pinguedinem ipsi mesenterio vndecunque
 connatam; quarum vsum esse ait, vt tutissimè vasa ad intestina dedu-
 cantur, & vt dorso intestina aptissimè colligentur. Illius series hæc est:
 „ At proinde ad mesenterij quidem centrum, vbi prima vasorum sit di-
 „ stributio, grande corpus glandosum extruitur, insigniores, ac primas
 „ vasorum dissectiones securè admodum suffulciens: Per reliquam verò
 „ mesenterij sedem singulis propè vasorum ductibus Natura glandu-
 „ lam quoque aliquam interiecit diuisionis robur simul ac firmamentum
 „ futuram. Adeo vt simul quoque glandulis illis accedentibus, mesen-
 „ terij membranæ vasa versus intestina tutissimè deferant, intestinaque
 „ omnia dorso quàm aptissimè colligent.) Quibus vltimis verbis, sicuti
 „ & primis illis annuere videtur nouum hoc dictum chyli Receptaculum:
 „ nam magnum corpus glandosum, & primæ vasorum distributiones, &
 „ dorsi, ac intestinorum colligatio nil aliud, quàm dicti Receptaculi sub-
 „ stantiam, magnitudinem, vasa, situm, & connexionem, à Iunioribus
 „ adnotata, describere videntur; cum de cæteris mesenterij glandulis ea
 „ intelligi minimè possint. De ipsarum verò glandularum vasculis ibidem
 „ hæc protulit verba: Quemadmodum vel illi Portæ venæ remuli
 „ ostendunt, qui variè per omenti membranas intestinis instratas ex-
 „ currunt, & qui in omenti, & mesenterij glandulas terminantur, ne-
 „ que ultra incedunt, soliq; ita nutritioni famulantur.) Sicuti & eodem
 „ *lib. cap. 5.* hæc eadem habet: Neque etiam vasa, quamadmodum in
 „ duodeno, secundum ieiuni, & illi longitudinem deducuntur, sed velut
 „ ex mesenterij centro ex alto sursum tendunt, rectâque antroorsum in
 „ intestina pertingunt, in quæ numerosa sobole arboris radicum modo
 „ implantantur, oculis suis in internâ intestinorum sedem inhiantia.)

Vessalli de
 glandoso cor-
 pore, & ve-
 nulis dicta.

Iple etiam *lib. 3. cap. 6.* iam citato mæzareon à Gaza in Aristotilis interpretatione Lactis nomine donatum fuisse, a firmat, sicuti reuera apud *3. hist. anim.*, & *4. de part. anim.* legitur. Sed & *lib. 3. cap. 5.* à quibusdam venam Portæ lacteam appellari, testatur, eo quod succus (ita loquitur), quem desert ab intestinis iecori, lacteus sit. Id quod ex alio effectum non est, quàm quod antiqui Romani, qui Dijs sæpè agnos, & alia armenta immolabant, & ferè viuientia, ac adhuc calentia exenterabant, non rarò viderint, in mesenterij glandulis, earumque venulis copiosum lacteum succum detineri, vt bene aduertit Riolanus in sua responsione ad Pecquetum, & Pecquetianos.

Salop. Mûd.
Mercati. &
Zacut. sententia.

Faloppius quoque, & Mundinus nil minus silent, quàm in mesenterio, & præcipuè in eius centro varias adesse glandulas. Ludouicus Mercatus *Tom. 1. lib. 1. quæst. 114.*, & Zacutus *Lusit. lib. 6. de Med. Prin. hist. histor. 6.* de mesenterio optimè huius glandosi corporis meminere, de cuius usu eadem amborum sententia fuit. Huius ultimi verba hæc sunt: Hoc corpus glandosum in postrema ventriculi regione versus spinam repertum, duodeno intestino adhæret, quod quia quandam carnem, & diuersam naturam à mesenterio representat, Pancreas, tam Græcis, quàm Latinis appellatur, cuius utilitas est, vt ramos venæ Portæ ventriculo, & lieni distribuendos (Mercatus addit duodeno) securos reddat: deinde vt ventriculo tamquam molle substerneculum subijciatur.)

Varij apud
Veteres, præter
venas
memorantur
meatus.

Quin etiam, præter ordinarias sanguifluas venas, alia permulta adesse in corpore humano vascula ad succos deportandos, fluxiones accipiendas, & decubitus adiuuandos idonea, optimè agnouisse Veteres, potissimum Hippocratem, tam certum est, vt nil magis apud eum decantetur, quàm illud Confluxio vna, conspiratio vna &c., sicuti & apud Galenum quamplurimos in corpore cæcos adesse ductus, inconspicuos meatus, poros, cavitates; & exinde vniuersas partes inuicem conspirare, recipere.

Idem esse
Antiquorum
Pancreas cū
cæteris glandulis,
& nomen Receptaculi
in eodem am-
bigi potest.

Ex his ergo, & alijs, quæ possent afferri, Antiquorum dictis; & ex Recentiorum Auctorum supra indigitatis dissensionibus circa figuram vocati ab ipsis Receptaculi, non leue argumentum desumi potest, idem illud esse cum glandulis tum Hippocratis, tum cæterorum, & præcipuè cum pancreate dicto: Ideo non mirum, si Pecquetus, suo Receptaculo descripto, dicit, se postea quæsiuisse Antiquorum pancreas, sed non inuenisse. Bartholinus autem supra visum est, quàm multiplex in glandulis suis numerandis, situandis, describendisquæ fuerit. Quare & situs, qui glandulis, & Pancreati ab allatis natu prouectis Auctoribus attribuitur, nempe post ventriculum propè Spinam; & substantia, quæ earum describitur; & magnitudo pancreatis, quæ Pecqueti sensum superfugere non debuerat; & glandularum multitudo à Bartholino posita, indignant, eandem quidem rem esse, sed tantum nomenclatura, & officio nouiter

uiter ijs adscripto, & succo, in eis certis horis animaduerso, dissidentem. Sed quomocunque sit, illud saltē constat, nouum hoc Receptaculum sub nomine glandularum ab Hippocrate, & Sequacibus mesenterio, intestinis, renibus, lumbisq; assignatarum aptē comprehendī.

Quemadmodum, & satis probatum mihi videtur, etiā Veteribus Anatomicis, & Hippocrati ipsi cognita, & visa fuisse lactea vascula. Solummodō, cum tamquam notissimum cunctis esset, eorum alia ad Iecur deferendum chylum, à ventriculo, & intestinis exsuctum; alia verò ad Pancreatis ipsius, mesenterijquē, & intestinorum nutritionem dicata, ideoq; non curauerint, certis horis plurimos capillares canaliculos succo albo plenos, cæteros verò adhuc sanguinē repletos reperiri; hanc peculiarem, ac indiuiduam distinctionem digito monstrare, & nōtante circumscribere non sunt aggressi: sed omnia venarum cauala in genere, vel ad dictarum partium nutritionem continendam, scū deferendam; alia verò ad solum chylum iecori referendum nata esse, prouentiarunt; nunquam animo concipientes, posse chyli translationem per nouissimē notatum tubulum, propē Spinam hærentem, ad superiora Iecora prætergresso fieri, prout hi Neoterici Doctores his temporibus lata fronte proferre non horuerunt.

Quibus quidem immortales habendas esse gratias, ex animo fateor; ut qui, iugi sua perquisitione, ac solertia horum vasculorum processus, alias inuisibiles nominatos, cunctorum oculis subiecerunt lucidissimē perspicendos, & quæ alij sub genericis cæcorum meatuum nominibus ambrauerant, specificē nobis ad oculum designarunt. Summa ob id laude dignissimi, ni præceps de illorum succo, itinere, vsuē datum iudicium tanta, & tot Medicorum dogmatum reuolutione, & Reipublicæ Medicæ iactura, nimis mordicū tueri fategissent.

Quandoquidem, si talis de chyli semita, & hematosi detur Pecque-
riana enuntiatio, mirum, quot rerum inuentiones, quot paradoxa, & quot introductæ in Medicina praxis eliminationes succedent: Iecori enim uenia data, non iecoraria, sed cordialia tantum in læsa sanguificatione remedia administranda. Et qui roboratio, ad localia medicamenta addita, dextro hypochondrio proderit, aut exquiretur? Quæ pro nutritione iuuanda iecoriorum necessitas? Quæ pro hepaticis fluxibus in apertione deobstructionequē vtilitas? Et verò si cæteræ ab Ipso, & Sequacibus additæ consequentiæ addantur, miraculum est, si quicquam de Theorica Medicinæ parte intactum pacatumquē remaneat, quin mille succussionibus omnia reddantur obnoxia: Hinc enim, & à chylo, non ab alijs venis, non à sanguine lac, semen, fatum, eiusquē in tero alicionem aucupantur. Nec de sunt, qui ex hoc sanguini, etiam eniam dantes, chylo immediatē corpus, aut saltē solida membra enuiri, asseuerant. Ab his vasis lachrymas, saluationē, pericardij aquam, ænium succum, vrinam, sudores, nonnulli eliciunt. Alij facultatem attracticem,

Saltē animi
sub nomine
glandularum
& hoc com-
prehenditur.

Quodammodo
etiā la-
teat Veteri-
bus cognitum

Quæ Arti præ-
iudicia à Pec-
queti, & Bar-
tholini thesi-
bus asseran-
tur.

attracticem, retentricemquē exterminantes, soli impulsioni tūm alimoniam ipsam, tūm excretiones omnes commendant. Isthinc ad perennem, & velocissimam sanguinis circuitiōnem admittendam necessario ducimur; à qua quot circa pulsus essentiam, causam finem; circa respiratiōis ideam, & efficiens; circa sanguinis depurationem, partium plurium vsus, excretorios canales, spirituum essentiam, originem, ac ductum, sanguinis naturam, humorum aliorum genesim, membrorum temperiem, succorum motus, ac alia multa Veterum Medicorum dogmata; quot inquam commutationes, diffensiones, confusiones, & contorsiones emanent, vix cogitari, nedum dici potest. Hoc dixisse sufficiat, nouas, ac diuersissimas totius Medicinæ Institutiones requiri; quales iam apud Gotofredum Moebium inuenies, non ob aliam rationem formatas, quàm vt nouæ hæmatoseos, nouæquē de sanguinis circulatione doctrinæ cuncta adaptentur; Quasi verò non prius de illarum veritate sit ampliùs disceptandum, sed citra controuersiam aliquam ab omnibus sint illæ acceptandæ, prioribus (quæ tamen adeo solidæ sunt), vt discolis, eliminatis. Non sic verò sicco pede transitur hyems. Quæ solida, diuq; radicata sunt, non cuilibet, etiam validæ concussioni cedunt.

Quid interim faciant Iuuenes, iam iam in tot ambages ideo inuoluti, vt suis interdum dissidentes ingenijs, & tot nouitatum mole perterriti, cogantur, Rationali Medicinæ Pōtione seposita, ad Empiricam se totos dedere, cum magno Artis dedecore, & Aegrotantium ineluctabili damno? Tot proinde passim insurgunt Medicastrī, qui, quibusdā in solis proprietarijs medicamentis hærentes, omnes vno colopodio calceant, nec ab horrore febrem, nec à bile pituitam, nec turbith ab elleboro distinguunt. Sed iam tandem ad rem descendamus.

CAPVT DECIMVM.

*Chyli per Thoracicum tubulum traductionem nulli ex suppositis
vīsibus inservire posse, probatur.*

Hisce præhabitis, iam tempus demonstrandi est, hancce nouiter insinuatam viam non esse chylo ad superiora vehendo idoneam, minusquē ad ipsum Cor; vt tandem illud certò eruatur, concludaturquē, chylum non hanc modernam, sed iam per tot sæcula calcatam hepatis viam peragrarē; succum verò in vasis lacteis contentum chylum reuerà minimè esse, sed quid aliud, vt postea dicitur. Illud autem quadruplici in primis modo mihi probare posse, videor. Et primò, quod similis chy i traductio nulli vsui ex aduersò suppositis ritè inservire debet, aut potest. Secundò, quod nullus datur conueniens, aut sufficiens modus illac chylum traducendi, minimèquē omnium à Pecqueto dispositus

Chylum non
ferri per In-
test. ad Cor,
quadruplici
via proban-
dum propo-
nitur.

situs

fitus. Tertio quod non sufficit dictus tubulus ad totalem illius translationem; bipartitio autem sanguificationis est incongrua, ideoque nec danda. Quarto tandem, quod hac etiam data, frustratoria, vitæ perniciofa, & ineffabili Naturæ cognitioni deformis effet hæc actio.

Vt igitur à primò incipiam arguendi modo; Vfus, cui à Pecqueto, ac alijs talis chyli traductio dedicata est, non alius extat, quàm vt à subclauis venis, medio recurrentis sanguinis, in Cor feratur, ibique à nativo illius validissimo calore mutetur in sanguinem, corpori alendo per arterias deferendum: Qui tamen vsus nullo modo admittendus est: præmisso enim, ac solemniter priùs protestato, ex supra, nimirum capite primo, ac secundo, allatis rationibus, (quibus nec satisfactum, nec pro virili satis fiet), Cordi non competere sanguificandi opus, nec ab ipso posse, aut debere exerceri; itaut ex hoc capite, & ad hoc inutilis, ac frustratoria esset ad ipsum quævis chyli traductio; Dico vltèrius, quod sic nimis vanam, insciamquè se patefaceret Natura (quæ tamen tantoperè ab Hippocrate, Platone, Aristotele, Galenoquè laudatur, prædicatur, & in sua providentia suspicitur); vtpotè quæ sic lentè, & per adeo longum circuitum, ac angustum aditum voluerit à ventriculo, & intestinis chylum excoquendum Cordi porrigere; cum saltem potuisset (si quidem lecur erat in transitu prætermittendum) tubulum thoracicum non ad subclauias, sed à axillares venas Cordi superiores, ac laterales, sed ad Cauam infra Cor inferere, vt per ipsius foramen posset citò in eius ventriculum chylus acceptari, foueri, & concoqui: si enim ad Cor illi erat eundum, Cor antea illud prætergredi? Si immixtus eò iturus requirebatur, ad quid in cruentas venas anticipatè prolabi? Si verò mixtus, cur mesaraicas, cur lecur, & cur Cauam euitare? His Bartholinus in *Defens. V. as. lactæ, & lymphat.* obuiam se facit, dicens, quod sic Naturæ placuit. Sed dicat mihi: quando ei Natura hoc reuelauit? aut quomodo ad aurem sic eum alloquuta est? An ipse solus, & expertissimus Naturæ interpret ei vnquam à Consilijs fuit? Imò quia illud sic fieri, incongruum videtur, ideo non placere Naturæ omni quaque scientissimæ, dicendum est. Ex hoc ergo aliam rationem excogitauit Is ipse; ita scilicet factum esse, vt per longiorem, & angustiore in ductum purior reddatur chylus, sicut videmus, aquam, quò longius per subterraneos ductus abit, eò puriorem reddi; Quasi liquores in corpore nostro, non coctione, & caloris vi purificentur, sed sicuti exterius in inanimatis accidunt, per filtra, arenas, ac lapides attenuentur. Nos verò, qui mechanica à naturalibus, meraquè naturalia ab animalibus longè distare, arbitramur, hæc minimè concedimus, & innati caloris vi omnia concoqui, omnia purificari in animato corpore, censemus: insinuata autem longior via nil ad coctionem simpliciter conducet, cum per vasa ex angustia, frigidaquè, vt sunt lactea; propè partem corporis frigidiorè, nempe posteriora, & longè à calidis visceribus sic fieret incessus. Sed & si allata aliquid valerent exempla, vbi absorbentes arenæ, vbi

Pecqueti, ac
Bartholini
vsus lactis
inineri assignatus
perstrinxit.

Bartholini
responsionis
facti sit.

Alia Bar-
thol. respon-
sio diluitur.

proxima emunctoria, quæ lacteis superfluentes fæces acceptent?

Vfus à Ri-
lano allati
refallentus.

Riolanus; sat habens refellere iactatam à Pecqueto sanguificationem, ac supponens, non tamen concedens, per illum thoracicum tubulum chylum in axillarem venam pro parte deportari, quasi diuinando, ac infelix Aruspicum conijciendo, varios vsus dictæ chyli deducioni in prima sua responsione ad *Exper. non.* Pecqueti assignauit; quorum primus est, vt hæc chyli substantia, sanguini addita, sit incrassatio, & quædam veluti remora ipsius, ne nimis præcipitanter fluat in ab eo admixta ipsius circulatione: Sed (remisso pro nunc ad sequentem Librum circulationis subiecto) hic primus vsus videtur abiiciendus: quia, vt omnes harum Lactearum fautores vno ore prædicant, chylus, siue succus, qui per eas ducitur, est valde tenuis, & aquosus, itaut faciliè omnis euanescat lactea crassities, solaquæ serofitas sæpè remaneat. Adde, & per ipsosmet eidem succo tenuissimam lympham, vt aiunt, à iecore in eadem vasa, expressam commisceri: Ergo hoc non erit sanguinem crassificare, sed imò illum attenuare, & magis fluidum reddere.

Ad primum
ergo respon-
detur.

Respondetur
ad secundum.

Eadem na-
titionis, &
generationis
materia.

Obiectio.

Tollitur.
Generatio
non ex excre-
mentoso, sed
ex puriori san-
guine fit.

Alter vsus est, vt sic forsan diuersarum partium, ossium scilicet, medullarum &c. nutritioni chylus ille inferuiat: Sed & hic reiiciendus: vnumquodque enim nutritur eo, ex quo est: eadem namque est nutritionis, & generationis materia: Sed hæ partes ex Aristot. omnes formantur ex sanguine, ex Galeno verò partim ex sanguine partim ex semine: chylus autem nec sanguis est, nec semen: ergo nec ad nutritionem aptus. Hic obstant, & dicent, sanguinem menstruum excrementosum, & frigidiorum esse, ideoquæ non inconuenire, eas partes nutiri etiam sanguine chylo admixto: Sed respondetur, factus generationem non ex excrementoso, sed ex puriori sanguine fieri: Argumentum est, vt plurimum ingrauidationes sequi, cessantibus menstruis, & corpore ab ipsis expurgato, vt notant. *Hippocr. lib. de nat. pue. m. 7.*, & *Arist. 7. de hist. anim. cap. 2.* cum alioqui, si, menstruis aduenientibus, generatio incidat, morbofi fetus gignantur; Et ob id alias in Sacris literis punitione dignus erat, & pro polluto habebatur, qui ad menstruatam mulierem accedebat. Addatur his, medullam, ossa, membranas, ac similia, vt dictum est, & Galeus docet, ex spermate fieri, quod adhuc sanguine purius est: ergo non seroso chylo insciendus sanguis pro illorum enutritione, sed imò vterius coquendus, ac alterandus; non attenuandus, ac diluendus, sed pro ossibus incrassandus magis est, vt probe elicit *Gal. lib. 1. de natur. facul. 10.* Amplius: sanguis ex diuersis partibus tenuibus, crassis, calidis, ac frigidis gaudet, & ex quatuor humoribus constat; itaut quælibet pars, quod sibi magis simile est, ac familiare, eligere, trahere, & sibi agglutinare possit. Tandem inutilis est hæc admixtio post hepatis coctionem: sufficiebat enim, & satius erat, hanc tenuiorem partem simul cum reliquo in iecore concoqui, ac misceri, itaut totum ex naturæ dispositione infra in coctione subsisteret, si ita pro corporis vtili opus erat; absque quod probe prius coqueretur pars,

pars, & inde crudo superaddito, efficeretur crudior: huiusmodi autem frustraneos circuitus Natura sagax non admittit. Sed & de huiusmodi vsu ablegando abundè disputabitur circa finem Libri tertij, nempe cap. 13.

Tertius vsus, à Riolano propositus, est pro generatione, & reparatione adipis per vniuersum corpus sparsi; præcipuè circa cor: Verùm & hic vsus abigendus est: Adeps enim, siuè pinguedo non ex chylo, frigidoq; succo instauratur, ac gignitur, sed ex puriori, oleagineaque sanguinis parte; cuius signum, non pinguescere eos, qui crassius, & frigidioribus alimentis, sed qui euchimis, & copiosis alimentitij succi cibis nutriuntur; itaut adeps non ex excrementoso, sed ex superfluo vltimi alimenti consistat: vnde *Arist. lib. 2. de part. anim. cap. 5.* adipem defini esse sanguinem concoctum per bonitatem nutriendi. Nec obstat, quod otiosi, non qui exercentur validè, pinguescunt: quia dicitur, quod sicuti nimius motus non solum pinguedinis generationem impedit, sed & extenuat, ac dissoluendo pinguedinem absumit; ita nimia quies non solum non pinguesfacit, sed & malum habitum, & cacochimiàm parat: quare & in mediocritate stat adipis bonum. Alioqui mediocre otium eo modo pinguedinis generationi, quo plethoræ, fauet; non scilicet quia refrigerat, sed quia parum digerit, & superflua non absumit. Insuper nec ex facili concretionem, seu congelationem, illius substantiæ arguitur frigiditas: nam & oleum, & sanguis facillimè concresecunt, & citius quàm pituita, ac serum, quæ à solo magno frigore congelantur; & tamen his ea omnes calidiora esse proculdubio esse fatebuntur: Concretio enim non semper à frigiditatis excessu, sed à crassitie, & consistentiæ aptitudine nascitur (nam ab humidi euaporatione ob calorem facili, iunctis fibris, in sanguine euenit ex *Arist. cit. lib. de part. anim. cap. 4.*) cum ex altera facillimè, & olei, & adipis flammescencia, ac igneitas, suæ substantiæ temperiem arguat: Vnumquodq; autem non ex contrario, sed ex simili gignitur, aliturquè. Et sic *Arist. loc. sup. cit. scilicet cap. 5.* dicit, quod pinguedo ijs animalibus deest, quibus sanguis non adest, & quod pingue commune ignis, & aeris est. Quare non ex chylo, sed ex benè cocto sanguine gignitur, & nutritur adeps; consistitquè ex eo, quod in pulpam quidem animalis non absumitur, sed concoctionis, alimentiq; bonitate præditum est. Et sic *Ca. lib. 16. de vsu part. cap. 2.* pinguedinem gigni, ait, ex sanguinis parte pinguiore per tenues venas effusa.

Quartus vsus iuxta Riolanum est, vt ex chylo fibræ sanguinis generentur, quæ ipsius consistentiam, & remotionem adiuvant, & quarum causa faciliè concresecit, vt *cit. cap. 4. apud Arist.* legitur. Verùm & hic ab additione aquosioris, & tenuioris chyli non comparatur; nam, vt ibidem legimus, Sanguis, quò dilutior, eò frigidior est: qui autem terrenus, nimirum coit. cum humor euaporatur: fibræ autem illæ terræ sunt opificium. Et inferius: Sanguis, fibris detractis incongelabilis

Respondetur ad tertium vsu.

Pinguedo non ex chylo sed ex Sanguine gignitur aliturque

Tollitur quædam obiectio.

Quomodo mediocre otium pinguedinem fauet,

Alia obiectio soluitur

Concretio non à frigiditate, sed à crassitie, & humidi vaporatione accidit non rare

Pingue commune ignis, & aeris.

Respondetur ad quartum vsu Riolanum, & reijciatur.

Sanguis h.
bis ex cras-
siori chylo in
hepate effor-
magatur.

labilis manet: fibrarum enim natura terrena est.) Quare rationabi-
lius est, eas non ex dilutiori, sed ex chyli crassiori parte efformari in
hepate; non quidem quod hoc, vel ventriculus de propria substantia
aliquid sanguini tribuat; sed quod secur ad talem substantiæ consiten-
tiam eum reducat: Nec enim fibræ sanguini exterius, ac per accidens,
sed intrinsecè, & per se in sua generatione obveniunt, idque ab hepa-
tis natura, quæ verè sanguinea est, & quod in se habet insitum, super-
fluo suo iminutato alimento, nempe sanguini, liberaliter impertit.

Respondetur
ad quintum
vsum Riola-
ni.

Quintus vsus, ab eo commemoratus est, vt sanguis crassior factus, &
instar fermenti acidior, ad cor delatus, & inibi inhærens, veluti pro fer-
mento inseruiat ad elaborationem sanguinis arteriosi: Sed & hic rursus
dicere possumus, sanguinem ex illius permixtione chyli non quidem
crassiorem, sed tenuiorem, & aquosiorē euasurum esse, & ideo non
magis cordi affigendum, quàm reliquum, forè: Sed nec aciditas, aut
crassities addita quicquam possent coctioni prodesse; cum potius sua
qualitate, & ineptitudine noceant: Acor enim frigiditatem arguit;
coctio autem à calore fit. Sic & crassities magis actioni resistet, quàm
tenuitas.

Respondetur
ad sextum.

Sextus ibidem expressus vsus est, vt lacteus hic succus nutritioni in-
seruiat glandularum collis, axillæ, ac faucium, sicuti inferiùs inguinum,
pubis lumborum, mesenterijq; ipsius: Sed iam supra hic vsus, qui cum
secundo, & tertio coincidit reiectus est: ibi enim vidimus, non ex chylo,
sed ex sanguine eas partes nutriri, & ex eodem pinguedinem procreari.
Sed & cur per sinistram tantum Spinæ partem Lactea fertur, & in fini-
stram axillarem solam intruditur hic succus, si harum partium, quæ
æqualiter in vtraque consistunt, nutritioni deferuire deberet? manife-
stum autem est, quantùm natura æquilibrij partium Zelotes sit; quæ in
cunctis alijs distribuendis vasis, vel in medio, aut paululum procul trun-
cum, qui vtròque ramulos mittat, vel paria vasa hinc, & hinc effor-
mauit, & ad iustitiam distribuit.

Alij duovsus
proponuntur,
& resellun-
tur.

Chylum ist-
huc ad mam-
mas nō pro-
dire proba-
tur.

Alios alij vsus imaginati sunt, quorum vnus Pecqueti, & Bartholini
est, vt ad mammas chylus ducatur pro generatione lactis: viam autem
adhuc latere fatentur. Alter Caroli le Noble, vt sanguis arterialis, pi-
uitosior redditus, pro variarum partium frigidarum nutritione melius
deferuiat. Et verique hi vsus inanes quoque se se nobis offerunt. Pri-
mus, quia, si mammas inseruire debuisset, non vnicus, nec in sinistram
tantum axillarem ingrediens à Natura efformatus fuisset: nec enim sic
facile ab vno latere in aliud sunt sanguinis, aut aliorum succorum flu-
xiones cum potius videantur per directum eiusdem lateris, & natura-
les, & artificiales rectè fieri, prout experimentis plurimis confirmatum
tenet Gal, lib. de ven. sect. cap. 15. & 16. Item velex sanguine, velex
chylo lac gignitur. Si ex sanguine, frustra chylus expetitur. Si ex
chylo, alia insertio debebat ad mammas ipsas explorari, & inueniri;
non autem ad superiora, & in venam sanguine plenam impingi, vt
inde

Non facile
ab vno late-
re in aliud
sunt fluxio-
nes.

Si lac ex san-
guine frustra
chylus expe-
ditur.

inde iterum descenderet, & sanguine infectus ad mammas porrigere-
tur. Sed præter hæc lac ex chylo non produci, in tertio libro plene
commonstrabitur. Vterius neque ad mammas dictam traductionem
chyli fieri, testantur armenta, brutaque ferè omnia, quæ mammas in
abdominis fundo implantatas possident, ad quas ideo non perueniunt
dictæ lacteæ thoracicæ in canibus præcipuè, & alijs pecoribus inuen-
tæ, & experientijs facilius expositæ. Tandem ex ipsorum Inuentor-
um doctrina lacteus ille succus, in subclauias peruentus, non vterius
progreditur ad axillas, sed cum sanguine in Cor, coquendus, & sangui-
ficandus, vt circulationis volunt suæ leges, quæ aliter infringentur
omnino.

Secundus quoque in cassum supponitur vsus: quia frustra natura ex-
petiuiisset arteriosum sanguinem a Corde omnium membrorum calidif-
imo attenuari, delucidari, & spiritibus infarciri, si debuisset, chylo
propè Cor addito pituitosior fieri, infrigidari, & vt sic dicam conspur-
cari. Secundò quia, eo dato, nec debuisset lacteus tubulus in venam
anguineam; vteriolem, ac lateralem se exonerare, sed vel in arteriam,
el in arteriarum fontem Cor. Tertiò quia nihilominus arteriosi sangui-
nis natura calidior, & spirituosissima cernitur, qualis ad sui vsum re-
quiritur. Quartò quia ad corporis nutritionem ex Hippocratis, & Galeni
doctrina non expetitur arterialis, sed venalis sanguis; Quorum autho-
ritati illud attestatur, quod solida, crassa, ac duplici tunica constant ar-
teriæ, ne faciliè euaporent, vt innuit *Gal. lib. 6. de vsu part. 10.* Imò adeò
antiquis arteriæ ad nutritionem deferendam ineptæ videbantur, vt
aliqui crederent, probarentquè, in ijs sanguinem non contineri contra
uos *Gal. libellum conscripsit*. Sed & de hoc in sequenti vberius differe-
tur libro.

Concludatur ergo Caput cum hoc, quod nulli excogitato vsui hæc
chyli promotio esse potest; præterquam si dicamus, in omnimoda ieco-
lis obstructione, vel superioris Cauæ occlusionem, vel interceptionem posse
naturam hoc itinerulo aliquid chyli ad Cor trahere, quò animal adhuc
per pauculos dies viuere posset. Eo tamen casu, talique tempore, vel
minimum assumet cibum animal, vel assumptum reuomet, aut chylo-
m adhuc plurima pro parte ad animum reddet, & sic breui tabidum cor-
pus fiet, citò finiendum: Longissimè enim abest à sanguificandi chyli
perdere Cor, cui per continentem diastolem, ac systolem, succum in suis
intriculis diu continere coquendum, prout coctionis natura desiderat,
talè conceditur: inanis autem est cogitatio, sanguinem per conti-
nam circulationem toties illuc redire, donec tandem concoquatur:
ia si sic esset. & homo in continua agitatione esset, & interim inco-
quens sanguis ad corpus alendum duceretur: Sed quod magis refert, cum
peri, & rustici quibuslibet quatuor, vel quinque saltèm horis cibum
optent, circulatio autem ex aliquorum opinione bis in die solummodò,
(vt verius puto, & latius in secundo monstrabitur libro) potius
nullo

Et armenta,
& brutis plu-
ribus mam-
mæ in fundo
abdominis.

Circulatio-
nis leges huius
traductionis
contrariæ.

Chylum pro
arterioso san-
guine increas-
cendo non ex-
peti pro-
batur.

Ad nutritio-
nem corpo-
ris non arte-
ialis, sed ve-
nalis sanguis
desideratur.

In iecoris
obstructione
&c. aliquid
chyli perim-
itæ ad Cor
trahi conce-
ditur.

Longissimè
abest à san-
guificandi
chyli opere
Cor.

nullo modo fiat, semper in cruditate ob nouam additam materiam sanguis maneret. Quam ob rem, si nulli vsui potest similis chyli deductio satisfacere, neque ipsam fieri, putandum.

CAPVT VNDECIMVM.

Quod nullo rationabili modo illac fiat chyli traductio ad Cor, inductione probatur; Et primò non per impulsione.

Sive Receptaculum, & Pancreas idè sint, siue nò, nò curat Auditor.

Chylum ex se non moueri, probatur.

Nec mouetur per latera, sed iter ab alio.

Intestina non impellunt in latera ratio prima.

Ratio secundæ quod aliquid abijcit, vel quia grauiatur, vel quia agitur ab eo.

Nunc quod nullo modo per suppositos canales fieri possit ordinata, & naturalis chyli traductio ad superiora, siue ad Cor, probandum. Et hoc fiet à sufficienti partium enumeratione sic: Si chylus debet ab intestinis in pancreas, & ab hoc per thoracicum tubulum in axillarem venam transferri (hic verò velim adnotari, quod etiam si receptaculum Pecquetianum differat à pancreate Veterum, de eo nihilominus quoque intelliguntur omnia argumenta: nihil enim isthæc moror siue vnum, & idem, siue aliud sit; hancquè distinctionem ijs, qui Anatomen propria exercent manu, & proprijs oculis versant, remitto), vel fiet, quod ex se chylus moueatur, vel ab alio. Non primo, nec secundo modo: ergo nec transfertur. Non, primo: quia, si ex se moueretur, id esset, vel quia viuens, vel quia mixtum naturale: Sed non est viuens: quia nullus liquor viuit, saltem animali vita ob organorum deficientiam; Nec vt mixtum naturale hic mouetur; quia sic solum ad infra moueretur, vt grauis, non autem ad superiora, vel ad latera, vt in casu requiritur: Ergo ex se non mouetur.

Non secundo: quia ad hoc requiritur, vt vel trahatur, vel pellatur, vel simul, & semel vtroque modo adigatur: Sed nullum est reperire proportionatum attrahens, vel impellens: Ergo nec sic poterit moueri. Hæc verò probabuntur, si consideremus terminum à quo, ter minum ad quem, & medium per quod: manifestum enim est, quod impellens, si adest, debet esse, vbi incipit motus, siue in termino, vnde fit progressio; attrahens verò, vbi desinit, siue in termino, ad quem peruenit; vel vtrumque in medijs partibus. Cum ergo ab intestinis chylus debeat peruenire in axillares venas, fit clarum, quod impellens debet esse in intestinis, & attrahens in axillaribus, vel vtrumque in dictis vasculis lateris, vel Receptaculo: Sed nec ab illis fiet pulsio, nec ab alijs tractio, nec ab his vtrunq; Intestina non impellunt: quia quæ sunt ab aliquo per impulsum fluxiones, sunt per continuitatem cavitatis alicuius, & per determinatum vacuum, Intestinorum expulsionibus patet latus aditus, & cavitatis continuatio ad sedem: ergo non in cæca oscula vasorum fiet impulsio. Secundò quidquid aliquid a se abijcit, vel quia ab eo grauiatur, vel quia molestat, seu angitur: Intestina autem, vbi chylo exsatiata sunt, vel grauiantur, seu molestantur à tota mole, & sic à totius chyli corpore se vnico motu exonerabunt; quare non per oscula tenuia,

in quæ crassa introire nec possunt, nec debent, cum fæces è corpore pel-
lere; non in corpus intrudere fas sit; sed per suam latam cavitatem, &
sic per aluum: Vel molestantur, seu vellicantur ab ipsius parte, & tunc
vel à crassiore, & fæcali, vel à tenuiori, & substantifica; Non ab hac,
quia naturæ ipsorum familiaris est, & assimilata multum, altera verò
dissimilis: Si verò ab illa, nec introire in oscula valet, nec debet: Ergo
ab intestinis ipsis non pellitur chylus. Et quia posset quis dicere, ab in-
testinis fecerni fæces per aluum, & inde alimentosa per dicta forami-
nula; his addito, nec ab intestinis posse tenuia à crassis fecerni, cum gra-
cilia nullas habeant cellulas ad selecta retinendum; crassa autem pau-
cissimas in se habeant venularum mesentericarum, siuè lactearum exi-
turus. Tertiò ubi partes sese exonerare, & expellere aliquid à se volunt,
in se constringuntur, vt patet in exterioribus, & in naturalibus tum alui,
tum lotij excretionibus, & vt ipse affirmat Pecquetus, qui *cap. x. differt.*
anatom. statuit, constrictionem à se sibi obuenire, dilatationem ab alio:
Vbi verò partes in se constringuntur, etiam pori, & meatus in earum
corpore insiti clauduntur: ergo non in lactearum oscilla, se restringen-
tibus intestinis pellitur. Quarto si pars se ab aliquo grauante, aut vex-
ante liberare vult, ubi aliquid non impedit, per commodiorem du-
ctum se se liberabit: Commodior autem ad interancorum vacuationem
est via ad aluum, seu sedem ducens: Ergo illud, non in lacteas
pellent.

Ratio testis.
Vbi parte a
expellunt in
se constin-
guntur.

Ratio quare.
Si pars se
exonerat, per
commodio-
rem viam
id facit.

Pecqueti de
chyl motu
sententia.

Hic verò nobis subsistendum est: Nam Pecquetus, ab omnium hu-
cuscque Medicorum placitis libenter discedens, modum, quo chylus,
à ventriculo in intestina delapsus, in dicta vasa abeat, indagare conten-
dens, omnem causam dictæ permeationis reflectit in pressionem factam
à Respiratione, per quam musculorum abdominis se constringentium
ope continenter videmus, vicissim comprimi, & eleuari abdomen sicuti,
& à iecoris pistilli vicem gerentis succussione, prout superius diximus
cap. 4. Cui plures ex Neotericis, sanguinis circulationi fauentibus, sub-
scribere. Quare putat, ex dicta compressione à ventriculo in intestina,
ab his in ora lactearum, à lacteis in receptaculum, ac tandem per thora-
cicum tubulum in axillares venas chylum exprimi; assertq; exemplum
puerorum ludentium, qui ferentes anguillæ spolum aqua plenum, ipso
priùs minutissimis foraminulis acu impictis circum circa peruo reddito,
illud postea premitantes, in tenuissimas scaturigines aquam eiulant:
Sed leuis nimium est hæc sententia: Neque enim benè conuenit exem-
plum inanimati vasis alteri animato, & cui à Natura datæ sunt omnes
facultates nutriticæ famulæ, attrahitrix, retentrix, concoctrix, & expul-
trix: siquidem idem est, hæc si gressus animalium, vel aliorum eorum
motuum causam à lapidis projectione, vrinæ excretionem à clysteris
pulsione venaremur. Ad quod propositum *Gal. lib. an sanguis in art. sit*
cap. 8. volens probare, spiritum in arterias per attractionem permeare
hæc verba profert: Est enim hoc ad naturam multò accommodatius,

Refellitur;
Exemplum
inanimati va-
sis animato
non compe-
tit.

Exemplo plantarum probatur, non moveri chylum ex compressione, ratio prima.

Diaphragma & musculi ad anum pellunt.

Altera ad idem ratio ab impossibili.

Ratio tertia à verisimili.

ut ita opinemur, quàm ut per eas, tamquam per inanimata corpora, ferri spiritum existimemus: viuens enim à non viuente differt, non quod mole corporis excellat, sed quod facultatis sit particeps. Quod si plantis omnibus datum est, ut alimentum à terra per suas radices citra impulsum, aut alium sensibilem externum motum sugant, attrahant, & usque ad cacumina ferant, ad quid in animali, in quo perfectior natura est, huiusmodi impellendi modum violentum, & extraneum supponere, & imaginari? tamquam vascula in eo vita, sensu, & motu careant, sed pro sola seruiant cauitate.

Cæterum musculi abdominis omnes superfluum, seu excrementorum per aluum excernendorum gratia extant, ut bene notat *Gal. lib. 5. de usu part. cap. 14.* in principio. Diaphragmatis verò secundarius usus (primus enim ad respirationem facit), ut idem ait *cap. 15.* ad eundem finem est, ut scilicet simul cum musculis totum comprimens abdomen, ad vnum pellantur vniuersa excrementa: propriè namque pulsio ad excretionem instituta est, non ad nutritionem.

Sed dato, quod in animali possit dari huiusmodi introtrudendi modus, tunc interrogo, an illa imaginata vasorum compressio solummodò tangat intestina, ut ab ijs in lacteas tenuior chyli succus impellatur, & sic consequenter à subsequente succo alius iam impulsus magis introtrudatur, usquequò in venæ axillaris sump perueniat, indequè ad Cor; vel primò illic incipit compressio, & subsequitur in glandulis, & lacteis ipsis; vel simul in omnibus. Si primo modo, cum cauitas intestinorum continua sit, lata, & usque ad podicem producta, patet, quod vel totus, vel plurimus comprimitur chylus ad anum, non autem ad vascula, quæ vix sensui patent: Ex eo enim in spolio anguillæ compresso succedit aquæ per foraminula eiaculatio, quia infra occlusum, supra coactum est. Sed nec potest hic modus dari: quia ad compressionem stomachi, & abdominis non solum intestina, sed & mesenterium, & glandulæ simul premuntur, & idèò quantum illa pellerent, tantum hæc contraherentur. Secundus modus nec datur: quia simul & non successiue fit per respirationem diaphragmatis tensio, abdominis compressio, & musculorum motus in toto abdomine. Si tertio, iam non magis valebit compressio intestinorum ad impellendum in lacteas, & harum in glandulas, quàm ipsarum ad repellendum in intestina. Sed inquirunt, adesse valvulas, quæ admittunt quidem introitum, sed non retrocessum. Respondetur, quod compressio non solum retrahit, sed & impedit admissionem.

Item vel adsunt illa innumera oscula venarum à Portæ ramis emanantium, in intestinorum cauitatem hiscentia, ut dicunt Galenus, cæterique iam sæpè citati Vesallius, Vallesius, Faloppius &c. vel non. Si primum, si detur illa expressio (ut vult Pecquetus) in lacteas, quæ multò minores figurantur, multò magis dabitur in alias venas vi sui patentiores. Nec valeat dicere, has venas non esse dicatas ad recipiendum, sed potius ad ferendum.

ferendum sanguinem pro alendis intestinis, vel vt alij & Ipse, ad reducendum circulatum sanguinem in Iecur: quia responderetur, si hiant, quod sic sanguinem in cavitatem illorum euomerent, sicque quotidie excerneretur sanguis per anum, quod non accidit, nisi quibusdam paucissimis per interualla, & præter naturam affectis: ergo signum, eas potius ad sugendum, vel referendum, quàm ad deferendum, esse productas: si autem hoc, cur non impelletur in eas? Si secundum verò, tunc falsitatis arguentur tot celeberrimi Auctores, qui clarissimè attestati sunt, à Portæ venis varias, ac propè innumerabiles venas in intestinorum sinus penetrantes, hiantesq; dispergi, quod dici non debet: quia si in ore duorum, vel trium fiat omne verbum, vt sacre literæ attestantur, vt leges fanciunt, & vt Pecquetus ipse ad rem suam perhibet *lib. de exper. nou. anat. cap. 6.*, multò magis pluribus credendum est.

Ratio quarta
ab absurdo
insequente

Quartò si per impulsione, & succussione fieret chyli traductio, sequeretur, quodd non minùs, imò magis multò à comestione tenuiorum ciborum fieret, & tamen è contrariis videmus: si enim plura olera, & horarij fructus ingerantur, plura excrementa per aluum, & lubrica euuantur, quàm si crassa alimenta assumantur. Et patet cõsequentia: quia si plus tenuioris chyli adest, plus deberet in dicta foraminula introire.

Quintò si dicto modo chylus in lacteas pelleretur, idè esset circa hoc, què acciperentur cibi optimi, ac si prauis, & excrementosis: Sed è contrariis videmus, si comedatur in eadem quantitate cibi, vel optimi succi, vel minimi nutriti, quod in ijs pauciora multò fæcalia per anum exibunt, in his longè plura: Ergo signum, per suctionem, seu attractionem ex similitudine, aut congruentia illum distribui. Et consequentia prior probatur: quia si ex compressione impellitur, non magis resistit prauum, quàm probum: sufficit enim, esse similem corpulentiam, & substantiæ modum.

Ratio quinta
ab eadem cõ-
trario.

Sextò si propter dictam compressionem chylus à stomacho in intestina, & ab his in lacteas pelleretur, nihil quoad stomachum interesset, an hoc, an illud cibarium assumeretur: siquidem nec proba fieret concoctio, nec homogenea substantia esset chylus, sed quod inferiori ventriculi ostio esset propinquus, citius, & crudius exiret; quod remotius, tardius, & concoctius: Contrarium tamen experimur: quia chylus, quamuis ex varijs coloribus cibis, ac potibus constet (ni cruditas addit), æqualis tamen, & vnus coloris est, & cibi boni succi, faciliq; coctionis citò descendunt, ventriculumq; liberum relinquunt: prauis verò, & difficilis coctionis, & serius coquantur, tardiusq; descendunt, vt ad sensum patet, maximè in stomacho imbecillis. Prior autem consequentia est manifesta: quia, cum continens sit causa, continens quoque daretur effectus; est autem continens compressio à respiratione, qualis à Pecqueto supponitur, & sic continens expressio succi.

Ratio sexta,
ab inconueni-
entibus.

Neque satisfacit ab Eodem ad id assignata solutio, quod nempe non inconuenit, cruda aliquando à ventriculo exire, vt videre licet in assumptis diureticis, purgantibusq; quæ aliquando cum eodem odore, saporeu

Tollitur Pec-
queti obiecc-
tio.

cito exeunt, sicuti & in immodico vini, vel aquæ potu, & in esu leguminum, vuar, & aliorum in quibus cortices, & semina incocta exeunt. Nam dicitur, aliud esse, tractare de ventriculo sanas obeunte actiones, & cibis tum ob quantitatem, tum ob qualitatem coëstibilibus; aliud verò de ventriculo læso, de medicamentis irritantibus, violentisq; vel rebus ob copiam, aut ob earum naturam incoëstibilibus: Si enim de primis agatur, & ventriculo nihil exire debet; aut solet antè perfectam coctionem: (intellige tamen per pylorum: quia potest interim, dum coctio fit, per venulas a Portæ ramis in tunicas ventriculi penetrantes, ac dehiscences aliquid tenuioris, & delicatoris succi à iecore trahi, vt notat Faloppius pag. 161. quod à Gal. Vesall., & alijs Medicinæ Doctoribus desumptis.) Si verò de secundis, clarum est, cum vis infertur naturæ, vel assumpta ob exuperantiam, aut ob eorum naturam coctionis incapacia sunt, quod vel non tentabitur coctio, sed sola actiatio, vt in pharmacis fiet; vel non perficietur in cæteris: Argumentum verò nostrum consistit in coctione ciborum, qui vel faciliè, vel difficilè coquuntur. Ergo cum non adsit proportio, nec similitudo de ijs ad hæc, nec valet obiectio: Quæ enim proportio inter alimentum, & medicamentum? & quæ similitudo in lapidibus ad panes; in nucleis ad cibos alimentosos? nec propterea tamen, quæ coctionem fugiunt (dummodò naturæ vim non inferant) antè cæterorum coctionem exhibunt.

Inter alimentum, & medicamentum non est proportio.

Ratio septima ab inefficacia causæ.

Sed & si expressione talis fieret chyli traductio, neque hæc opera respirationi demandanda esset, vt Pecquetus adinuenit: nam nec tanta sit musculorum thoracem, abdomenq; mouentium contractio, nec tantus diaphragmatis ad inferiora conatus in respiratione, vt posset is pulsionis motus à lacteis concitari; maximè cum compressioni obstitant mulsæ mesenterij glandulæ, & hic sit inter earum præcipuos vsus, vt docet Falop. pag. 176. Nec validæ ventris compressioni, quæ sit in excernendis facibus alui, & vrinæ demandari potest: quia illæ tum breuissimæ sunt, tum quibusdam rarissimæ, itant (quicquid sit de mictu, in quo leuis, breuiusq; sit compressio) semel in die tantum egeratur in plurimis, & alijs non nisi alternis diebus, ac per totam longissimam noctem in plerisque, nec egestio, nec mictio fiat; tum dictæ excretiones natura sua succedunt secretioni, digestionique. Nec tandem arteriarum pulsationi, vt quidam, & ipse Pecquetus, annuere videtur attribuenda esset: quia primò hæc pulsatio adeò levis motus est, vt leuitas ingenij sit, huic tale opus adscribere; & secundò adeò vniuersalis, vt paucae venæ sint, quæ arteriam comitem non habeant, vnde levis compressio cum sit per totam longitudinem venarum, ac tam supra, quàm infra, & eodem tempore, non potest animo concipi succi expressio ad partem determinatam, & magis huc, quàm illuc. Ergo non posset assignari dicta impulsio, nisi fibris; quæ tamen, vt dictum est, per propriam cavitatem, non per oscula in ipsam hiantia. Restat igitur, vt pronunciemus, chyli traductionem non impulsione, nec compressione fieri.

Experi-

Experimentum verò, quo vtitur Pecquetus ad probandam impulsio-
nem chyli supradictam prorsus inualidum est: dum enim dicit, quod liga-
to mesenterio, & lacteis, detumescunt illæ versus superiora, intumescunt
autem versus intestina, ex hoc non quidem suffocatur, vt ait ipse, sed imò
magis probatur attractio: quid enim impellens trans ligaturam poterit
per hanc autem non impeditur, sed magis incitatur attractio: ideo ligato
brachio, venas & citra, & vltra intumescere, videmus. Quod autem la-
ctæ superius detumescant, non mirum in languente, se torquente ani-
mali hæc fieri: si enim incisa vena, & fluente sanguine, vbi lypothimia
accidit, sanguinem actu fluentē sisti, cernimus, quid de non incisa dicen-
dum? omnia enim tunc ad principem rapiuntur partem. Idem, & de
pulsione dicendum: magnum enim non est, in valida totius concussione,
anxiosa ac forti expiratione, & varia ob angorem dimotione corporis,
fieri ab intestinis chylo plenis aliquam expressionem in dicta vasa: quod
non est dicendum de animali quieto, humiliter spirante, & naturaliter se
habente. Pulsio igitur illa violenta est, & præter naturam.

CAPVT DVODECIMVM.

Chyli introductio in lacteam thoracicam neque attractione fit naturaliter.

EX his cum pateat, non posse fieri chyli motum neque per impulsio-
nem, neq; per compressionem, seu expressionem, reliquum est, vt
ponamus, eum attractione, & suctione fieri, vt hinc retrò semper à Me-
dicis edoctum, & creditum est. Sic dixit Hippocr. lib. de carn. num. 12.
„ Etenim venæ ex ventre, ac intestinis, in quæ cibi, ac potus colligun-
„ tur, postquam hi fuerint calfacti, tenuissimum, ac liquidissimum tra-
„ hunt; crassissimum autem, & sæx isthic relinquitur, computrescit, &
„ fit stercus in inferioribus intestinis.) *Inde nu. 13. subdit. Tenuissimum*
„ verò trahunt venæ ex ventre, & intestinis, quæ supra ieiunum inte-
„ stinum existunt, & atque hoc calfactis iam cibis.) Sic Gal. 4. de vfu
„ part. 19. hæc habet: Condensatum est in orbem omne intestinum in-
„ numerabili quadam multitudine orificiorum intrò peruenientium, à
„ quibus rapitur sursum quod ex prætereunte alimento vtile est.) Sic
„ Vesal. lib. 3. cap. 5. idem testatur propè finem dicens: Cæterum reli-
„ quæ omnes Portæ propagines in ventriculum, & intestina digestæ,
„ duplici nomine extruuntur, partim vt illis nutrimentū subministrant,
„ partim vt suis sinibus, & osculis in ventriculum, & intestina hianti-
„ bus confectum à ventriculo cibum ex ipso, ac intestinis exurgant, at-
„ que ad iecur, tanquam concoctionis officinam toti humano corpori
„ communem deferant.) Et rursus ibidem: Dein Portæ vena ab alijs
„ etiam iecoris manus nuncupatur, quod iecur ea ad elaborati in ventri-
„ culo cibi attractionem tanquam manu vtatur.) Vt alios per multos
idem enunciantes præteream.

Quorum as-
trahendi mo-
di.

Fit autem attractio (ni decipiar) quatuor modis, quorum primus est ex vi vacui; Et hoc modo per fistulam clisteris attrahitur succus, per auendam potus, per dilatationem pectoris, & folliis trahitur, aer. Secundus ex similitudine substantiæ provenit, & sic magnes trahit ferrum, adamas paleam, agaricus pituitam. (Dico autem similitudinē, non identitatē; nec enim chalibis chalibē, nec ferrū attrahit ferrum, sed quod potentius est, sibi simile ad se allicit, sicuti ē contra sibi contrarium pellit.) Tertius est ex vi apprehensionis, per quam ad sui motum aliud apprehensum trahitur. Quartus verò ex necessitate suæ vitæ durationis, & alimenti eo modo, quo lychnus accensus oleum fugit, plantaq; humorem à terra sumit, vt ex ijs alantur. Vno igitur istorum modorum necesse est, vt chylus attrahatur per lacteas, si trahi debet: Sed nullo horum in axillarem venam per tubum thoracicum potest allici, nisi necessitatis summæ tempore, quando scilicet via ordinaria iecoris penitus occulsa, vel interclusa est; vel per inædiam, aut summam hæmorrhagiam dissolutis partibus venæ fuguntur vndique: Ergo nec attractione fiet

Nullo horū
modorum si-
chyli per la-
cteas in axil-
larem trac-
tio in sanis.

Non ex vi
vacui.

per talem viam chyli traductio naturaliter. Et primò non ex vi vacui: quia si ex axillari aliunde fiat suctio, ita ut & ipsa pro sui reparatione succi, aliunde debeat fugere, lata via est, per quam, vel attrahet à Caua, à qua suam sumpsit originem, & in qua sanguinis promptuarium est; vel, si hæc ab illa suxerit, eadem à tot ramis, qui sui ipsius germina sunt, & sanguine scatent, attrahet; absque quod per tenuia spiracula, & quibus valvula adsit, miserum, & aquosum alliciat succum; nisi, vt diximus in maxima subsit necessitas, quæ extra nostrum casum est. Secundo non ex similitudine substantiæ: quæ enim similitudo venæ, quæ membranosum corpus est sanguinem natura sua continens, conseruans, perficiens, cum chylo considerari potest? quæ similitudo solidi cum liquore, contingentis cum contento, agentis cum passio? Tertiò non ex apprehensione quia quæ fluunt tenuia, apprehendi non possunt: apprehenduntur enim, quæ corpulenta sunt, quæ verò tenuiter fluunt, prætersuunt apprehendentem. Quarto nec ex alimenti necessitate: quia

Nō ex simi-
litudine su-
stantiæ.

Non per ap-
prehensionē.

Non ex ne-
cessitate ali-
menti.

vena axillaris propè Cauam est, qua sanguine plena, (vt in homine sano est) semper poterit succum sibi attrahere similiorem, nempe sanguinem; vel si fieret circulatio, vt Pecquetus sentit, ipsi idem ab alijs suggereretur sanguis. Quod si, vt diximus, venæ inanitæ sint, vt in copiosissima sanguinis missione, vel eiusdem immodico fluxu; vel si nil Cauæ à iecore obstructo suggeratur, tunc quidem aliquid inde attrahi poterit; sed casus hic extra nostrum propositum ordinariæ cibationis in homine salubriter degente cadit. De hoc enim salubri statu intelligimus, cum nil chyli per talem sentitam ad Cor deduci, pronunciamus.

Eadem de
Receptaculo
viget.

Idem de Receptaculo dicendum: ad quid enim ipsum trahere, dicendum est, cum corpus glandosum aptum potius ad recipiendum sit, quàm ad trahendum? imbecillitæ namque huiusmodi partes sunt, & excrementitij fluxionibus nimis obnoxie, vt ex Hippocr., & Gal. habemus. Et dato,

CAPVT DVODECIMVM. 61

Dato, quod possit ob sui alimoniam trahere, cum possit succum coctum à Iecore, & Caua fugere, ad quid ab intestinis chylum incoctum? Ex-
fugat autem, quantum ei libet: at vbi plus exfuxerit, quæ pars ipsum,
nisi vel renes, vel Iecur sit, subleuabit? An putandum, quod à se super-
flua pulsuum sit? Id verò partis spongiosa, mollis, & hebes natura
excusat. De compressione autem, quantum, quid, & quomodo valeat,
sat supra dictum est cap. præcedenti.

Igitur cum vniuersum corpus à parte post partem sanguinem in sui
alimoniam à Iecore, quod huic succo præsidet, quærat, & ipso consen-
tiente trahat, sit, vt ipsum per suos destinatos canales à ventriculo, &
intestinis attractrice, qua maximè pollet, facultate chylosum succum
alliciat, qui in Iecur assumptus, sanguis fit, & corpori instaurando deferuit.

Vidit autem Pecquetus, & ipse, attractionem chyli in lacteas non dari
thoracicas, & ideo ad pulsionem se extorserat: sed inane est disingium;
quia minus ipsa datur, vt in præcedenti capite dictum est.

Contorquet hic se Bartholinus, & dubius, an tractione, vel pulsione
fiat dicta chyli traductio, respondet, eodem modo fieri, quo alij puta-
runt, per pancreas ire ad Iecur. Sed vana est hæc responsio: quia nulla
datur proportio: hic enim Iecur est, quod à Natura inter præcipuas
corporis partes fabricatum, vberissimoque nativo calore donatum, attra-
hendi magna pollet efficacia: & hoc aptè perficit per proprios ca-
nales, qui & ipsi varijs fibris gaudentes, natiuoque spiritui affluentes, &
tractionem, & suctionem prosequuntur, non omnium indifferenter, sed
sibi familiarium, & magis proportionatarum chyli partium; Id quod
non more sanguisugarum, se dilatando, venæ assequuntur, sed suis, vt
dixi, fibris, vt plantæ à terra, succum sibi amicum immotæ ferè ele-
uant, & sursum ferunt: At glandulæ omnes ad valdè trahendum inep-
tæ, tubulus verò lacteus nulli visceri inseritur, sed in alias radicator ven-
nas, quæ magis axillis, & lacertis communicant, quàm Cordi, ad quod
vt perueniant, ipsis retrogrediendum est ad suam originem.

Quidam forsan ad Cordis tractionem confugiet: sed malè, cum huic
viæ, ductusque ad attractionem latissimi sint venæ, ac arteriæ, non lactei
riuiuli, qui nec ipsi inseruntur, nec nisi per indirectum, sed transuersum
communicant: Ad quid ergo ab his trahat, si potest ab illis, & recta, &
affluenter? Nunc igitur ad alia progrediendum.

CAPVT DECIMVM TERTIVM.

*Chylus in totum per thoracicum tubulum ad Cor ire non potest: Dato autem,
quod pro parte, multa absurda sequuntur.*

Dato autem, & non concesso, quod illac posset chylus ad Cor meare,
tunc quæro, an totus ducatur, an verò pro parte. Totum dixere
Pecquetus, ac Bartholinus, iecori omninò hæmatosini subripientes:

Alij

*Verus chyli
trahendi mo-
dus à Iecore.*

*Bartholini
responsio inu-
tilis.*

*Nulla pro-
portio tra-
ctionis Ieco-
ris cum pan-
creatis, &
thoracici tu-
biculi actione*

Al j verò, vt Carolus le Noble Higmorus, Bartholinus in principio, ad alij partem solùm tenuiorem per lacteas ad Cor comineare, crassiores autem ad Iecur, opinati sunt; à quibus non videtur multum dissentire Riolanus, solummodò negans, ob sanguificationem ad Cor ire: Sed nec totus, nec pro parte it, aut debet per lacteas ire: Ergo nec per eas ibit. Quod non totus, probatur ex euidencia rei: quomodo enim sufficere potest vnicus tubulus, & tria vel quatuor foraminula, in axillarem penetrantia, succum illum, qui ab innumeris serè venularum osculis, in intestina, & stomacum penetrantibus, excipitur, capere, & ipsi aditum præbere? Respondebunt, quod interim firmatur reliquum in chyl'i Receptaculo, à quo paulatim postmodum ad superiora repit: Ast, hoc dato, nùm illud Receptaculum capax erit totius chyl'i, qui ventriculum implet? Equidem huiusmodi capacitas respectu illius æmulator meo iudicio eam proportionem, quæ inter murem, & agnum cognoscitur. Iterum respondebunt, quod multis vicibus supplebitur id, quod vnica vice fieri non potest. Ego verò dico, numquid ergo interim, dum Receptaculum vacuatur, chylus in ventriculo moratur, an in intestinis? Si in ventriculo, quomodo hinc ad Receptaculum peruenerit, si nulli meatuli lactei hinc ad illud aperiuntur? Si in intestinis, quomodo tamdiu in ipsis cunctabitur chylus, quin ad anum descendat, si præter illorum peristalticum motum, qui contentorum motui dat vitam, cavitatis hic lata est, & via strata? Quomodo ergo hæc improporatio poterit compensari, nisi dixeris, quod, dum ille tubulus ad superiora vehit, venæ mesentericæ oriuntur, vel dum ille, velociter transuehit, hæc omnes commodissimè vel sugunt, vel, vt ait Pecquetus, expressum ab intestinis recipiunt? vel non omnes hæc venulæ, sed tot solùm, quot tubulum illum æquant, attrahunt, vel assumunt? At quis spiritus adeo oculatus rebus his præsidet, vt dum hic mouetur, illic otium adest; dum hic velocitas, ibi segnities; dum hic tractio, illic retentio subsit; Quæ æqualitas sic ingressi ad egressum, pulsi ad receptum, attracti ad extractum seruabitur? Nonne vna, eademquè facultas est, quæ cunctis præest, & membrâ gubernat? Nonne idem succus, idem illius motus, & idem finis, nempe sanguificatio, & alitio? Absit, quod in Naturæ regimine similis improporatio, & similia absurda sequantur. Non totus ergo chylus illæ progreditur, sed pars tantum.

Nunc autem sic insto: An qui per iecur transit, incoctus seruabitur, an verò coquetur? si incoctus, cur tot venularum ambagibus iecur Natura dotauit, vt adhuc hominem, nisi imaginatione, lateat via, qua hinc in Cauam venam exeat succus? Et cur, si chylo solùm vehendo debebat inferuire iecur, illud ex sanguine sic rubicundum Natura formauit, non autem album, veluti ponuntur esse chyliferi hi noui ductus? Et cur ab eo venam adeo magnam, vt Caua est, produxit, quæ sine vlla interapedine, sinequè vilo retenticulo deorsum ad omnia membra abitura, vergit, & sursum alio caudice, antequàm Cor ingredietur, ad septum, & pericar-

Totum non
ille progre-
di chyli pro-
batum.

Quod nec
per chyli li-
fac progred-
iatur. In-
stantia pri-
ma,

CAPVT DECIMVM QVARTVM.

Quis vsus dicto Receptaculo fuerit à Veteribus attributus, qua circa ipsum sit opinio Auctoris, quidquid sit lacteus in eo contentus liquor.

Vana verò nimis (dicent) ratio est, quæ sensui aduersatur. In lacteo tubulo, in Receptaculo dicto, & in mesentericis venis succus lacteus per sepe inuenitur, & in viuo dissecto animali sursum per thoracem abit, & si comprimatur, in venas subclauias tenuissimè scaturiens cernitur: quid ergo negatur posse illuc ire? Sed dicant mihi: quis eis reuelauit, dictum succum esse chylum? quis illum degustauit? quis eum cum chylo in ventriculo existente comparauit, & eundem esse asseruit? quid illud est, quod sic facile euanescit? quid, quod, pleno existente adhuc ventriculo, talis in his vasis liquor inuenitur? quid, quod non in omnibus, sed in quibusdam tantum? quid, quod etiam post perfectas omnes concoctiones, adhuc in illis dictus perseverat succus? quid, quod nunc serum, nunc lac euanidum, nunc oleagineum succum se se contenta in his vasis præferunt? quid tandem, quod in lacteis mesentericis diutius dictus liquor albus post mortem perdurat, quàm in thorace? Quod simile est, non est idem, & quæ assimilantur, eadem esse, non sic facile pronunciandum: multa siquidem videntur esse, quæ re vera non sunt. Quicquid lucet, aurum ne dicito. Sæpè etiam Artifices fallit rerum similitudo. Non solus chylus in corpore humano albus sacculus est: nam & lac, & adeps, & medullaris liquor, & piritia, & semen, & glandularum expressus succus alba sunt, & quandam possunt chyli substantiam æmulari; chylus tamen non sunt. Ille, cum in hominis natura succus sit adhuc incoctus, & natiuo calore imperfectus, ac spirituum inops, euanesceat, ac dissolui facile non potest: hoc enim eorum proprium est, quæ calida, haustuosa, & spiritali facultate sunt prædita. huiusmodi ros est, & ultimi alimenti superfluitas quædam, quæ in cadaueribus euanescent. Cætera, sanguis, lac, chylus, serum, alijque natiui humores facile etiam, nisi è corpore pellantur, & exeant, in mortuo corpore distinguuntur. Erit ergo, & in ventriculo, & in intestinis, & in mesaraicis quibusdam venis, mortuo etiam animali, chylus, si certis post cibum horis occidatur; & facile cognoscetur, & non sic citò in auras abibit: at quod in Receptaculi cavitatibus, & thoracico tubulo chylus adsit, non sic facile concesserim. Nec inconsultò dixi Receptaculi cavitatibus: quia si de venis, quæ per ipsum transeunt, à Iecore ad intestina pergentibus, loquamur, de ijs non ambigo, quin chylo quandoque exundent, vt ad Iecur inde feratur: Sed si de venulis in ipsius substantiam oblitteratis, deque illius sinubus sermo habeatur, chylum non continent, sed sibi congenitum, & familiarem album succum, vt supra ex Hipp. descripsimus; & hunc modò vberiore, modò parcior, modò

Quod simile, non est idem.

Multa chyli præferunt, quæ chylus non sunt.

Sanguis, lac, chylus non sic facile in auras abeunt.

Receptaculi venula, ac sinus non chylum, sed ingentem succum continent.

succu-

CAPVT DECIMVMQVARTVM. 63

fucculentum, modò inanem; prout vel benè, vel malè animal pascitur, & vel sana, vel ægra qualitate præditum est.

Idem de thoracico tubulo dicendum, qui & ipse glandulis multis, & substantia membranosa alba, ac pingui constat; vt infra melius dicetur, cum prius dixerò, seu repetierò, quid de horum omnium vsu iuxta veterum dogmata sit sentiendum. Et primò de Receptaculo, siuè vnicum corpus habeatur cum Galeno, Vesallio, Faloppio, Mercato, Zacuto, Riolano, le Noble &c.; siuè tres dictæ glandulæ lumbares cum Bartholino; cuiusmodi vsui d. datum à natura fuerit, si considerentur omnium supracitatorum Authorum sententiæ, definiendum est, non quidem ad chylum recipiendum; sed illud quidem primò propterea à natura conditum esse, vt vasorum à lecore ad ventriculum, lienem, ac intestina repentum, deductioni, securitati, fulcimentoque inferuiret; ne scilicet in motibus disrumpere, è loco dimouerentur, vel à mole intestinorum, aut spinæ duritiæ comprimerentur. Secundò, vt instar puluinaris cuiusdam, ventriculo, ne à dorsi ossibus lædatur; inferuiret. Tertiò vt pro ligamento intestinorum cum spinæ vertebrae esset. Ijs nos quartum, & meliorem ex Hippocrate vsum addere possumus, vt nempe, humiditatis, quæ in illa regione ab intestinis, ventriculo, iecore, ac vertebrae copiosa potest diffuere, & redundare, sit veluti depositarium, ex quo siccitatis tempore, gratiosæ retributionis merito, vniuersis spinæ articulis, pro ferendis laboribus, humiditate leni, vntuosaquæ, quædã instauratio, & alleuiatio succedat. Quem vsuum glandulis omnibus præcipuum esse, statuit Hippocrates *cir. lib. de gland. nu. 2.* his verbis: „Cæterum glandulæ in corpore sunt plures, & maiores in cauis ipsius
„partibus, quàm in articulis, & quæcunque in alijs humectis, ac sanguinolentis locis consistunt, atque illæ quidem, vt quod superne in
„cauas partes influit, suscipientes, in se trahant; hæc verò vt rursus
„nascentem præ laboribus humiditatem in articulis, si quam articuli
„remittant, eius multitudinem susceperint, & sic nimia humectatio
„in corpore non ineest: Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non
„statim nimia humectatio inde successerit: reflectitur enim, & consumitur, tum multa, tum modica in ipsas glandulas, atque sic reliqui
„corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentum hoc
„est ipsis coalescens: quare, vbi cænosæ partes sunt, & humectæ ibi
„etiam glandulæ. Id quod *nu. 3., & 4.* etiam exemplis confirmat, & probè adaptat mesenterij, ac renum glandulis, vt supra in octauo capite dictum est; Sicuti, & *num. 6.* hæc protulit: Porro intestina multam satietatem ex cibis, ac potibus habent, & præterea consumuntur in glandulas similiter, velut superior. Et hunc esse ipsius verum
vsu, ex hoc conijcio, quod vt plurimum, & qualibet hora, etiam à pastu distantissima, in eo multa serofitas, (quæ lactea, & crassiuscula cernitur), vt aliqui Laëtearum testantur inventores, & Clarissimi Torri-
rini confirmat experimentum, affluit. Eam autem, rationabile est, ex
I
intesti-

Receptaculi
vsus ex Gal.
& cæteris.

Alter vsus ex
Hipp. est hu-
miditatem
exigere, &
impansis.

Dictus com-
probatur vsus

intestinis per plures porulos, à iccore, & ventriculo per vasa lymphatica à Bartholino dicta, à vertebribus per thoracicum tubulum, eiusq; germina exprimi; itaut omnium contiguarum partium serositatis à nutritione residuæ, vel à conatibus, & laboribus pressæ, sit quoddam veluti promptuarium, seu lacuna; ex qua per meatulos in renes insertos eam à renibus attrahi, & in vrinarios meatus, vbi superabundat, deponi; sicuti e contra, vbi corpus reficcatum sit, tum dictos vertebrarum articulos, tum iecur, tum intestina, tum cæteras ab ea humiditate leniri partes, ac humectari, credendum est: Ad hoc enim præcipuè multas corporis glandulas ab Opifice summo procreatas esse tum in faucibus, tum in larynge, tum in vesicæ collo, tum propè scminaria vasa, tum propè aliquas articulationes, testantur præter Galenum, & Vesallium, *Mercatus tom. 1. lib. 1. part. 4. art. 6. quæst. 124.*, & *Zacutus Lusitanus lib. 6. de Med. Pr. hist. sect. 4. tex. de glandulis*; Quæ proinde omnium partium ad humiditatem, ac fluxiones recipiendas facillimæ, promptissimæ, & sic debillissimæ censentur, & ex Hippocratis voto, tum à *Gal. lib. 2. de sem.*, ac alibi. tum à cæteris Naturalibus, & Anatomicis prædicantur. Imò ad id destinatas esse omenti, & mesenterij glandulas, affirmat *Vesall. lib. 3. cap. 4.*

Plurimam
glandularem
vsum hume-
ctatio.

Lac in eo
reperitur est
sui alimenti
superfluum.

Nec ab hac opinione me remouet lacteis succus, qui ex ipso quandoq; maximè si scindatur penitiùs, & violenter prematur, exprimitur: illud namque sui alimenti residuum est: Vnumquodque enim membrum sanguinem, ex quo alitur, in succum suæ substantiæ simillimum conuertere, sciunt omnes, qui nutritiæ facultatis gnari putantur; itaut auctoritates pro hoc adducere, superfluum mihi videatur; Ideoque mirari non debebant nouissimi hi Anatomici, huiusmodi glandosum, pingue, & membranofum impluuium albo quandoque succo in vasculis ad suam nutritionem dicatis abundare, ac inde in inedijs carere, cum alioqui aquositas in suas cavitates recondatur: ita enim supra cap. 8. fuit à nobis ex Hippocr. sententia monstratum; & experientia ipsa id in cæteris glandulis, præcipuè autem mammarum, & thymi apprinè confirmat, etiam in puerulis recens natis, quæ si præmantur, lacteum succum educunt.

CAPVT DECIMVM QVINTVM.

Quid de lacteis, tum mesentericis, tum thoracicis, deque earum lacteo succo sit tenendum.

NVNC de lacteis quærere tempestiuum est, pro quo sciendum, venas eas, quæ ab intestinis in ramos mesentericos, & in Portæ venam abeunt, duplici aliàs ab Auctoribus officio dicatos fuisse; partim videlicet, vt ab ijs, & ventriculo ad iecur chylum exurgerent; partim verò, vt ab hoc ad illa commodum alimentum deducerent; Quarum disce-

differentia in hoc sita est, quod quæ chylo vehendo sunt, adeo, & in ventriculum, & in intestina insinuantur, vt ea omnino penetrent, & in eorum cavitatem hiantibus oscillis incumbant; quæ verò eorum alimoni inseruiunt, non adeò se se intrudunt, sed per eorum tunicas diuagantes, eas miris modis ambiunt, amplexantur, & fouent.

Dicendum ergo, quod & vascula lactea (: nam, & hæc venæ sunt, vt iam diximus), partim a ramis mesentericis producantur, ac per glandulas, seu Receptaculum transeuntia, in earum substantias intruduntur, ac finiunt; (quorum alia à parte superiore, alia ab inferiore, alia à lateribus deueniunt); partim, vel à lecore, vel à Portæ vena procedentia, & per dictas glandulas penetrantia, feruntur in intestinorum sinuositates. Quæ utrique parti, lecori scilicet, & intestinis communicant, arbitrandum est, ad lecur chylum deferre; quæ verò vni earum solummodo inhaerent, & in glandulas, membranas, ac pinguedines varijs modis disperguntur, & obliterantur, ponendum est, earum alitioni à natura dicata fuisse. Quæ si lacteo succo in bene pasto Viro quandoque referta videantur, non mirum; proprium enim partium nutritarum esto sanguinem in substantiam sibi similem transmutare, sicuti cap. antecedenti posuimus. Ideo cum mesenterium glandulis, ac pinguedine vndique exundet, duplicique constat membrana, merito in lacteum, albumq; succum, sanguinem, in suis venulis exilibus consistentem, commutat, vt in sui nutritionem agglutinetur, vti supra etiam de glandulis ipsis, & suis cavitatibus tactum est.

Exemplum pro hoc sit omentum, cuius si obseruentur capillaria vascula hora tertiæ coctionis peractæ, simili lacteo, pinguiq; sanguine plena conspiciuntur, & ab eo dulci, pinguiq; succo vterus pregnans, & mammae ditantur ex Hippocr. lib. de nat. pne. nu. 21. Sic & mammarum venulæ, quæ in glandulosa, & pingua corpora impinguntur, non absimili liquore etiam in Viris, infantibus, & non lactantibus mulieribus imbuuntur. Sic, & in thymi vasis in infantibus, & embrionibus idem obseruare licet; sicuti, & de cæterarum glandium venulis genericè pronunciauit Hippocr. quas nonnulli ad lymphaticas modò dictas transferunt.

Quæ igitur in asseueratione Pecqueti, & Bartholini venulæ lacteæ in glandulas, & Receptaculum induntur, nec ultra ad lecur transmigrant, iure mihi videntur inter eas esse, quæ pro dictarum partium enutritione à Galeno, & à Vesallio disponuntur, vtsupra cap. 8. citatum fuit, cui & illud maximè attestatur, quod eas capillares, & instar araneæ, & vix visibiles fibrillarum tenues, per mesenterium, & glandulas excurrere, intròq; in glandium corpora insinuari, iidem tradunt; facilis enim immutatur in his exilibus venis à nutritis partibus sanguis, quàm in magnis, tùm quia in minori quanto minor resistentia, in maiori maior datur; tùm quia tunicæ exilitas partium virtuti penetratio-nem facilem reddit; maximè cum, & venarum naturæ conueniat, quæ

Diuisio venulatum lactearum.

Cur lacteo succo hæc venulæ sint refertæ, & quod illæ sit.

Quod lacteus succus si sanguinis assimilari ex contritio-ne superflui

Ratio prima

Cur facilis in his venulis absceat sanguis, quæ in maioribus.

fermaticæ sunt, album gignere succum, *Gall. lib. 1. de sem. cap. 11. & 13.*

*Ratio secun-
da.*

Facit etiam, quod facillimè euanescere dictum succum, scribunt iidem Lactearum Auctores; quod signum est, dictam substantiam spirituofam, ac oleofam esse, quæ ideo vel ex dissolutione absumitur in inedijs, ac laboribus, vel disperit in nece, quemadmodum in carnofis partibus occiforum deperire, videmus, cum spiritu alimentofum succum; Id quod de chylo neutiquam cogitandum est, cum is sit substantia subfrigida, aquofa, & sic ad exolutionem inepta, vt patet ex eius substantiæ qualitate.

Ratio tertia.

Facit quoque, quod non in omnibus dictæ venulæ albo succo repletæ aspiciuntur; nam in vno ex duobus, quos Bartholinus eadem hora pastos, & strangulatos publicè pro experimento secuit, *cap. 5. de lact. thorac.* ne chyli quidem vestigium, siuè in Receptaculo, siuè in lacteis potuit inuenire; quod confirmat in alio cadauere strangulato accidisse *cap. 14.* Si enim chylus is est, in vtroque, & esse, & æquè videri debebat.

Ratio quarta.

Item facit, quod pleno adhuc existente ventriculo, & nondum ad intestina descenso (prout in multis quarta post cibum hora accidit), huiusmodi vasa albo succo turgentia conspiciuntur, vt apud dictum *Bartholinum legitur dicto lib. cap. 14.* Imò, & *cap. 16.* speciatim ait, se id obseruasse in canibus dissectis, in quibus ventriculus adhuc alimentis, „ crassis scatēbat. Vbi, & statim assumpto cibo idem apparere, ait „ his verbis. In thoracica lactea statim a pastu subtilioris cibi chylum „ reperiri, certum est) quamuis *cap. 16.* sibi inconstans, dicat, tunc ibi liquorem vix reperiri. Et ex altera etiam septima post cibum, & quacunque hora, talis aliquando succus in ijs reperitur, vt dicit idemmet eodem *cap. 16.* Si ergo adhuc in stomacho chylus est, quomodo potuit ex intestinis, in quæ lacteæ implantantur exugī? Et statim ingesto cibo, quæ chyli forma, quæ illius recessio potest considerari? Vel si iam distributiones factæ sunt (quod septima, & vltiori post pastum hora, nisi imbecillimus stomachus sit, supponendum) cur adhuc chylus in primis vijs moratur.

*Concluditur
quod sit la-
cteus succus
in ijs venu-
lis coëctus.*

Erit ergo is albus succus vltimi, & optimi earum partium nutrimenti superfluitas, quæ in dictis suismet vasculis peculiaribus asseruatur, vt in egestatibus pro alimento ijs inferuiat: Etenim vnaquaque pars, quod sibi a coëctione superest, in proximis, & sibi insitis vasis conseruat, & nisi ab alijs naturæ instinctu sibi eripiat partibus, (vt ventriculo, intestinis, iecori, & cordi pro totius enutritione accidit), eo potitur, & gaudet, viquequod vel in suam substantiam conuertat, vel superfluitatis pertæsa, per proxima oscula excernat: Vnde videmus, mammas, lac, testes semen, ossa medullam in sibi familiaribus vasis retinere, & in ieiunijs depasci; in nimietate turgere, ac effundere; & ijs priuata, alium pro deperdito succum ex proximis communibus canaliculis quærere, attrahere, coquere, & reponere. Ea verò omnia intelliguntur, vt in principio capituli distinximus, de venulis ijs, quæ

in glandulas ipsas, & mesenterij pinguedinem, ac membranas obliterantur: Alioqui enim quæ iter suum à iecore, vel Portæ trunco profequuntur in intestinorum cavitatem vsque, eas chylum, saltem tenuissimum, adferre posse, ac solere, non in facior.

Quod si cum Riolano, Ascellio, & alijs contendatur, à dicto Receptaculo multiplices meatulos, inferi in Portam, ac Iecur, iterum, vt dictum est, distinguere debemus, quod vel continuantur cum ijs vasis, quæ ab intestinis veniunt, vel in dictum Receptaculum finiuntur. Si primum, clarum est, eos ex ijs esse, qui chylum sugunt, & euehunt ferociorem. Si secundum, dicendum, ex ijs esse, qui ipsi, & mesenterio alimentum deportant, seu serum, seu lympham in cavitates illas exprimunt.

Hic verò me aliquis interrogabit: cur ergo in alijs mesentericis venis non succus albus, sed sanguis conspicitur? Respondeo primò, si illæ sint, quæ pro nutritione earum partium sanguinem ferunt, crassiores, maioreſq; multo lacteis esse, ideoq; non posse sanguinem sic facitè à partibus commutari, vt in capillaribus, & tenuissimis sit: si verò ex illis sint, quæ à ramis Portæ in cavitates intestinorum dehiscere conspiciuntur, & tempore distributionis chyli considerentur, facitè obseruabuntur in suis principijs, hoc est propè intestina, albescere, quò verò magis ad Portam accedunt, eo semper rubicundorem contentum in ijs succum apparere; idquè ex permixtione sanguinis semper in ijs aliquantulum, ne concidant, contenti, cum chylo; & ex aliquali coctione, seu permutatione, quæ ab ipsismet sanguisuis fit: Venis enim inesse quandam, etsi imperfectam, virtutem sanguificandi testatur *Gal. lib. 1. de nat. facul. 2. & 4.* Non enim mihi placet ea opinio ponens, chylum per lacteas in receptaculum colligi, ac inde ab alijs venis ad Iecur attrahi: hæc namque Naturæ opera inanis, & frustatoria videretur: quæ enim à dicto receptaculo gratia, & melior qualitas chylo dabitur? & ad quid multiplicare entia sine necessitate? & cur vias patulas deferens in dictas semitulas natura se coniiciet? Respondeo secundò id eis ex comitibus arterijs aduenire, à quibus per mutuas anastomoses sanguinem tenuiorem, & recipiunt, & vicissim reddunt; quod lacteis forsan ob arteriaci comitatus carentiam non datur; Et hæc Deusingij expressio est non inuicissimilis.

De thoracico tubulo, eadem, quæ de receptaculo, ferenda sententia est, illum nimirum à natura destinatum esse pro excipienda superflua humiditate, à vertebra in laboribus, & conatibus expressa, & à nutritione eiusdem medullæ, vertebrarum, & neruorum spinæ residua; illum verò succum lacteum sibi à sua nutritione superesse, asseruari, & potiò dissolui, vel nimium siccatis vicissim reddi contigujs articulationibus: corpus enim album, ac membraneum est, multisq; paruis glandulis, & pinguedine per totam spinam instructum, & exilibus suis osculis partim à receptaculo, cui contiguus, & annexus est; partim

Cur in alijs
venis mesen-
tericis san-
guis conspi-
ciatur.

Quis thora-
ci tubuli
usus, & suc-
cus.

ab Axillari, cui quoque inferitur; partim Aorta, cui incumbit, partim à ramis venæ sine pari, cui lateralis extat, pro sua alitione succum trahit, & nimium serum in Receptaculum deponit, vel alternatim ab eo recipit, cæteris humectandis partibus, & refrigerandis communiscandum.

Cur hic tubulus, ut plurimum vnicus, & finis.

Nec fuit sine misterio hic lacteus furculus, ut plurimum vnicus, inter spinam, & æsophagum excuriens, perq; sinistram spinæ partem conscendens à natura productus, cum sic inferuiat pro æquandis partibus; nam per dexteram excurrit vena sine pari à caua, vbi Cor transcendit, producta, & infra ad alendas pectoris costas omnes descendens, ut notat *Pesall. lib. 3. de corp. hum. Fabr. cap. 9.* Quæ quidem vena sine pari, ut benè notat *Falop. pag. 120, & 121.* per ramulos cum emulgentibus, & inferius cum alijs ramulis à caua productis inferiore, & circa lumbos, vel circa ultimam lumborum vertebam cum alijs ab eadem progenitis connectitur. Ideo nec mirandum, hanc lacteam thoracicā à caua sub iugularibus, & in axillares abeuntæ venæ sine pari lateralem produci, indeq; descendentem in lumbares glandulas inferi, ut æqualitas inter latera seruetur.

Probatur tubuli usus ascriptus.

Ad huiusmodi verò usum destinatum hunc tubulum esse, illud significat, quod non more cæterarum venarum lævis est, & cauus, sed imò pluribus anfractibus, & diuarcationibus intus intertextus; quod propriè non ad vehendum, sed ad conseruandum magis facere videtur; Sicuti, & ad dealbandum, serosumq; reddendum huiusmodi succum, faciunt multæ minutæ glandulæ, & pinguedinis exortus ipsi connati, ut experientia Caroli le Noble, in Riolani libro impressa, comprobatur, cuius verba sunt hæc: Producti ex eius (scilicet receptaculi) parte superiore duo canales thoracici longius protendebantur, quorum dexter crassitie pennam anseris æquabat, sinister verò exilior longè erat. Ambo minutis glandulis, & pinguedine abundabant, & in multos flexus, sinuososq; anfractus, in quibus videbantur vna coire, variè contorti, tandem adeo perfectè post medium sui curricula spatium inuicem iungebantur, ut ex duobus vnus &c.

CAPVT DECIMVMSEXTVM.

Tolluntur contrariæ obiectiones multæ.

ET hæc verisimilior erat de dictis partibus, seu canalibus, & eorum contentis, ferenda sententia; non autem, ad pauca respiciendo, ab antiquissima eidentissimaq; omnium, tum Philosophorum, tum Medicorum opinione recedendum; Omnibus namque confirmatissimum erat, iter chyli esse per venam Portæ in lecur, ut inibi sanguis factus per hoc in cauam, consequenterq; in Cor (ut Aristoteles), & ad cæteras partes omnes, (ut Galenus opinatur), iuxta cuiuslibet indi-

indigentiam pro nutritione liberaliter deferatur.

Neque negare possunt, dictas venas lacteas, mesenterij ipsius, & glandium nutritioni dicatas, partim à Portæ, partim à Cauæ ramis dimanare, ab ijsquæ sanguinem recipere, qui alimento ipsarum, & partium dictarum dicatus, lacteus fiat, eo quod molliores, tenuioresque sint, & ideo ab ijs degenerare videantur: quia id hæ habent à mollitie, & pinguitate partis, cui inseruiunt: aliæ enim similes in alijs adiposiss, glandulosissquæ membris videntur, quas tamen à cæteris venis germinari, certum est. Et, si *Galeno 4. de vsu part. 13. & Curtio pag. 131.* creditur, non sunt dissimiles eæ, quæ in iccoris substantia exillimæ, & tenerriimæ inueniuntur. Cui, & alia additur causa, scilicet exiguitas ipsarum, quæ ideo, & tunicarum tenuitatem necessariò exposcit, vt exacta proportio inter maiores, minores, & minimas seruetur venas.

Prima obiectio ponitur, ac tollitur.

Rursus, nec hoc concedere ijs durum videri debet, eo quia succum ab aliarum venarum sanguine dissimilem contineant: nec enim nouum est, quod ab eodem trunco ramuli emanent, sicuti ad diuersa munia dicati, ita & vario, dissimilique succo plenæ: Siquidem ab eodem Portæ trunco, & germinibus videmus venas ad chylim felleam bilem ducentes; alias ad splenem, & hæmorrhoides crassum, melancholicumque succum deferentes; alias sanguinem ad nutritionem partium porrigentes; alias chylum à ventre sugentes; & eas omnes suo familiari humore per tempora esse refertas; Sicuti, & de cauæ propaginibus idem dicere possumus: nam ab ijs deriuantur (quorundam opinione) vteretres, quæ vrinam ad vesicam traducunt; spermaticæ, quæ semen, mammariæ, quæ lac, & aliæ in alias corporis glandulas insertæ, quæ succum lacti similem, vel serosum in se continent: Vnaquæque enim pars, vt sæpè dictum est, & repetere iuuat, ad se delatum, vel attractum alimentum in liquorem sibi similem conuertit; omnequæ quod alterat, in suam naturam illud, quod ab eo alteratur, pro suo possit transmutat, ait *Gal. 1. de fem. 12.* Et idcirco non mirum, si eandem propagines vasorum diuersum succum pro diuersitate partium, quibus inseruntur, continent, nisi ex ijs sint, quæ solummodò per partem transeuntes, & magnæ, nil ab ea immutantur.

Secunda obiectio ponitur, ac tollitur.

Tertiò neque illi officit assertioni, quod hæ venulæ, vel earum aliquæ imò plures videantur ab intestinis deuenire: quia respondetur, tot, tantasque esse illorum circuitiones, & modò fursùm, modò deorsum gyros, vt tanti non sit, venas intestinorum nutritioni destinatas in mesenterium quoque, quod inuolutiones hasce undiquaque vnit, alligat, implet, ac fouet, redire, introire, ac milleformiter insinuari; Nec enim hæ solæ sunt, aut videntur in corpore venarum reditiones, Meandri, & inuolucra.

Obiectio tertia ponitur, & aboletur.

Quartò nec repugnat quicquam, quod solummodò in benè passis obseruentur huiusmodi lactearum turgentia, non autem in inedia oppressis, in quibus tantummodò serosus aliquis humor reperitur (vel etià ipsæ

Obiectio quarta ponitur, & dissoluitur.

ipsæ disparent venæ), vt obseruauit primò Pecquetus in cane macilentio, ac famelico viuo dissecto, & Carolus le Noble in muliere pariter per totam diem ieiuna, strangulata, & adhuc fumante aperta; quod videtur indicare, substantiam illam chylosam fuisse, & ad cor ideo iam conuolasse totam: quia respondetur inutilem esse hanc obiectionem: ex vna enim clarum est, quod in famelicis, addo & in gracilibus, & atrophis, primò omnium absumuntur, demacrantur, inaniunturq; debiliora membra, quales sunt glandolæ partes, & pinguis, ac facilè euanescentes liquor; serum verò, vt alitioni ineptum, superest: ita enim, & obseruamus de lacte, ac semine, in proprijs eorum receptaculis, dequè rore in cæteris partibus. Ex altera autem inconcludens est allata experientia, cui altera è diametro opponitur; nimirum aliquando etià in benè pascis, & obesis, succi prædicti non adesse in dictis lacteis vllum vestigium, vt obseruauit in Viro vndique sano, & obeso *Bartholinus cap. 5. de lact. thorac., & in alio simili cap. 14.* Quid igitur aliud ritè deducetur ex his, quàm similem succum esse quid superflui, quod citò absumitur? & quod adest, & abest citra læsionem aliquam subiecti?

Obiectio supra offertur, & aufertur.

Quintò nec obstat altera experientia, quod in viujs dissectis, vsquequò mouetur diaphragma; ex ligatura, citra Receptaculum indita, videatur chylus in lacteis, quæ inter ipsam, & intestina sunt, turgere, & ab intestinis ipsis fluere: respondetur enim, quod, cum duplicia vasa sint, quæ in glandulas recipiuntur, scilicet quædam, quæ ab intestinis fugunt, & in Portæ ramos, per dictas glandulas transeuntes, se se deferunt; quædam verò, quæ tùm à Cauæ, tùm à Portæ venis in ipsarum glandularum substantiam inferuntur, & inibi sinijunt, vt iam supra insinuauimus; primæ quidem fugent ab intestinis, vel ab ijs, si vera sunt, quæ ait Pecquetus, impelletur ab Anatomes feritate in eas; Secundæ, de quibus sermo noster, est, nequaquam; cum earum ora in intestina non penetrent. Imò has venas, quæ mesenterio, & glandoso corpori ad eorum nutritionem inferuntur, non ab intestinorum cavitatē, sed ab alijs supranarratis venis attrahere sibi familiarem succum, illud suadet, ac probat, quod, si aliter esset, in embryone non nutrerentur illæ partes, sed atrophia laborarent; Et hæc consequentia patet; quia saltem primis mensibus nil a fætu per os fugitur; ergo nec in cavitatem intestinorum, quicquam descendet, & sic nec in lacteas: tunc enim omne alimentum fætui per vmbilicalem venam, quæ recta in Iecur abit, suppeditatur: necessariò ergo ab hepatis venis debebunt enutrirī. Quod si quis dicat, posse haberi nutrimentum tunc à vena Caua per Lacteas superiores, non abnuam, sed hoc non quadrat illorū positioni, qui fatentur ob valvulas, quæ in ingressu tubuli lactei, in axillarem venam, ac in ipsius tubuli progressu reperiuntur, benè quidē ab infra supra, non autem a supra infra permeare succos. Sic docet etiam (& si m. alē) *Bartholinus lib. de lact. thorac.* Et quid quod in dictis fætibus ipsæ etiā venulæ mesentericæ plenæ albo succo conspiciuntur?

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM. 73

cur? nūm chylum dicent? vnde ille, si nil in ventriculum fugitur? Manifestum ergo, quod superfluitas vltimæ alimoniz, vt & in mammis, lac illud erit.

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

Respondetur ad experimenta contraria.

Hicce omnibus obuiam veniunt prædicti Auctores, eorumq; Affecle varijs suis experimentis nouis, quæ pro demonstrationibus habent, ac venditant; cum tamen reuera omnifariam nutent, & elabuntur.

Primum est, quod vascula, quæ videbantur à Iacore in Receptaculum meare, non chylum, non sanguinem, sed puram lympham exprimunt, ex quo lymphatica ea Bartholinus nominauit. Item, quod non à Receptaculo ad Iecur, sed à Iecore in Receptaculum se se exonerant, vt inde per tubulum thoracicum in Cor, cum chylo ipso lymphâ procedat. Illud confirmat propria euidencia liquoris puri, & lucidi; hoc patet ex ligatura inter receptaculum, & Iecur apposita, per quam videri, ait Bartholinus, dicta vasa propè Iecur turgere, & propè receptaculum inaniri.

Primum experimentum. quod alba vasa inter Iecur, & Receptaculum lympham ab illa in hoc suggerant.

Vtrumque autem caret subsistentia; Et primum, quia ex ipso met Bartholino dictus liquor euariet: nam in lib. de lact. thorac. cap. 16. dixit, esse eiusdem qualitatis (imò prorsus eiusdem substantiæ) cuius is, qui in receptaculo habetur; & in *Defens. vas. lact.*, & *lymphat. dixit*, ab aliquibus igni expositum, in gelatinam, quandamq; crassam, ac lentam substantiam conuersum esse (limpida autem aqua incrassari non solet); & vltcrius, quod idem est, ex eodem Authore, vtriusque succi iter, nempe per tubulum thoracicum in subclauias venas. Secundum autem non concludit; primò, quia eiusmodi experientiz in corpore dilaniato, vbique angustiato, dolente, & se contorquente, fallacissimæ sunt, & illos turgores, vt à naturâ irritata, & præter ordinem affecta emanantes, potius præpostero, quàm naturali modo fieri, est arbitrandum; (videmus enim, ventriculum affectum nauseare multoties, & euomere; intestina in iliis ad ventriculum fæces mittere, & in euictis à morbo decubitus in Iecur, Cor, aut Cerebrum fieri; sicuti, & in timoribus profundi sudores, ventris deiectiones, & urinæ fluxus etiam in sanis contingere). Et sic malè à motibus, & fluxibus, qui in animali sic languido, & extorto obseruantur, ad motus sanorum trahitur argumentum. Secundò quia, etiamsi valeret argumentum, nec sic posset certò concludi, per dicta vasa succum ab hepate deriuari; sed potius ad ipsum ire; exemplo ligaturarum, quæ in exercenda phlebotomia sunt in brachijs, ac tibijs, per quas videmus, venas, quæ infra ligaturam sunt, versus manus, ac pedes turgere; Et tamen clarum est, has venas, & originem, & sanguinem à superioribus recipere venis; causa verò est, quod liga-

Eiusdem insubstantia monstratur.

Experimenta in corpore dilaniato, & vndique angustiato fallacissima sunt.

tura, saltē dum fit, vel non nimis stricta languet, solitam adiuuat expressionem, vt in sequenti videbitur libro: quare sic etiam potius conuinceretur, succum naturaliter à receptaculo in lecur commeari, & chylum deferre (quicquid enim de circulatione sanguinis dicitur, per quam volunt Harueiani, in phlebotomia sanguinem venire à venis extremarum partium, in hanc; ab arterijs, videbitur eodem 2. libro vatum). Tertiò quando nec hæc daretur exceptio, non sic tamen tolleretur, quin per eadem vasa lecur traheret chylum, cum videamus, vt pluriēs docuit Gal., per eadem vasa, per quæ bonum trahitur nōxia pelli, idemq; vas, & tractioni, & pulsioni inferuire.

Secundum
experimentū
quod lacteus
succus à tu-
bulo thora-
cico ascen-
dat in Cor.

Ratio prima.

Ratio secun-
da.

Ratio terza.

Ratio quarta.

Ratio quinta.

Ratio sexta.

Ratio Septi-
ma.

Confutatur
experimentū
supradictum

Aliud experimentum est de lacteo succo, qui in tubulo thoracico reperitur, quod ascendat, exonereturque in venas subclauias, seu axillares, & ab his in Cor, non autem ad iugulares, nec ad brachia migret. Et huius validatio consistit primò in necessarijs legibus circulationis per quas, vt ipsi aiunt, sanguis ab his venis, sicuti, & ab alijs omnibus, in Cor procedit, vt inde per arterias in totum feratur, & hinc denuò in venas, continuata circulatione, redeat. Secundò in valvulis, quæ in sinibus dicti tubuli, & in ingressu axillarium, & ad radices iugularium internarum obseruantur, per quas impeditur, inquirunt, descensum liquoris ab axillari in dictum tubulum, ab hocq; in lumbare receptaculum; ascensum ad caput; & ad brachia meatum: vnde necessariò ad Cauam, & Cor illi eundem est. Tertiò in fistula, mortuo animali, dicto tubulo indita, ex qua inquirunt insufflari aerem in axillarem venam, & in dextram cordis aurem; contra verò nullo conatu posse infra in receptaculum introspirando efflari. Quartò si comprimitur abdomen, succus lacteus in thoracicum tubulum exprimitur; si verò collum, & artus, nil, nisi sanguis, deorsum abit. Quintò si findatur dictus tubulus, succum supra ascendere, nunquam descendere, videtur: Sextò per Pecquetum visus est lacteus succus in fissa Caua propè Cor à sanguine seiunctus. Septimo ligato canali thoracico in pectore, ille versus superiora flauescit, versus inferiora extorquet.

Sed & hæc omnia experimenta inconcludentia, eorumq; conceptas illusiones fallacissimas esse, constabit illis: Et primum non obstat ex ipso met Bartholino, qui lib. de lact. thorac. cap. 13., vt probaret chylum ab inferioribus ad superiora repere, attulit historiam Diui Pauli decollati, e cuius vulnere lac prodixisse dicit ob dicti chyli redundantiam (quàm tamen perperam hoc adstruxerit, à Pallierio lib. de lact. vera gen. cap. 18. tangitur): ergo ad iugulares per eum ibit. Item ab his tubulis chylum in mammas pro lacte gignendò pcedere, dixit cap. 18. idem Bartholinus (etsi malè, vt à nobis lib. 3. cap. 1. huius operis monstrabitur); si autem in mammas, ergo, & ad thoracicos riuulos; ergo non in cor. Item, & in missione sanguinis aliquando serum lacteum, & aliquando aliquid lactei sanguinis obseruari, tradidit eod. cap. 13. in puella Hafniensi, etsi hoc postea, sicut, & alia retractauit eir. lib. de sens. pag. 127., & 128.

Circula-

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM. 75

Circulationis autem leges, Veteribus ignotæ, mihi verò, & plerisque Medicis suspensæ, experimentisque, à dilaniatis, & emouentibus animalibus sumptis innitentes, potiùs res chimerica est, ac imaginaria, quam in re subsistens; & illis securiora experimenta, à sanis, viuentibusque hominibus sumpta, aduersantur; & aliæ rationes leges illas refellere commodè possunt. Ali enim corpus nostrum non quidem arterioso, sed venoso sanguine, & ab arteriis in venas difficiliùs, ab his autem in illas per anastomoses facillimè sanguinem infumit; illarum continuus motus, spirituum agitatio, calorque euidentior; harum verò quies, & in calore tepiditas; tum vtrarumque originis modi, & vasorum substantiæ diuersitas; tum, & Antiquorum Medicinæ Procerum auctoritas, attestantur eximè, vt latius in sequenti libro disserteretur.

Responde-
tur ad primam
rationem.

Alii corpus
non arterio-
so sed veno-
so sanguine.
rationes la-
guntur.

Neque aliquis arripiat occasionem me carpendi ex eo, quod in Con-
futatione opinionis Felinianæ circa saphenæ sectionem, ipsum Aucto-
rem dictam circulationem negantem impugnauerim: Nam si benè mea
ibi scripta legantur, non in eo, obstiti, quod circulationem æget, sed in
negandi modo; vtque ostenderem, ipsum non benè obiectionem soluisse;
Nec Harueianam circulationem amplectendam esse; sed benè excur-
sum sanguinis ab infra supra, ab extra intra, à mammis ad vterum, ab
hoc ad epigastrium, & in omnibus e contra dari in natura tum ægro-
tante, tum sana, perhibui; probans exinde, per saphenæ sectionem
citra violentiam vllam deriuari, & euacuari ab vtero.

Tactæ cui-
dam censu-
re respon-
detur.

Secunda ratio, à valuiis sumpta, nihili valet: nam valuiæ à natura
efformatæ sunt, ne à violentis motibus sanguis, vel alij succi præter eius
voluntatem fluant, refluantque non autem, vt seipsam impediãt, quo-
minùs, quod voluerit, possit, & sanguinem, & cæteros succos impellere
citra ipsarum resistentiam: Irrationabile namque est putare, quod Na-
tura valuias nesciat suis loco, & tempore claudere, aperire, & sangui-
nem ab infra supra, à supra infra, & ad latera, prout ei libuerit, appel-
lere; quæ alioqui per ossa ipsa semitam sibi parat.

Responde-
tur ad secun-
dam ratio-
nem.

Tertium experimentum itidem est imbecillimum: nam alia est via
vento, seu aeri, alia liquori sufficiens: ad illum enim quælibet, etiam
visum latens porositas satis est, ad hunc non satis. Item alia est violenti-
æ, alia naturæ, operatio: per eam enim intrudet, & humor, & aer, quò
natura non trudet, nisi aliunde impedita, aliòque coacta. Sic si insuffletur,
aut clysterizetur sedes, turgeunt superiora intestina, & ventricu-
lus; cum tamen naturæ naturalis additus sit e contra, scilicet à ventri-
culo, & superioribus ad Sedem. Si insuffletur penis, vel per catheterem
indatur humor, vesica flatu, & humore distendetur, cum naturalis excre-
tio opposito modo se habeat. Sic si inter pellem, & carnem in feris
fistula indatur, & suffletur, totus inflabitur ambitus, & tamen corpori
rectè se habenti hic non est sanguinem, aut humores transmittendi me-
tus, non hæc iter visitur. E contra viæ adfunt naturæ faciles, quæ no-
bis impenetrabiles apparent. Sic, si spiritus, & liquor in os intrudatur,

Ad certam
dicitur, aliã
viã aeri,
aliã liquo-
ri dari. Alia
violentiz,
alia naturæ
operatio est.

Viæ naturæ
faciles nobis
impenetra-
biles appa-
rent.

ventriculus quidem implebitur, ad Iecur autem, Cor, cerebrum nil vi pertransibit; cum tamen naturæ viacula pateant per venas, arterias, & nervos in Iecur, Cor, cerebrum, Lienem &c. Sic in cartilagine, & ossa ipsa nutritius penetrat humor; quod arti neutiquam concedetur. In summa vis, & natura opposita sunt. Ex eo ergo, quod insufflatus ventus, vel etiam liquor per axillarem in Cordis sinum dextrum impellatur, non potest deduci, eam chyli, ac sanguinis viam naturalem, ac ordinariam esse. Et cur non æquè concludet, à Corde, vel, ut verius loquar, à Caua, & subclauia sanguinem in tubulum illum lacteum, ut in venam sine pari ex alio latere, si non per vim, natura ipsa prodire?

Hic se exprimit Bartholinus *d. lib. Defens. pag. 124.*, nesciens videre, quomodo, si liquor, vel flatus, per fistulam immissus in lacteam thoracicam, potest inoffenso pede ad Cor pertingere, non possit eodem chyli penetrare: Sed, præter iam allatam rationem, respondetur, his partibus vacuis, & ab externo instrumento dilatatis, hæc posse fieri, quæ non fient, his plenis existentibus, & ab intrinseca facultate in naturali suo positu rectis: corpore autem sano, vena axillaris plena est; & à Caua recipit facillimè, si quid sibi deest; & valvula illa, ostiolis tubi lactei superposita, à præexistente sanguine clausa sistitur: cur ergo non sic interdicitur chylo (si is est) illac accessus ad Cor?

Responde-
tur ad quartam
rationem.

Quartum experimentum nullius quoque valoris est; primò quia, compresso abdomine, comprimuntur glandulæ, ac pinguedines mesenterij simul, & sic necesse est, ut in ijs existens fensus, vel lacteus succus in canales vicinos, ac in eas insitos exprimatur: si autem, vel collum, vel pectus prematur, non comprimitur lacteus tubulus, qui clauiculas non pertransit, qui a Spina retrò, à costis ante clauditur; & sic nec potest in eo existens succus deorsum trudi. Addatur, quod, dato etiam, per compressionem non posse lacteum succum exprimi propter valvulas, non ob id conuincitur, succum illum fursum fluere naturaliter, cum possit ibi ob alitionem quiescere, vel etiam infra moveri, natura, ubi opus est, ut diximus, valvulas aperiente. Sed, quod maius est, huic experimento è diametro opponitur aliud Caroli le Noble, qui, discisso Receptaculo, vidit, per ipsum etiam tubulum exinaniri: non ergo verum, quod deorsum non possit liquor ille tubi lactei descendere.

Experimentum
huc ex
perimento
contrarium

Responde-
tur ad quintum.
In deliquijs
omnia ad
Cor abeunt.

Quintum nec magis vrget: nam in deliquijs, & cordis passionibus omnia fursum abeunt ad Cor: interdicto ergo ei itinere per ligaturam, non mirandum, si per inditum vulnus ab inferioribus succus ille ascenden- do exeat; quod non fiet in corpore naturaliter se habente, in quo omnia secundum naturam, & quiescunt, & moventur.

Responde-
tur ad sextum.

Sextum omninò incredibile. Dispeream, si vnquam, secta Caua (ni sanguini intercludatur iter, vel ni prius totus effundatur) videre liceat, lacteum succum in sano homine à cruore sciunctum, nec, si viderem aliud, quàm fallaciam circulatoriam crederem. Sed iam huic renunciare experimento, cum dicant, lacteum succum; ubi in axilarem decidit

VENAM,

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM. 77

venam, simul sanguini misceri, nec posse distingui; sic referente Iohanne Rioli, in suo Opere contra Pecquetum, & Pecquetianos.

Septimo eadem quadrat responsio, quæ supra data est primo experimento, & quinto, nempe quemlibet spirituosum succum patiente corde, versus illud concurrere; per ligaturas fluere non solum citrò, sed & trans originem; nec posse bene argui à violenta, & præternaturali operatione, ut est quæ sauciato animali accidit, ad naturalem, & spontaneam, quæ sano homini contingit.

Respondetur ad septimum.

A violenta ad naturalem actionem non bene arguitur.

CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

Adducitur Excellentissimi Torrini nuperrimum experimentum, & illud in propria sententia confirmationem trahitur.

SED omnium hucusque adductorum experimentorum euidentissimum illud sanè esse videtur, quod anno proximè elapso Taurini pluries produxisse fatetur Excellentissimus Bartholomeus Torrinus, per quod omnium oculis obiecit purum lac, seu chylum in Cordis dextrum ventriculum & thoracico tubulo per Cauam ingressum; ut propterea amplius dubitandum non sit, quin illa concedens sit chyli semita, prout tradiderat cum Bartholino Pecquetus; Cuius exercitij, verè sagacissimi, ut summa sinceritas, & simul energia melius intelligatur, mihi libet proprijs Illius verbis, sed è vernaculo in latinum idioma translatis, historiam, prout iacet in familiaribus suis ad Excellentissimam Marchellum datis, hic referre. Chyli (inquit) via (sublato dubio, quod aliqua eius portio per mesaraicas vnà cum circulato sanguine ad securi incedat, quod quidem non omninò inuerisimile est) patet ad Cor. Et ego in plusquam centum, quos secui, canibus illius progressum hoc modo intuitus sum: Excunt lacteæ capillares, mirabilibus, & innumerabilibus intertextibus ditatæ, ab intestinis, illincq; in crassiores diductæ trunco, inmittuntur in magnam glandulam centri mesenterij immediatè receptaculo hærentis in medio renum. Hinc plurimi ramusculi liquorem illum transmittunt in dictum receptaculum, sæpè à me repertum tribus purissimi lactis vncijs refertum. Via a receptaculo ad subelauias adeo nota est, ut nil magis. In his clarissima est lactearum insertio vna cum valvulis ad oscula intus positis, iam à Pecqueto notatis. Ab his equidem alia via non cernitur ad Cor, quam Caua, per quam chylus simul cum circulato sanguine restat illud incedit. Sed, ut quilibet alterius viæ scrupulus adimatur, sic facio: Quemlibet canem, & qualibet hora post prandium (quod parùm refert, dummodò vigesimam quartam ieiunij horam non attingat), dissecō, statimquè, minimè communia à proprijs tegumenta sciungens, nè in laniena paucus ille chylus, qui inibi semper adest, raptim ad Cor conuolet totus, ut & alijs, & mihi contigit, quando

„ quando volui, vt sic dicam, prius decorticare, quàm scindere, id quod
 „ suafit, illa sola hora determinata chylum obseruari; Hinc sub clau-
 „ culas me conféro ad Spinæ, Aortæquæ sinistram, vbi subaspicitur à
 „ sola pleura canalis thoracicus intectus. Scissum illum leuiter, cele-
 „ riterquæ à pleuræ latere, ligatura constringo, eò tamen, vt possit
 „ vinculum pro arbitrio laxari, quod commodè obtinetur ferreo instru-
 „ mento, studiosè fieri curato. Certior inde factus, non posse chylum
 „ interius in venam subclauiam introire, scindo in ventre inferiore Ca-
 „ uam, Aortamquæ subtus Renes ad hoc, vt totas ex vtrisque venis
 „ exeat sanguis. Ijs exanguibus redditis, Cauam immediatè infra Cor
 „ alligo, indeq; vinculum, thoracico appositum soluo, vt chylus sursum
 „ valeat conscendere; Leuiquæ facta receptaculi compressione, sicuti,
 „ & per totum tubulum, totum illinc chylum in subclauiam exire curo.
 „ Hoc peracto, dextrum Cordis ventriculum abscondo, & ecce puri
 „ chyli inde copia egreditur.]

Septem in
 hac facti se-
 rie ponde-
 rantur.

Hæc tota facti series est: circa quam tamen nonnulla mihi præliban-
 da, & ponderanda sunt. Et primum, quod ibi nulla alia probatio, nulla
 alia coniectura producit, succum illum ab intestinis in receptaculum
 progredi, quàm similitudo laquearum venularum, quæ ab intestinis in
 pancreas desinunt, cum ijs, quæ à pancreate in lumbare receptaculum
 implantantur. Secundum, quod succus in receptaculo inuentus lac pu-
 rissimum æmulatur, & est. Tertium, quod quauis hora secetur canis,
 dummodò viginti quatuor à pastu horas ieiunium non excedat, succus
 ille in receptaculo reperitur. Quartum, quod, vt ad Cor eat, compres-
 sione, non in receptaculo tantum, sed & per tubum ipsum veluti ma-
 nuducendus est. Quintum, venas vtrasque prius reddi exangues, & per
 consequens cor ipsum. Sextum, alligandam esse Cauam, propè, sed
 infra Cor. Et septimum, ex Corde lac, seu chylum non commutatum
 in sanguinem, sed purum egredi.

Ex ijs totidè
 ad propriam
 sententiam
 firmandam
 obiciuntur.

His præponderatis, nonnulla, quæ ad nostram firmandam senten-
 tiam summè faciunt, facile est elicere. Et à primo quidem, non magis
 inde liquere, vtrum succus ille albus ab intestinis in receptaculum tran-
 seat, quàm hinc illuc communicetur. imò potius vltimum suaderi pos-
 set: ij enim intertextus moram potius, quàm transitum, vel meatum,
 indicant. trunci præterea illi originem in pancreate portendunt, non in
 receptaculo; quo etiam, vel carent, vel longè alio homines potiuntur.
 Exiguitas quoque, & innumerabilitas ramusculorum potius irroratio-
 nem, nutritionemq; propriam, quàm publicum iter, ostendunt. Nisi
 forsan à necessitate summa Natura ducta, ab his tenuissimis viaculis
 aliquid trahere satageret; quod in repentinis, & magnis dissolutionibus,
 & excretionibus immodicis, vel extremis posse fieri, non est ambigendū.

A secundo, euident probatio, succum illum non esse chylum, est,
 quod sit veluti lac purissimum: Est enim hoc in vberibus, in thymo, in
 omento, in glandulis alijs, alimenti proprii laudabile superfluum; nec

CAPVT DECIMVM OCTAVVM. 79

in his omnibus, vtcunque sit, à ventriculo discedens colligitur, vt ad Cor sanguificandum ascendat, cum trans Cordis viam partes illæ sitæ reperiantur, & in ijs ille succus asseruetur continuè: Ergo de illo idem dicendum succo, qui in Laetibus reperitur.

A tertio verò deducitur, quod succus ille, ni laniena fiat, non est ad Cor iturus; Et hæc consequentia clara est: quia à sano ventriculo in quinque saltem horarum spatio coctio peragitur; traductio inde raptim, & hora vna, vel altera completur, vt conijcitur ex noui cibi appetentia in pluribus: ergo ad hunc finem si in tales cavitates, ac meatus conijcitur, non est, vt ad viginti quatuor horas ibi asseruetur. Igitur aliquid necesse est esse, illis regionibus lacteis familiare. Nec hæc effugietur obiectio ex eo quod, animali dissecto, nisi tubus ille alligetur promptè, is ad superiora succus facillè labitur: respondetur enim, tunc hoc ex sanguinis effusione, & Cordis angore provenire: accidit namque, vt innata vasa, & veluti famescens Cor vndique ad se quencunque aggregent succum, non tangendum forsan, si plena, & apto cruore donata degunt, vt quando sanum, & opportunè cibatum est corpus, in quo ad 24. horas is asseruatur.

A quarto elicitur, non esse illi succo talem viam familiarem, ac assuetam pro transitu ad superiora; cum egeat, vt veluti manu ducatur, & cogatur vsque ad subclauias venas; alioqui ex se ipso, vinculo soluto, euolaret, vt ante ligaturam fieri prætenditur, nec vlla pressione esset opus.

A quinto item desumitur, detegiturque summa quædam necessitas tum in Cordè, tum in venis omnibus vndecunque trahendi, nullo ad substantiæ degenerem naturam habito respectu, vt euenit famelico, qui cibi varietatem, vilitatemque & sitibundo, qui alienigenam potus qualitatem minimè curat, multoque minus si parum ab assuetu degenerent, vt à sanguine lac: proprium enim viuientis cavitatis est succum aliquem trahere, ne ex vacuitate concidere cogatur, maximèque vbi vis naturalis viget, vt in laniato, cui nullus associetur præter naturam affectus: hæc autem omnia cessant, si naturali modo plena sint, quæ plena esse debent.

A sexto arguitur insuper, ex ligatura illa, Cauæ indita, cogi Cor, si viuere habet, vt à transuersis attrahat, cum ei naturalis via denegetur ex Iecore; quemadmodum ventriculo vsuuenit, qui, vbi cibo fraudatur, à venis ijs, ad quas alimentum ille transmittere, vel verius præparatum permittere solebat, succum aliquem, & aliquando prauum, sugere cogitur; vnde vel appetitus sedatio, vel etiam fastidia exurgunt ijs, quibus hora solita cibandi per tempus considerabile contenditur. De cætero, vbi naturalia, directa, & consuetæ suppetunt, quod aliena, indirecta, & insueta appetantur, quærantur, trahantur, inconsulti iudicii est, & à Naturæ sagacitate abhorrens.

A septimo tandemprehenditur, quod in principio contendebatur, minimùm Cordi nullam sanguificandi vim aliam inesse, quàm eam, per quam iam factum sanguine in spirituosum magis, tenuiorem, calidior-

rem,

rem, ac viuidiorem reddere est potis: Alioqui non sic purum lac, in se ob necessitatem attractum, persisteret, quin aliqua saltem rubedine tingeretur.

Summa eo-
rum, quæ ab
experimen-
to hoc deducuntur.

Ex his ergo, ut summam colligam omnia, aptè deducitur, vel lacteum illum succum, qui tunc raptim confugit ad Cor, chylum non esse, sed earum partium superabundantem nutritioni succum; vel eam quidem viam chylo, (si modò chylus ille est) ad Cor traducendo non esse naturalem, & consuetam; sed tunc forsan summæ necessitatis violentia ductum, aliquid inde venari angustiatum, & ob angustiam deficiens Cor, ut longiusculam vitam, quamuis miseram, & cadentem, adhuc trahat, prout iam superius *cap. 8. 10. & 12.* ex Riolano concessimus, esse posse: Nostra enim argumenta, nostra quæ contentio de solito chyli itinere pro sanguificatione, & nutritione naturali propaganda, fuit; quicquid autem ad aliquem alium totius corporis usum, non per subclauia tantum, sed per vniuersam hominis compagem fit, ut vellet Bilsius, siuè ut pro refrigerio, siuè ut pro humectatione, & irroratione inseruiat; & quicquid, extrema cogente necessitate fiat, id a nostro cadit intento, ad solam pro nunc officinam, motum, usumque sanguinis prostituto.

Ad quæ An-
doris exis-
tetur, & re-
stringatur
contentio.

CAPVT DECIMVM NONVM.

Tolluntur Bartholini oppositiones de lactearum succo.

Prima Bar-
thol. oppo-
silio.

Solutus;
Nutrimenti
vberitas quo-
eunque tem-
pore appare-
re potest.

NVnc ad cætera dissoluenda, quæ contra sententiam nostram de Lacteis, de quæ earum succo adhuc aliquid facere videntur, accedamus. Soluendæ igitur sunt in primis rationes, quæ à Bartholino opponuntur in *pag. 180.* contra Harueium; quibusquæ videtur contendere, succum illum in lacteis, glandibusque; repertum, non esse superfluum nutrimenti; tùm quæ *pag. 182.* per ipsum probare nituntur, illum succum esse chylum, qui deferretur ad thoracicam lacteam. Et pro prima opponit, quod, si ab vberiore nutritu superesset albus ille succus, vel appareret solum finita distributione, vel semper, & in quolibet appareret; quod vtrunq; videtur experientiæ repugnare. Respondeo, neutrum horum esse necessarium, aut in talibus perpetuum. Non primum: quia vberius nutrimentum quacunque hora apparere potest, ut lac in mammis, semen in testium vasculis, sanguis in Corde, hepate &c. non secundum: quia si in inedia seruatur animal, vel in adipem superfluitas abit, illud superfluum omnium primò consumitur. Et hæc ratio est, cur in famelico, & in alio præpingui non fuerit dictus lacteus liquor ab Eo inuentus. Quod si insistatur, solum finita nutritione, ei apparendum esse, etiam hoc concessio, potest nostra positio sustineri: nam cum cibum assumitur, tunc finita est distributio, in vniuersas partes, & ideo ad alium cibum assumendum pro futuro alimento ventriculus incitatur: dum autem in ventriculo sit coctio, in cæteris quoque partibus fit, & ea finita,

CAPVT DECIMVM NONVM. 83

finita, ad nouum attrahendum succum infurgunt; Et sic patet, quod tūc statim assumpto cibo, tūc finita chyli coctione, nutrimenta vbertas potest in partibus reperiri.

Sequitur: in vniuerso corpore concoctio peragitur: Cur ergo in solo abdomine magis, in thorace minus, in capite nihil de dictis lacteis tubulis reperitur? Respondetur, non in cuiuslibet partis coctione album succum gigni, sed pro diuersitate naturæ partium, diuersum quoque affluere nutritium succum; in ventriculo chylum; in hepate, & corde sanguinem; in liene atrum humorem; in testibus semen; in ossibus medullam; in vberibus lac, in omento, mesenterio, thymo, cæterisq; glandosis, & adiposis partibus lacteum succum.

Repetit: Etiam in male habentibus, quandocunque in ventriculo coctio peragitur, dictæ lacteæ venæ in abdomine inueniuntur plenæ quasi dicat in his corporibus vbertas esse non potest: ergo succus ille nutriti menti vbertas non erit. Dic: Etiam in morbosis, dummodo facultas nimis imbecilla, tabida, & ex succa non sit, vltima coctione peracta, aliquid albi succi in determinatis lacteis adinueniri, minus tamen albi, vel aliquando etiam flauescens, quo magis, vel minus partes præter naturam affectæ sunt. Dic etiam, in huiusmodi tabidis vix posse dictum succum inueniri, & quia parum sumitur, & quia vix concoquunt membra: in alijs vero morbidis corporibus, si facultas naturalis non admodum patitur, & cibos assumi, & membra nutriri, & in illis dictum succum, vt dictum est, reperiri.

Subdit: Si pinguior chyli pars in lacteas exugitur, reliquum corpus optimo nutrimento fraudabitur. Dic, non à parte pinguiore chyli, sed à concocto, & assimilato sanguine illud alimenti superfluum per Nos fieri. Ideo non fraudabitur corpus reliquum, sed vnaquæque pars, quod sibi magis placet, ac delectat, attrahet, & in sibi similem substantiam coquendo conuertet, vt ex ea, quod de substantia per continuum effluuium deperditum est, instauretur.

Cætera, quæ ibi subiungit, cum ad nostrum casum minimè faciant, hic à nobis prætermittuntur. Addemus tamen eiusdem Authoris rationes, quibus probare nititur, album succum illum chylum esse, quæ duæ sunt. Earum prima sumitur ex continuitate cavitatum, & identitate, vel similitudine succi; Altera ex continuitate motus eiusdem succi, siue spectetur terminus à quo, siue terminus ad quem. Inquit igitur.

Continuus est cavitatum commeatus. Ex ventriculo per pylorum cremor candicans intestinis infunditur, de quo nemo dubitat. Ex intestinis tria vasorum genera excipiunt, venæ, arteriæ, & lactea vasa. Non venæ, quia primò nullum vestigium vnquam in ijs observatur dicti liquoris. Secundo venarum est vehere sanguinem, non chylum. Tertiò venæ illæ circulationi inserviunt, vehendo scilicet sanguinem, ab arterijs adactum, ad hepar, & cor; quod ligatura conspicitur.

Secunda oppositio eliminatur.

Solutur.

Tertis oppositio.

Solutur; et in morbosis vberius alimentum visitur.

Quarta oppositio soluitur.

Primo Bartholini ratio, quod lacteum succus chyli sit.

Quarto

Quarto distincta sunt vasa lactea à venis; cum hæc semper rubeant, illæ candicent. Non arteriæ: quia his etiam, qui lacteas impugnant, indubitatum est id. Ergo lacteæ venæ solæ huic muneri dicatæ sunt. In hisq; eiusdem qualitatis, & candoris liquor, qualem coxit ventriculus, semper reperitur; qui quidem, etsi purior appareat, cuneit, quia ab intestinis fæces fecernuntur, & à lacteis angustioribus depuratur.

Altera ratio
ad idem.

Idem manifestè prodit dicti succi moti terminus à quo, & ad quem. Terminus à quo est ventriculus: hinc enim chylo scatent illæ venæ, quando chyli sit distributio, & successiva ventriculi cœstio, aliàs nunquam. Terminus ad quem est receptaculum, & denique Cor: si enim conspectiores lacteæ ligentur, non ad hepar, sed ad dictam chyli lacunam videtur ire candidus succus, & inde ad subclauias, & Cor.

Soluitur præ-
ma ratio.

Hæc duæ rationes non magis cæteris hucusque tactis vrgent. Etenim continuïtas vasorum nil pro ipso concludit: quia iam per Ipsum sunt alia vasa præter lactea, quæ ventriculo, & intestinis communicant, sed continuantur, & non minus, imò magis, quàm ea, possunt attrahere, & reuera trahunt, prout tum Hipp.; tum Galen.; tum Veteres omnes docent. Quibus nouissimè Ludouicus Bilsius dexterrima Autopsia fidem ocularem addidit, dum sine crûoris effusione Canem benè passum in abdomine aperiens, ac arterijs colligatis, & nudò consuens, & aliquid inter cardiaci liquoris exhibens, post aliquot horas iterum aperiendo, publicè monstrauit, in mesaraicis cinericijs liquoribus contineri, qui foras extrahus ferè sanguinis instar congelabatur, vt non semel testificatus est Antonius Deusingius maximè *lib. de chyli motu num. 56.* & *disseruat. Epistol. de hepatis officio ad eundem Thomam Barthol.* Nec dubium facit, quod nunquam in ijs obseruetur candidus succus: quia primò, vt modò diximus, si diligentia Bilsi adhibeatur, poterit inueniri, cum aliqui, si non reperiatur, id tueniat, quia statim à cruce tingitur. Secundo nec dubium, quin lactearum ipsarum mulier sint mesaraicarum, &

Venarum
vltius non ad
solum sangui-
nem venarum re-
stringitur.

Vena chyli
ab intestinis
attrahitur.

Cauæ germina, sicuti iam ostensum est. Neque illud absolutè verum, venarum vsum esse sanguinem vehere: nam, & serum in renes, & bilem in cystim, sanguinis fæcem in lienem, lac à mammis, & ad mammas ducunt; tum succos omnes, ac excrementa in cacochimis, ac incrisibiles ad aluum, vrinam, ac sudores transmittunt; pro quo videatur *Gal. 3. de natur. facul. 13.* non ergo mirum, si & chylum, mediâ hepatis, & propriâ vi trahunt tum ob aliquam cum illo sympathiam, tum ob alimenti defectum, tum ne in ijs detur vacuum; cum cæteræ omnes corporis venæ consequenter à radicibus alliciant; Id quod pulchrè firmavit *Hippocr. lib. de carn. num. 12.* dum dixit: Venæ ex ventre, ac intestinis in quæ cibi, ac potus colliguntur, postquàm hi fuerint calsacti, tenuissimum, ac liquidissimum trahunt; crassissimum autem, ac fæx isthic relinquitur, computrescitq; ac fit stercus & hoc repetit *num. 13.* De circulatione, quatenus ipsa detur, dicendum est, eam huic chyli attractioni non obstare, imò eam mirè promouere: cum enim ad hepar sanguinem

guinem à paucioribus arterijs adductum venæ copiosiores diduxerint, ne in ipsis detur vacuum, manifestum quod ab ijs per continuam cavitatem attrahetur proximus, & illis non dissonans succus, præcipue per ora illa, quæ non arterijs, sed intestinorum cavitatibus implantantur. Atverò, quod refert magis, eam circulationem non dari, abundè probabitur libro sequenti.

Distinctio quoque coloris nihili penditur: albedo enim omnibus venis propriè, siuè inseparabiliter inest, itaut, sanguine dempto, nulla inter ipsas, & nervos circa substantiam, & colorem differentia subsit. imò ex hoc Vesalius ansam arripit contradicendi Geleno in eo, quod dixerit, venas mesaraicas aliquam gignendi sanguinis virtutem habere; nam alba (inquit) substantia quomodo rubrum succum ex albo efficiet? quod etiam Galeni argumentum est *lib. 6. de placit. Hipp. & Plat. cap. 8.* Sed inutiliter arguitur: quia, si legantur, quæ hic dixit *lib. 4. de usu part. 17.* videbimus, venarum proprium officium esse, vt chylum, & sanguinem devehant, secundarium verò, vt ipsum ulterius concoquant, non gignant. Quare si mesaraicæ venæ à lacteis per colorem distinguuntur, non id à propria substantia, sed à contento obtinent.

Sed & arterias modicum, quid in se ipsas de chylo assumere tum ab intestinis, tum à ventriculo, apud me dubium non est, qui ex hoc proveniunt tam citum vitalium virium robur ex assumpto cibo, ac spirituosu potu, procul dubio affirmo. Ex quo enim alio pulsus magnitudo, ac vehementia post moderatum cibum assurgit, nisi ex mutua nativæ caloris, ac cibi actione; & reactione per arterias adaugeatur, roboreturque nativus calor? Hanc arteriarum assumptionem ipse Galenus agnovit, & docuit *lib. 4. de usu part. 17. his verbis*: Et quod officia arteriarum, ad intestina pertingentia modicum quiddam cibi assument, plurimum autem venæ. Sicuti & *lib. de natur. facul. 3. cap. 13.* post medium Nutrimentum (ait) cum per tota intestina permeet, per vasa, quæ ad ea pertinent, rapitur; plurimum quidem in venas; exigua quædam portio in arterias. Sicque concludit *cap. 14. in fine*: Non est ergo mirandum, si ex ventre prorsus exiguum, quantum scilicet exquisitissima est confectum, in arterias venit. Idque non convenientia qualitatis, sed successione quadam ad earum dilatationem: per eam enim, quatenus etiam nutriri possunt, in ipsas tunicas, quod conveniens est, attrahitur, & sic quod sanguinis in cavitatem earum est translatus, id uti sibi magis conveniens, tunicæ ipsæ in se attrahunt, vt nutriantur; prout statim in principio capitis decimiquinti idem Gal. eod. lib. docuit; Quod obiter hic annexere volui, ne quis ob id putaret illud chyli modicum pro nutritione ipsis arterijs inferuire.

Similitudo succi idem, ac continuïtas vasorum, operatur, nempe nihil, quia non datur, similem esse hunc succum ei, qui in ventriculo, aut intestinis est, neque in substantia, neque in colore non in substantia, cum is multo crassior, & compactior sit non in colore, dum is multoties sub-

Albedo non lacteus solum, sed omnibus venis propria inest.

Etiam arteria quid modicum à ventriculo trahunt.

Non tamen eo, sed sanguine nutriuntur.

Succi similitudo non concludit.

viridis, aliquando fuscus, nonnunquam vinosus, quandoque subflauus cernatur, prout magis in esis, potatisquè supereminet talis, vel talis, color, & virtus: hic verò semper candidus, & veluti lacteus est. Repetit viuacissimus *Barthol. pag. 188.* quod, quamuis in ventriculo, & intestinis nonnunquam subviridis, flauus, vel alterius coloris sit chylus: in lacteis tamen semper candicat; quia vel alieni colores à candore vincuntur, vel alienus color in intestinis cum facie deponitur, vel lactearum angustia per vltiorem coctionem dealbat, vel rarò aperiantur animalia, quæ versicolores cibos ingerunt: Non ei autem hæc valent subterfugia: Nam nullus alius color sic faciliè vincitur, aut inficitur, vt candor, sicuti videre est in mistione vini ad aquam, atramenti ad lac &c., vel è contra: ab vntia enim vini aquæ libræ puritas, & ab atramenti pauculo multum lactis euidenter tingitur: ad tres aquæ vntiæ vini libram, lactis mediocritas multum atramenti vix excolorabunt. Vnde sicuti non ea valet exceptio, in lacteis candorem alios chyli colores euincere; ita nec valet iaculum, quod contra mesaraicas venas retorquetur *pag. 189.* de illarum perpetua rubedine succi, etiamsi chylum eas exugere, à nobis supponatur: quia, vt dixi, rubedo non sic faciliè à candore, vt à rubedine candor decoloratur.

Bartholini
repetitio.

Distribuitur

Nullus color
sic vincitur,
vt candor.

Alienus co-
lor cum fa-
cibus non
deponitur.

Necque alienus color cum facibus deponitur, aut ab intestinis in candorem vertitur: non primum enim, quia idem color, & crassas, & tenues eiusdem substantiæ partes comitatur, vt in sanguine videre est, quæ totus, vel magis, vel minus rubescit. Non secundum; quia licet aliquid alterationis possit chylus ab intestinis recipere, vt Galenus asserit, id tamen intelligendum de portione ab ipsis retenta, non de ea, quæ à venis surripitur. Et iam supra dictum est etiam in intestinis ipsis chylum virescere, rubescere, fuscum esse &c.

Nec lactearū
color inueni-

Nec lactearum angustia potest candorem impartiri, nisi per coctionem, quæ in solo, citatoq; transitu, qualis ex aduerso supponitur, fieri non datur; & quicquid sit de remotioribus, vel glandulis ipsis, saltè in vicinioribus non albicet.

Nec verum denique, rarò aperiri animalia, quæ versi colores cibos assumant; siquidem, si quod aliud animal, homo ipse diuersissima cibaria, potulentaque deglutit: tum & boues, equi, & alia pecora nonnunquam viridi herba vefcentia chylum viridem in ventriculo, & intestinis continent. viridia excrementa deponunt, & tamen in omnibus, si rectè valeant, non minùs, quàm in homine, candicat glandularum, venularumq; propositus succus. Ergo non ea similitudo adest, quæ supponitur. His adde, quod idem Bartholinus aliquando definire non audeat, an talis succus chylus sit, an potiùs lac, vt arbitrat *Haruenus*: Si ergo hac, ergo per coctionem peculiarem, non per merum transitum, vt sua, & Pecqueti est positio.

Solutio se-
cunda ratio.

Altera autem Bartholini ratio, à motu chyli desumpta, iam fuit pro parte soluta antecedenti capite, & fusiùs videbitur libro secundo: ibi

enim

CAPVT DECIMVM NONVM. 85

enim videbimus, quid ligaturis, & quid succorum motibus in emoriente animali concitatis credendum sit: Hic autem annectitur, & hoc argumentum, Ventriculi coctionem non à parte post partem, sed simultaneâ fieri, vehementer pyloro occluso, dum ea perficitur, & solummodò recluso, quando perfecta est, prout veris, & indubitatis anatomicis signis demonstrauit *Gal. lib. 3. de nat. fac. 4.*, & vt vniformis chyli substantia, quæ talis non esset, confirmat: Ex hoc ergo, quod statim, assumpto cibo, & dum in ventriculo adhuc sit concoctio ex ipsorum Auctorum dictis lacteæ venæ videntur albo succo refertæ, id verè contra ipsos (opinione mea) aperto Marte pugnat, ipsosquè conuincit apertè, illum non chylum, sed alium mesenterio congenitum succum esse. Quinimò, quamuis ipsis daretur, aliquid tenuis ante perfectam coctionem ad intestina descendere, cum id paululum, sit, nec illorum ideo cavitatem dilatat, potius pro eorum irroratione deserviret, quàm secùs.

Coctio in
ventriculo
non partiè,
sed simulta-
neâ fit.

Experientia item, qua supponunt, per ligaturas mesaraicarum non impediri chyli motum in lacteas, per ligaturam lactearum chylum in intestinis resistare, non solum inueneri similis, sed & incredibilis est: Quæso enim, quomodo chylum in lacteas moueri vident? an quia sint pellucide, velut vitrum, itaut intra ipsas succus fluere videatur? non sic esse, manifestum est, quia color lacteus, & pinguis species potius lumen obturant. An quia ligatæ turgent? id etiam in sarciminibus demissis videtur, quæ per ligaturas turgida fiunt; Et ex anxia volutatione mastati animalis potest quoque vi exprimi id, quod alioqui nunquam moueretur illuc. An quia secentur, & sic liquor exeat? At non potest venire à comitibus vasculis? Sed & quis distinguet, an succus ille per lacteas ad iecur euntes, an ad receptaculum, an per vtrasque migret? Et cur ligatis lacteis, in mesaraicas non transluet dictus liquor? nùm negabunt ipsi, à mesaraicis in Portam cruorem fluere? si sic, iam de eorum circulationis vanitate conuincetur: Sin minus, quis attestari possit, cum cruore chylum quoque non irruere? Sed & quis Argus tunc obseruabit, ab intestinis chylum non attrahi, sicuti è contra in alijs iam dictis vasis fluere? Annè intestina aperta tunc oculis panduntur, & ab ijs fugi, ab his non fugi conspicitur? Incerta nimis iudicia, quæ in fugacissimis experimentis, & quæ facile in diuersas possunt reduci causas, fundantur. Vnum hoc è contra concludet, si è lacteis alba fluunt, dum in intestinis actu viridia, vel flaua morantur.

Expeditio
experientie.

CAPVT VIGESIMVM.

Quæ à dictis Auctoribus contra Galeni rationes pro hepatis sanguificatione ministerio, opponuntur, & eorum solutio.

Restat modo, vt quæ primarijs Galeni rationibus primo huius libri capite adductis per hos Auctores opponuntur, expendamus ad hoc,

vt

vt hepatis pristinus splendor adsit, & in sanguificandi munere integretur. Itaque contra primam Galeni rationem, quæ similitudini plantarum innitur, obijci ex Bartholinq potest non mesaraicis venis conuenire radicum analogon, sed lacteis; imo non his solum, sed & ori, ventriculo, in intestinalis, tubulo thoracico, & cordi ipsi, ac omnibus in summa coctionis, distributionis, & delationis ciborum, chyliq; instrumentis, vt videre est apud Ipsum in expensione sententiæ Harueij pag. 187. & 188.

Obiectio contra primam Galeni rationem.

Eiusdem resolutione.

Aluum in homine terre fungitur officio.

Qua obiectio ne inueni similius dici poterat, si enim microcosmos homo dicitur, non solum radicum, sed & terræ, eiusque eterogeni succi, ad omnia alenda membra viuientia idonei, analogon in se contineri, & compendiare debet: quæ autem analogia ori, ventriculo, conuenit cum radicibus plantarum in mille capillaria filamenta desinentibus, terræque infixis, si solitarij ductus, & à solo seiuncti conspiciuntur? Quare prudentius Hipp. lib. de hum. num. 4. & Arist. 2. de part. anim. 3. aluum in homine fungi terræ officio desinierunt, vti à qua sugentes venularum ductuli, quæ sibi familiaria videntur, ac secus, tamquam trunci principium deferunt, vt ibidem coacta, ac disposita rursus in cætera omnia membra alimentosa demandentur. Sicut enim terra, vt ait Hipp. lib. de nat. hom. num. 10. & 11. continet in se acidum, amarum, dulce, salsum, & omnigenum, ab eaque Solis auxilio, eadem disponuntur, vt vnumquodque satorum trahat id, quod sibi, seu naturæ suæ magis familiare est; Sic in stomaco, & intestinis cuncta, acidum, amarum, dulce, & omnigena alimenta, caloris à Corde, vti à Sole, influentis auxilio, sic fermentantur, disponunturq; vt ad quælibet per communes radices, ac riuulos alenda membra delata, eo inferuant, vt trahat vnumquodque, quod sibi familiarius extat. Lacteis, vti quæ sparsæ sunt, nec in communem stipitem desinunt, nequaquam radicum analogia competit; sed benè mesaraicis, quæ ordinatè à secore per stipitem congruum prodeunt; eousque diuaticantur, expanduntur, & exilescent, vt earum simul sumptarum figura verè arborum radicationi adaptetur: Lactææ autem ramusculorum sunt potius soboles, quæ ab alijs diductæ venis, in glandulas, pinguedines, variasque membraneas partes terminantur, obliteranturq; Sed quid de Corde audio? Huius quidem præcipuè inter seipsum membra adnumeratio incongrua prorsus cernitur; per illud enim totus vivit homo, ex eo cuncta bona dimanant, & ad illud cuncta, quæ in animato corpore fiunt, libenter, ac congruè referuntur.

Obiectio contra secundam Gal. rationem.

Responsio ad eandem.

Contra secundam Galeni rationem, qua dicebatur, hepatis figuram, structuramque valde facere ad sanguinis generandi ministerium probandum, obijci, seu responderi potest, eas non magis chyli coctionem, & sanguificationem, quam sanguinis ad ipsum redeuntis percolationem, eiusque ab excrementis expiationem arguere, ac indicare: Sed non minus vana est hæc obiectio, seu responsio, quam superior: Ad quid enim hæc percolatio consistit inferuiet post sanguinis reditum à nutritis partibus? Si ad Cor iterum redire debet, & vbi illuc perueniat, chyli illi

à subclauis

à subelatijs descenderis miscetur (vt ab ijs, falsò licet, supponitur) ergo percolatio de vento erit : iam enim nutritiæ sunt partes ; iterum chylò inquinabitur sanguis. Præterea : an totus à circulatione rediens sanguis per hepar transibit ? Qui ad caput, brachia ; pectus, omnesque à lumbis infra positas partes fluit, an per ipsum percolandus itabit ? qua via ? & cur ? vt bilem deponat ? illi alia via generalis aperienda erat, non per Portam, quæ aluiis tantum partibus, ac regionibus inseruit ; hæc antea erant peragenda, non post reditum : Sed quod magis mirandum, dum Cor nobilitare hi autumant Authores, illud seruile, & veluti mancipium faciunt ; dumque secur opprimere, ac sepelire vñe putant, illud eleuant, Cordi præponunt, ac vltimam sanguini manum dare, perhibent. Non mirum tamen : quia si præpostere sanguinis genesis, & motum ponunt, sic etiam illius depurationem disponere debebant. Nobis autem, qui Veterum calcamus vestigia, non quidem Cor chylum coquere, sed secur ; non hoc colare, seu purificare sanguinem, sed Cor, est asserendum.

Contra tertiam item Galeni rationem obijcit ex Bartholino lib. Defens. aduer. Riol. pag. 152., & 153., tuborem illum hepatis purpureum non ex sanguinea eius substantia, sed ex sanguine ibi superfluo, & percolando deuenire, eique per accidens inesse. Inane responsum : quia non iecoris parenchima, sed illius venæ arteriæque sanguinem continent. Cor iuxta illius doctrinam sanguinem producit, perficit, ac in se continet ; venæ, arteriæque sanguine semper sequeuntur sanguinem vehunt ; & tamen nec hæ, nec illud tale rubredinem nanciscuntur. Patitur ergo Bartholinus a deo rubicundum præ cæteris partibus iecur esse, quia ex sanguine minimum immutato eius constat substantia ; quod cum ita sit, iure dici potest, ab eo verius, ac facilius, quam à quouis alio membro, chylum sanguificari. At (inquit) omnis etiam musculus ex affluente sanguine rubicundum nitorem demonstrat ; nec tamen sanguinem gignit. Fallitur : quia, si sanguis rite extrahatur, caro omnis, & musculi, in iugulatis animantibus, & maxime in auim, pullorumque genere albicant, præter secur, quod semper sanguinis colorem, & substantiam æmulatur. Repetit, non omnium animantium iecur adeo rubescere. Conceditur : quia neque in omnibus sanguis æquè rubicundus est : sufficit autem, quod in vnoquoque animante iuxta speciem, ac naturam suam hepar sanguini in eo contento omnium partium simillimum sit ; id quod in Orbe pisce ab eo nominato optime discernitur : in eo enim si iecur minio non cedit, nec secur minium excedit.

Contra quartam nil aliud asserri ex eiusdem, & sodalium mente potest, quàm venas totius corporis ad aliud inservire, quàm ad sanguinem ex nutritione residuum reducendum ad Cor, & ideo nil interesse, siue à iecore, siue à corde dicamus, eas exoriri. Verum sequenti libro demonstrabimus, ex Priscorum mente ; congruentia, & ratione, Venas pro deferendo toti corpori alimentitium sanguinem deferre ; sicut, & arterias

Obiectio contra tertiam Gal. rationem Resellitur.

Iecur ex sanguine minimum immutato gignitur

Musculus ab. guine rite extracto, albicat.

Obiectio contra quartam. Responso ad eandem.

arterias pro natui calidi, spiritusquè vitalis influxu esse; Et ideo illas subtiliores, moliores, capacioresq; ac rariores, vt faciliè, & affluenter sanguis ab ijs refudet; has verò crassiores, duriores, angustiores, ac densiores, nè nimis faciliè spiritus transpiret, dispergatur, & evanescat, à Deo conditâs fuisse. Et sic in suo vigote vis remanet argumenti.

Obiectio contra quintam.

Contra quintam ex iisdem obijcitur, negando, venas emulgentes renibus inferuire ad serum trahendum, splenicumq; raptum heni fœcalem sanguinem offerre; sed vtraque vasa ad sanguinem ijs partibus superfusum cordi referendum pro circuitione ab Harueio disposita, inferuire, asserendo. Vtrunque se res habeat, (quamvis ex professo de diâa circulatione in sequenti disputabitur libro) illud pluribus in confesso est, renes serum expurgare, lienem verò succum melancholicum; quod siue per assignatas vias, siue per alias consequantur, illud nobis sufficit, vtrunque viscus (sicuti, & cystim felleam pro bile) hepatis proximum esse, ideoq; ab eo succos prædictos faciliè absorberi, non quidem omnimodè (cum eorum purior portio ad nutritionis complementum sit opportuna); sed pro maiori parte; Quæ de Corde dici non possunt, cui nullum expurgatorium membrum sic proximum est.

Obiectio contra sequentem.

Ad sextam dicunt, nil illam valituram, dummodò euincatur, chylum non ex parte iecoris, sed ex thoracico tubo per subclauias venas in Cavam, & Cor peruenire: sufficit enim, vt ab hoc per arterias ad partes nutriendas demandetur, & inde per venas reducatur, prout circulationis leges volunt. Respondeo; si illud euincerent, siq; probarent, per arterias ad partes nutriendas deferri humorem, ab ipsis ratio esset: Sed nec primum, nec secundum euincunt. Non primum: quia sanguificando chylo inconcussam manere iecoris temitam, sicuti, & alteram tubi thoracici improporionatam, & incongruam, sat hucusque monstratum est. Non secundum: quia per venas nutritionem ferri, prodidere Medicinæ Magistri, in sequenti libro monstrabitur, nec Iuniorum tonitrua quicquâ hanc labefactant positionem; Et sic in suo robore ratio manet, venalem sanguinem à Iecore prodire, ab eoquè naturaliter procreari.

Responsio ad eandem.

CAPVT VIGESIMVM PRIMVM.

Quicquid contra Veterum auctoritates dicunt, impugnatur, & ad bilem secernendam non esse dicatum Iecur, ostenditur.

Contra auctoritates Veterum strepit Martinus Bogdan in suis Infidijs detectis pro Bartholini. Vasis lymphat; vbi asserere non veretur, Vetere, tùm Medicos, tùm Philosophos nunquam hepatis sanguificationem assignasse. Et primò aduocat Hippocratem, qui lib. 4. de morb. dixit, hepar quidquid bilis est, trahere, & lib. de cord. in fine naturium calorem, qui in sinistro cordis ventriculo est, à proxima sanguinis cisterna alimentum sumere. Platonem quoque in Timæo venis sanguinis

CAPVT VICESIMVM PRIMVM. 89

sanguinis gignendi officium, non hepati, attribuisse, scribit. Aristotelem etiam lib. 3. de hist. anim. docere, ait, à vena Caua duos ramos produci, vnum ad omentum, alterum ad Pancreas.

At quid subiticeam, Galenum ipsum inclinare alicubi in sententiam nedom Aristotelis, sed & Pecqueti? Videatur *cap. 16. lib. de ther. ad Pis.* ubi hæc leguntur: Nam quando fortis fuerit natura, tunc, & venter expeditè cibos concoquit, & venæ sanguinem faciliè produciunt, & iecur promptè bilem secernit, atque ita defæcatum sanguinem Cor suscipiens, ipsum deinceps vniuerso corpori iam nutriendo idoneum, submittit.]

Sed hæc in vanum offeruntur: nam, vt dictum est, supra *cap. 2. Hipp.*, & Plato hepati chylum coquendi, ac sanguificandi officium assignauere, nec Cordi aliud, quàm sanguinis spirituosissimi, sed natiui caloris præparationem, & instaurationem tribuerunt. Neque Aristoteles in rerum summa dissentire videtur, vt in fine capitis tertij tactum est. De Galeno adeo certum, vt de illo dubitare, potius ridiculum sit, quàm ferium. Idem quoque Auicennæ cum suis Arabibus placuisse, neminem, credo puri ingenij latet.

Et quod ad Hippocratem spectat, Is lib. 4. de morb. nequaquam dixit, hepar trahere bilem: sed huiusmodi munus folliculo fellis attribuit. Ipse oratio sic habet: Et sanè sanguinis fons est Cor, pituitæ caput, aquæ splen, bili locus folliculi in hepate.] *Sub num. 8.* sic: Nunc verò dicam de bile, quomodo, & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo locus folliculi in hepate ipsam trahat.] *Sub num. 13.* Quin, & hoc ita se habet, quod ad folliculum in hepate sola bilis à cibis, & potibus secernitur: venulæ enim, cum debiles, & tenues sunt, alium humorem trahere non possunt.] Neque ex eo, quod ibidem dicat, sicuti, & lib. de Cord. fontem, & cisternam sanguinis Cor esse, ideo sanguinis conficiendi munus Cordi assignauit; qui imò *num. 8.* iam citato non obscure annuit, secundam cibi coctionem in hepate fieri his verbis: Postquam comedit, ac bibit homo, aliquid amari, quodquæ biliosum, ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor vocant; atque hoc ita fieri videmus, & clarum nobis est, quod à cibo, aut potu factum est: trahit etenim corpus in seipsum de cibis, omnem prædictum humorem. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthic biliosus inest.] Quomodo autem generatur bilis in hepate, nisi ibi fiat coactio? Manifestum item, & hoc fit ex ipsis nominibus fontis, ac cisternæ, quibus Hippocrates pro Corde vtitur: nam fons nil aliud significat, quam aquæ salientis manifestam eruptionem, quæ non ibi gignitur, sed aliunde per terræ venas continuè suppeditatur; sicuti cisterna aliud non est, quàm aquarum aliunde quoque prouenientium in vno reductu collectio. Quibus si seria addatur obiectio, libros de morbis non esse verè Hippocratis, omnino tolletur vis adductæ auctoritati. Et id facillimè patet: quia multa ibi continentur, quæ

Hipp. hepati
munus tra-
hendi bilem
non assigna-
uit.

Pontis æc. c.
sternæ san-
guinis no-
men quomo-
do Cordi ada-
pietur.

ipſius ſapientiam, & alibi dicta non redolent; ſicuti liquet in pun 20, dum hic inter quatuor nutritios homines reponit aquam, quæ purum excrementum eſt, & ſolummodò vehiculum cæterorum; Et tamen in alijs genuinis libris non ſemel ſcripſerat, quatuor humores naturam hominis conſtituentes eſſe ſanguinem, pituitam, & vtrunque bilem, ſuaſam ſcilicet, & atram, vt in lib. de hom. ſtruſt. 1., & de nat. hom. 8.

Plato, quamuis non ſemel venis virtutem ſanguinis coquendi (prout & Gal.) attribuerit, non tamen ad propria earum virtute fieri, perhibuit; ſed imò id eas obtinere à concupiſcibili animæ parte, cuius ſedem in hepate conſtituit, ac veluti ad præſepe ventri alligauit, vt teſtatur multoties Gal.

Ariſtotelem porrò dixiſſe conſtat 3. de hiſt. anim. 4. à Vena maiore alias duas propagari venas, vnam ad omentum, alteram ad Pancreas: Sed vel Lippis conſtat, illum non valde Anatomicam calluiſſe peritiā, ſicuti, & ipſe de alijs illuſcuſque eueniſſe, reſert cap. 2. maximè in venarum dignotione perdifficili, vt quæ in mortuis, effuſo ſanguine, languſcunt, & collabuntur. Vel melius dicendum eſt, ſæcæas venas pro parte aliqua Cauæ inſitas, ipſius eſſe germina iuxta Ariſtotelis mentem, itaut eiufdem ſint generis cum alijs venis. Quomocunque ſit, hoc non repugnat cæteris, quæ de hepate alijs in locis dictauiſſe ipſe.

Galeni autem adducta ſeries, ſi benè ponderetur, nec Cordi ſanguificationem præſcribit, nec fauet hepatis ad bilem ſecernendam relegationi. Non primum: quia cum dicit, Atque ita deſcendat ſanguinem Cor ſuſcipiens &c. J maniſeſtè inſert, non inibi produci, ſed aliunde ad illud venire; ſicuti, & venas ſanguinem facile producere, poteſt intelligi, ac ſi diceret ducere, ſeu vehere, vel ſi perſiſtatur, intelligi de productione, ſeu generatione, quomodo ſumi debeat, ex profeſſo declarauit ſæpè ſic. 6. de placit. Hipp., & Plat. 8. Non ſecundum: quia bilem ab hepate ſecerni nò excludit illius in ſanguine procreando facultatem; imò illam euidenter includit; excrementorum enim ſecretio coctionem præſupponit, ac ſequitur. Quicquid autem ſit, mihi ſemper placuit Authorum ſenſum ab Operibus, vbi ex profeſſo de re aliqua tractant, non ab ijs, vbi incidenter de ea aliquid dicitur, expiſcari: in his enim ſufficit, non oppoſita inueniri, eaq; tangi ſolum, quæ ad ibi intentam faciunt poſitionem.

Quod hepatis officium non ſit bilis generatio reſponſio prima.

Bartholini reſponſio diſtincta.

Sed quod magis reſert, eſſet contra rationem, quod tam magnum viſcus pro ſeparanda bile fabricatum fuiſſet. Et quamuis huic rationi reſpondeat Bartholinus pag. 155. magnitudinem partis non indicare eius officij magnitudinem, ac vim, eo quia Corde maius ſit inteſtinum rectum, oculoq; podex; quorum tamen vtrunque illis nobilitate cedit; quiniò quò membrum mole maius, eò magis ſeruile dicendum ſit, cum & in hominibus ſæpè in exiguo corpore magna virtus, in magno ingens vitium adſit: Attamen in hac ſua reſponſione multipliciter peccat. Primò confundendo magnitudinem, ſeu operoſitatem actionis cum eiufdem

CAPVT VIGESIMVM PRIMVM. 91

eiusdem nobilitate; quæ valde differunt, cum possit, imò soleat nobilior actio exerceri à paruo, vt discursus ab homine, operosior à magno, vt onerum subleuatio ab elephante: hic autem à nobis magnitudo actionis sumitur proprius operositate; & sic benè infertur, & conuertitur, ad eam, efficientis magnitudinem, & ad hanc, actionis operositatem spectare: vnde videmus, pro bile felleam cystim, pro stercore intestina, pro vrina vesicam fabrefactam esse, vt scilicet excernendi contenti quantitati continentis, ac excernentis magnitudo respondeat. Secundo confundendo magnitudinem partis cum capacitate ipsius, quæ valde diuersa sunt: nam magnitudo est secundum tria dimensionum genera, seu secundum corpulentiam magna quantitas; capacitas vero potius ad latitudinem, seu extensionem. Hic verò à nobis magnitudo propriè sumitur; & ob id non aptè respondetur, rectum intestinum Cordi magnitudine præstare, cum potius dici debeat capacitate, seu latitudine, secundum quam non magnitudo actionis, sed quantitas contenti arguitur, prout de vtero, vesicaq; dici posset: at per illam aptè magnitudo actionis monstratur, vt exemplo cerebri, cordis, renum, lienis, pulmonisq; patet. Tertio confundendo seruitutem cum operarum, virtutum, gratiarumq; impartitione: si enim quò quis magis alterius commodum operatur, inuigilat, & impertit, eò seruiior dicendus esset, & Cor in corpore, Rex in Regno, Dux in Republica seruiior appellaretur: Sed quia differt à seruitutē gratia, imperium ab obedientia, elargitio ab acceptione; ideo & Cor, & cerebrum, & hepar, quamuis magis corporis vitæ, & gubernio insulent; omnium tamen, & propterea, partium principissima censentur, & sunt, sicuti, & Rex, Duxquē in Populis. Quarto confundendo cum viribus corporis animi vires; & tamen certum est, diuersissima hæc esse: quia si de animo dicamus, non incompetit corpori exiguo, & imbecillo inesse magnam animi vim, & magno validoquē paruam: at si de corporalibus viribus agatur, planum est in maiore corpore maiorem, in minori minorem vim adesse, vt de homine, & paruulo, de Viro, & Gigante constat: Hic autē de naturali, seu corporea vi agi, non de animo, certum est. Quinto comparando membrum, quod ab alio membro differt specie, cum homine, qui respectu alterius hominis Solo indiuiduo differt; quæ comparationes sunt incongruæ: nam si eiusdem speciei aliquid sola magnitudine, aut alio accidente differat, nil quoad hoc maioris, vel minoris conditionis erit: nec enim homo magis, aut minus propter hæc accidentia dicitur; & sic hepar hepate non dicitur nobilius, siuè maius, siuè minus sit: quamuis quoad valorem etiam aliqua in eadem specie iuxta maiorem, vel minorem magnitudinem possit considerari differentia, vt supra diximus.) At si conferatur hepar cum glandula, vena, nervo &c.; homo autem cum Elephante, equo, Camelo &c., planum erit, ad maius robur hæc animalia, quàm hominem; heparq; quàm altera membra, natum esse; & sic molem corporis magnitudinem operationum indicare.

Actionis operosius ab eiusdem nobilitate differt.

Magnitudo partis, & capacitas diuersa sunt.

Seruitutis, & gratiarū impartitio differt.

Corporis, & animi vires differunt maxime.

Speciei comparatio an indiuidua id congrua est.

Magillodo
operationis
à magnitu-
dine membri
indicatur.

Ergo nè incongruum Bartholino videatur concedere, magnitudinem operationum à magnitudine membri ad eam dicati elici, & indicari: Sicuti enim ad ferendam magna onera non canes, non lepores, non formicas; sed Equos, Elephantefq; & canendo è contra non hos, non Camelos &c., sed cicadas, philomenas, pueros &c. Natura dicauit; ita in corpore magnis operibus magna viscera, minoribus minora præfecisse, existimandum est; cum alioqui nobilitas actionis ab ipsius vi, & intentione differat. Et sic, sicuti non inconuenit, hominem Elephanti ob rationem, lusciniam cuculo in cantu, ceruum sui in pulchritudine præualere (quamuis robore cedant); ita, etsi hepar sua magnitudine operositatem, qualis sanguificatio est, maiorem multò, quàm sit bilis secretio, præferat; cedit tamen nobilitate rationis cerebro, ratione vitæ Cordi: Restat igitur in suo vigore ratio, quod deformiter Natura genuisset hepar adeo magnum, si sic paruæ actioni, qualis pro purganda bile ab his Viris egrejjs supponitur, præesse debuisset.

CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM.

Examinantur officia à Pecqueto, & sequacibus Iecori attributa, & respondentur.

SED postquàm hùc peruenimus, non incongruum erit examinare officia, quæ loco sanguificationis Iecori attribuit Pecquetus. Ea fuere quatuor, quorum vnum, & præcipuum cum sit dicta bilis secretio, hic parumper insistentum est: nam vltra supra allatam rationem dictum officium elidentem, alia euidentior est, quam assert Riolanus; nimirum Quod si huic Iecur incumberet actioni, in flauum eius purpureus tingeretur color (& tamen rubicundum cernitur, ac sanguineum); nec esset esu suaue, vt est, sed amarum. Quæ ratio optima est: qui enim tractat picem, inquinatur ab ea, & quæ aliquid electiue trahunt, vel ob similitudinem, vel ob efcam trahunt: Videtur ergo lien obscuro coloris, saporisq; aciduli, quia succum atrum imbuit, ac secernit; & quia talis cernitur, talem etiam succum contrectare arguitur. Flauescit, vel virescit fellic vesicula, simulque amarescit, quia simili humore imbuitur, ac nutritur; & quia talis visitur, id quoque conijcitur.

Quod Iecoris effectum non sit bilis secretio. Ratio secunda.

Obiectio Bartholini contra eam tollitur.

Nec se ab hac extricat ratione Bartholinus pag. 154., dum dicit, Iecur flauedine tingendum fore, si bilis in ipso detineretur: sed, inquit, expellitur ab eo: respondetur enim, quod, si sit pulsio, ergo secretio eam præcedit: non sit autem hæc nisi post coctionem, & sic per eum fiet sanguinis coctio, quæ vera, & princeps actio Iecoris erit; bilis verò pulsio consequenter, & per accidens; Vel per quandam colationem, & à sanguine scijunctionem sit; hæc autem non nisi vnus retentione, & alterius repulsione fieri potest: cum ergo pellatur bilis, retinebitur sanguis: Atuerò hic non retinetur, sed Cauæ dimittitur: Ergo nec bilis per pulsionem ab-

CAPVT VIGESIMVM SECVNDVM. 93

eo fecernitur; Et sic per attractionem fieri, esset necesse, quæ similitudinem supponit, aut eam.

Repetit ille, ob id quandoque illud flauescere, vt in macatis animalibus non raro visitur. Sed respondetur, si aliquando flauescit, id euenire, Altera eius-
de obiectio
colligitur, vel quia Iecur ægrum est, & à bilioso succo obfessum; vel ob exandescentiam eius caloris, qui bilem nimiam gignat; vel quia obstructum sit cystis viaculum; vel quia hæc indiulsione, vel scissione iecoris rupta, aut vulnerata est. Et illorum indicium est, quod vbi flauum iecur cernitur, caro quoque, & pinguedo, vel flauescunt, vel extenuata sunt; vel vacua cystis inuenitur, & peruia.

Nec minoris momenti est alia Riolani ratio, Quod si Natura hepar ad bilem fecernendam destinasset, in quibuslibet animalibus ei fel addidisset: vnique enim parti Natura donauit, quæ ad suam primariam actionem perficiendam instrumenta necessaria videbantur: Est autem vesica fellea bilis euident receptaculum, & expiatorium; ergo cuilibet hepatis adnasci debuisset. Et tamen videntur in multis animalibus iecora „ carere felle. Vnde *Arist. lib. 2. de hist. anim. cap. 18.* sic dixit: Iecur „ magna ex parte, maximoq; animalium numero felle caret.] *Et lib. 4. de part. ani. ait.* etiam nonnullis hominibus fel deesse.

Quarta ratio est, quod frustranea, & intempestiua esset huiusmodi hepatis actio: nam cum per hepatis venas sanguis solum recurrendo, ab alitis iam partibus dimissus, perueniat, (vt iidem volunt Auctores, & qui circulationem sanguinis profitentur); qui verò per arterias ad alendas partes confluit, nil gratiæ possit à iecore, cuius solum cauæ parti arteria, vt ait *Vesall. lib. 5. cap. 7. in fine*, exporrigitur, mutuari; constat, nutritionis opere completo, irritam fore dictam bilis seiunctionem, vltra quod is solum expurgaretur sanguis, qui ab abdomine per portam reuertitur, reliquo, qui per cæteras vagatur partes, ab ijsq; ad Cor regreditur, impuro relicto, quod esset incongruum, & mutilum, prout, & iam supradictum est *cap. 18.*

Hæc autem ratio valet etiam ad refellendum alterum iecori arrogatum officium colandi sanguinis, vt quod, & frustra, & intempestiuum, & imperfectum iisdem de causis esset; præterquam quod hoc esset iecur supra Cor (cui tamen dignitate cedit) eleuare, non deprimere, vt i falsò autumant ei lugubres Næniæ occinentes; quem admodum eodem *cap. 18.* tetigimus.

Ridiculum verò nimis est tertium officium ipsi à Pecqueto adscriptum, nempe quod gerat vicem pistilli succutientis ventriculum, & intestina, siq; chylum in lacteas impellentis: Nam præter id, quod incongruum prorsus esset, Naturam huiusmodi violentum impellendi modum in viuum animal introduxisse, cum ei non desint alij intrinseci, naturales, & proprii, quibus vnaquæque alenda pars potitur pro depellendis superfluis, per idonea scilicet instrumenta, vel naturalia, vt sunt fibræ transversales (& his tum ventriculus, tum intestina abundant), vel animalia,

Ratio tertia
ad idem.

Ratio quarta

Officium colandi sanguinis eliditur.

Officium pistilli refellitur.

vt nervi, musculiq; qui in abdomino multi videntur; Nec iecur huic vsui inferuire posset, cum adeo ventriculo adhæreat, vt in respiratione nec minus, nec magis, quàm ipse eleuetur, subideatq; & sic nec possit ipsum percutere, vt esset necesse ad suppositum siquæ. His adde, quod quæ nutritura sunt congruentius est, vt ab alendis trahantur partibus, quàm vt ab alijs in ipsas vi impellantur: pellitur enim, quod distonum, attrahitur, quod familiare, & consonum est. Et hic migrandi modus in plantis manifestus conspicitur; multò ergo magis in animalibus, quæ ex se motum, ac sensum habent. Sed de hoc latius disertum est supra cap. 11.

Officium fovendi ventriculi non iecori proprium.

Quartum officium, nempe ventriculum fovendi, calefaciendiq; nec ipsi Iecori proprium est, cum alijs quòque competat adiacentibus partibus lien, omento, diaphragmati, arterijs &c.; nec per se; nam calefactio propriè, & per se competit sanguini, ac spiritui, quibus mediantibus, & ipsum Iecur calefcit actu, & sic alijs impartitur calorem. Propria autem Iecoris opera sunt attractio, retentio, concoctio, & expulsio, ad quæ ob peculiare suum temperamentum sanguinis procreatio, inde distributio pro totius, & Cordis alimonia nece sariò consequantur.

Est fontem lymphatici liquoris negetur,

Præter hæc aliud officium hepatis à Bartholino additum est, lymphatici scilicet liquoris esse veluti fontem perennem, qui ipsum refundat in chyli receptaculum, vt inde ad Coram chylo, vti vehiculum ascendat. Sed inania hæc: nam bilis, & aqua inter se contraria sunt; quia bilis calida, & sicca, aqua autem frigida, & humida est. Si ergo per Iecoris attractionem sit à sanguine secretio bilis, vt Ipse vellet, quomodo aquæ? Si per pulsionem, eo quia dissimilis sit, bilis educitur, quomodo aqua? Id verò de ipso Iecore dicitur. alioqui enim, quod ab eo variæ partes varia quoque superflua, vel excrementa possint attrahere, nempe bilem fellea vesica, atrum succum lien, aquam, serumq; tum renes, tum per lacteas glandulæ; Sicuti, & in Anatomes vehementia posse ob angorem ab ipso aquam exprimi, non repugno: qui tamen nec alienum duco, vt superius dictum fuit, per earum aliquas ad iecur chylum deuehi: non enim inconuenit, idem vas contrarijs motibus inferuire, vt manifestò cernimus in respiratione, pulsu, ventriculû, gula, utero, & similibus, prout latè docet Gal. lib. 3. de nat. facult. cap. 13.

CAPVT VIGESIMVM TERTIVM.

Rei conclusio, & pro Iecore reuiuifcente Carmen.

DEsinant ergo oculatissimi hi duo Viri Pecquetus, ac Bartholinus, cum ijsq; Neoterici omnes in suis adiuventionibus adeo gloriari; neque arbitrari pergant, totius corporis nutritionem a succo per tales à se repertos anfractus, ac meatulos transeunte suos habere natales: (arcta nam nimis via est, solisq; summis in egestatibus adeunda) Sed verius, Hepati sua reconcessa hæmatosi, cum nobis teneant, similes lacteas

CAPVT VIGESIMVM TERTIVM. 95

lacteas venulas partim ad mesenterij, ac ipsius glandularum nutrimentum tū deferendum, tū custodiendum esse à Natura dicatas, partimq; ad Iecur tenuissimum traducere chylum; Suum verò lumbare Receptaculum, ac cum eo thoracicum tubulum ad totius Spinæ omniumquē naturalium membrorum superfluum humiditatem excipendam, locoq; ac tempore tū ipsis, tū cæteris indigentibus retribuendam, communicandamue formata esse: Vnde ibidem præcipuè in Ischuria, quoties ad vesicam vrina non peruenit, stagnare, deponi, & affluere serum, rationabile est, & gravitas lumborum in huiusmodi casibus clarè suadet. Sic & veritatem magis attingent, & Priscorum auctoritati inhærentes, tutius incedent.

Nobis autem firmiter concludere liceat, propriam venalis sanguinis Officinam Hepar esse. Non ergo intempestium erit hoc tandem nobile Viscus ab Orco reducere, pristinaeq; suæ dignitati restituere, loco funerals Bartholini Epitaphij sequens Vrnæ affixum apponendo Carmen.

Pro Sanguifico Hepate Carmen.

Quid Viator abis?

Sicquē graui censes Infantem marmore claudi,
Cuius, & imperio purpura digna fuit?

Siste.

Læserat Heroem Pecquetus, Sanguine dempto,
Addiderat tumulum Bartholus vltro quidem.

Eia.

Sed neque sub Saxo Iecoris nunc vmbra moratur:
Ipsi nam vitam Turrius ecce tulit.

En

Sanguine nec solum ditauit Turrius Hepar:
Sanguinis ac sceptrum reddidit, imò dedit.



Huic quoque rediuiuo applausit, sæcunda distante
Musa Egregius Medicinæ colens Hyeronimus Albertotus sic:
Hepatis de tumulto triumphus.

Perge porro, Viator.

Hepatis hic nihil est,

Quod licet humanis inhumanis

Hostis geminus,

Nunc extra tumulum

Vium volitat

Per ora Virum

Cui, veluti Arabicæ aui

Natalem fecerunt

Cineres meliorem;

Illud

Illud tamen Letheo;
In tumulo iacuisse
Ni vigilis in morem Argi
Centenas seruasset excubias
E Turre Ioannes

Quem Hepatis Asfictorem
ac Vindicem

Alterum iure dixeris Chironem;
Dignum sanè, cui Turrim
Cognomine, & virtute fundatam
Erigant Medici in Colossum
Tanti muneris Mnemosinon;

Ripa scilicet de alta
Alta remedia Mundus
Debuërat expectare.



LIBER SECVNDVS.
IN QVO
DE SANGVINIS MOTV
CIRCVLARI DISSERITVR.
P R Æ M I S S I O.

TAntam in Orbe Medico inuentæ à Pecqueto Lactæ metamorphosim peperere, vt mirum, ni, veteri Medicina funditus excussa, tota in nouam, sicquæ teneram, ac infantilem Artem breui sit abitura? Accidit enim in similibus, vti in coercito à fortibus Aggeribus impetuoso flumine, cui si fortè ob superuenientem pluuiam exundanti detur, pauculam in ipsius aggeribus rimam adinuenire, dici nequit, quàm citò omnia retenticula dirumpantur, quotquæ vastentur agri, euellantur ædificia. Sic in Medicina factum, & sit adhuc; in qua cum vsque ad hæc tempora à potentissimis tùm Hippocratis, tùm Galeni thesibus omnium ferè ingeniorum fluctuantium impetus, tamquam in vndique vallato Alueo, detinerentur, vix imperceptibilem ferè aditum per hæc lymphatica, siuè lactea vascula adinuenere Iuniores, quod statim, omni pudoris, vel respectus Aggere dirupto, nouarum opinionum prouentus inexplicabilis emanauit; Quarum si inceptui progressus proportionatus accedat, parùm aberit, quin, vt dixi, omnia innouanda sint, incredibili cum ægrorum discrimine, super quorum dorsum (proh dolor) quælibet Artis ingens nouitas ineuitabiliter premit.

Illinc caput lecoris dignitas inhumari, Cordis Regia lebetis ebullitione fædari, cerebrum inferiorum partium enutritione onerari, Sanguis in implacabilem rotam proscribi; & ex altera Ventriculus, & mesenterium exaltari, chylus in omnibus, & ad omnia aptari, itaut huic prima generationis nostræ semina, exordia, & alimenta præscribantur.

*Opinionum
 neotericarū
 motus.*

Data enim hæmatosi venia, ad sæcem biliosam deradendam Pecquetus, Bartholinusq; proscribere Iecur, Cordiq; totum sanguificandi chyli adaptare molimen. Entius, Glissonusq; problematice primum, Charletonus inde serio, Harueij quoque documentis innixus, sanguinem à nutriendo ablegarunt, Hicq; per nervos à cerebro nutritium provenire succum (sic referente Deusingio) scripsit. Nec sanguis solum à pacata nutritione detrusus, sed & in perennem Harueianam circulationem coniectus cernitur. Ex chylo lac gigni, ex eoquæ factum in vitro efformari, ali, augeriq; Deusingius cum Alijs prius hæsitando, post verò firmo pede asserendo, concludunt. Hisce superaddit Pallierius in nuperrimo libello de Lactis vera genesis, & vsu Genue edito, semen ipsum ex chylo immediatè, fieri, solidarumquæ corporis partium, tum cerebri, tum glandium &c. nutritionem, adipisquæ generationem ex eodem promanare. Et quid expectatur amplius? Ventriculum Regem clamitat, ad eiusquæ nutum totum componi microcosmum, decernit.

Relinquo nunc dicere renum, lienisquæ attractiones exsantes; pulsum, respirationisq; causas, & vsus veteres profligatos; facultatis attractricis opificium cassum; fibrarum actionem inutilem putatam; Cordis dilatationem, vel casualem, vel coactam vocatam; nutritionem corporis incessantem, ac inexplebilem appellatam; pulmonem circulationis arbitrum proclamatum; & similia tot alia paradoxa, quæ singula persequi, vix homini longo tempore esset possibile.

Remanet solum, ut nunc, in theorica omni Vallo disrupto, ad Practicam inuertendam, & peruertendam concurrant. Et iam caput sanguinis missio claudicare tum circa sectionis locum, qui liber citrælarum partium considerationem relinquitur, prout in pleuritide promulgavit Deusingius in ad hoc dicato Opusculo; tum circa eiusdem delectum; quæ videtur in gravidis, etiam à talo, amplectenda (si sanguine non nutritur fatus); in mensibus verò euocandis abigenda, si venarum non est sanguinem ab interioribus ad incisionem, sed ab extremis ad Cor vehere. Sic & innumerabilla alia absque dubio insurgent absurda, si videri poterunt Praxes, quæ iamiam ad circulationis normam ab Exteris quibusdam emanabunt.

Et quid ergo à Nobis Italis expectatur? quod omnia abeant retrorsum? Videamus quæso, ne Pestis hæc nos quoque inficiat; Et sicuti pro Catholica fide contra liberat Exterorum quorundam conscientias, & pugnatur, sic vincitur, ita Medicinales huiusmodi hæreses abigamus, oppugnemus, arceamus. Parentes nostros imitemur, qui Paracelsos, Bonios, Vanhelmontios, aliosq; Hippocraticæ Medicinæ dirutores infestantes, fulgidam illam, inconcussamquæ præservarunt egregiè. Sequamur insuper, & Eos, qui Fernelios, Argenterios, Augenios, aliosq; Galenomastigas reprimentes, sese ad fulgoris apicem euexerunt. Praximq; nostram, imò & Artem elimarunt eximie.

Nè nos fallat, vel alliciat verborum melos, orationis concinnitas, modorum blandities, novorum modulitas; Nè moueat Auditorum nominis celebritas, dictorum argutia, rationum fastus, & conclusionum apparentia: leuēs enim animos, fœminilia corda irretiunt huiusmodi, quæ à cordatis pro futilibus venundantur, imò spernuntur.

Omnia persequi mihi occupatissimo non datur: quæ tamen potero, ad incudem ducam, sperans, id saltem me consequuturum, vt scilicet alia excitentur ad idem sfacinus præclariora ingenia, quæ rem totam meduljctis attingentia vmbas dirimant, nebulas fugent, nubesq; dissoluant. Cum ergo superiori Libro Hepatis decor (vt arbitror) ab humo eleuatus, Cor autem pristinae præeminentiae restitutum fuerit, agè nunc videamus, quid de sanguinis in humano corpore motu veridicè magis cum Antiquioribus Medicinæ Parentibus sit tenendum. Præscriptum ei ab Haruicio circulum perlustramus, quique illi cardines a Recentioribus additi sint, adamussim considerato, videamus, num validè, ac securè sit sanguinis motus perennis, & rotatus adscriptus; vt tamen nec interim multæ aliarum sileant disputationum prosecutiones.

CAPVT PRIMVM.

*Circulationem sanguinis, si detur, qualis, & quantacunq; sit, non obesse Veterum de eiusdem officina opinionem, nec nouam quicquam
fulcire, commonstratur.*

TOT enim, tantisque priori Libro adactis arietibus nequidem cedent hi duo celeberrimi Viri Pecquetus, ac Bartholinus, qui, suis eminentibus ingenijs confisi, nihili pendunt Veterum calcare vestigia, nec nisi nouis introductionibus anhelantes, plura cum Alijs conuoluere, vel irritare Antiquiora non verentur, dummodò inuenta dogmata circumsepiant, ac tueantur. Sed (ipsum pace dixerim) non est, vt adeò fimbrias dilatent: siquidem, Antiquis pugnabit Veritas, pugnabunt Hercules non solum, sed & Pygmæi ipsi, vt videant omnes gentes, plerumque infirma à Deo eligi, vt fortia quæque confundat.

Intolerabile quippè est apud emunctæ naris homines, ampullosam illam audire, vel videre factantiam, qua quis iamdiu in Arte bene disposita leui de causa peruertere verbis, & re ipsa conatur: Sic enim de ljs dicere possumus, qui, vt Receptaculi sui, lactei thoracici tubuli, lymphaticorumque vasculorum inuentum ad sydera euehant, pro nihilo habent hæmatosim confundere, alimoniam partium interturbare, excrementorum secretionem inuertere; novos humorum motus, nouam chyli semitam effingere; partium non vulgariū insita ministeria pernegare.

Vt ergo propriam Pecquetus assertionem de chyli via ad Cor, pro sanguine generando, tueatur; alter verò consentiat non illegitimè,

*Circulatio-
nis Haruei-
anæ descrip-
tio.*

plurimas Antiquorum theses impugnare non prætermittunt, eas, tamquam mucidas, & obsoletas respuentes; Sicquæ non à Iecore sanguinem alimentosum in Cor, & vniuersas corporis particulas per venas fluere, sed benè ab extremis tum alui, tum capitis, tum brachiorum, tum crurum venis in Cauam illum reduci, sustinent, vt inde Cordis dextrum ventriculum ingrediens, per arterialis venæ cavitatem in pulmones, ab his in venalem arteriam, ab ea in sinistrum Cordis ventriculum, hinc in Aortâ, & cæteras corporis arterias, indequæ in partes omnes pro earû alitione continuo motu agitur. Illinc postmodum per venarum anastomoses, vel per carnes ipsas in venas rediens, ab his iterum in Cor, à Corde in arterias cursitare, ab iisdem supponitur, itaut continua sit dicto modo sanguinis circuitio. Et hoc, vt digito monstrant, chylum in axillarem venam per thoracicum tubulum introgressum, ad Cor cum remeante sanguine progredi, vt ibi coquatur, & sanguis fiat. Quam postea circuitiorem vt tueantur, Eos præterea non tædet negare attractionem feri per emulgentes venas in renes, expurgationem atræ faciei per ramum splenicum in lienem, deductionem sanguinis per mesaraicas ad naturalium partium enutritionem, eiusdem accursum per venas spermaticas in testes &c.: Sed omnia prædicta opposito modo fieri, edocentes, ab emulgentibus renum sanguinem ad Cauam; à splenico ramo, & cæteris mesaraicis in Iecur per Portæ venam; ab alijsq; itidem ad Cauam continuè remigrare sanguinem, tradunt non secus, ac si in plantis humorem alimentitium à frondibus ad ramos; ab his in Truncum, & hinc ad radices deferri, dicamûs; Sicquæ illud Aristotelis verissimum dictum confirmant, Dato vno inconuenienti, plura alia ex necessitate sequuntur.

*Harueij opi-
nio in nullo
Pequetra-
nis de chyli
viti dogma-
tibus fauet.*

Hæc sanguinis circulatio, Harueij Angli doctissimi Anatomici inuentum, & plures habuit fautores, & oppugnatores non paucos. Qui tamen Vir prudentissimè quidem, etsi dictammet circulationem adinuenierit, experimentis ditauerit, rationibus confirmauerit, & ab omni contradicitorijs argumentis eximere studuerit; in nullo tamen, nec minimo, chyli tradductionem per mesentericas venas ad hepaticam commutari debere, autumauit; sic annuens, optimè cum sua sanguinis circulatione posse, & chyli antiquam commutationem subsistere, nec ob eam hepaticam quicquam pro suo munere derogandum esse, quin, regressu sanguinis ad ipsum possit simul attractus chylus in transitu per tot vicularum laberintos proba fieri in sanguinem conuersione donatus. Nisi quod, & ipse, à Corde sanguinem perfici iuxta Aristotelis mentem credidit: Succum verò album in lacteis vasis reperiunt, non quidem esse verum chylum, sed aliquid, quod ab vberiore nutritu, & bonitate concoctionis interdum casu superest eadem lege, qua adeps, medulla, genitura, lac &c. enascuntur, admittit. Et in hoc videtur nostræ opinionioni fauere, solum in eo varius, quod ad casum, & ad chyli munus ipse refert, quæ nos in naturam, & similitudinem aliarum partium, ac in sanguinis depurati superfluum reportamus.

*Harueij opi-
nio de la-
cteâli succo
fauet Anti-*

Verum

Verùm Bartholinus, Pecquetusq; non in moderato, leniquè motu sanguinis acquiescentes, vt qui neutiquam suæ ipsorum opinioni fauere, neq; contrariarum rationum vim effingere poterat; similes ijs, qui ex digiti libertate cubitum sibi arrogant; velocem præcipitemq; illam fieri circulationem, in medium afferre non dubitarunt; quibus, & Conringius fauet *lib. de sang. gen., & motu cap. 36.* quamuis in hoc persistere non audeat, sed ad scrupulum sanguinis singulo ictu fluentis se contrahat aliquando. Itaut per eos pluries in die, & bis qualibet hora deberet totus sanguis cum chylo per Cor, vt coquatur, recalsiat, & à vitijs corrigatur, circuendo pertransire. Et sic, si morari in eo interdicitur (per alternum enim systolem non datur); frequenti tamen transitu illud idem, quod quæritur, obtineri, autuant; prout apud Bartholinum „ legitur *pag. 146.* vbi hæc sunt verba: Si crebris circulationibus elaboratur, ergo perfectus, & maximè coctus partibus traditur: Id enim „ repetito circuitu assequitur chylus, seu sanguis crudior, vt quod vni- „ ca circulatione perfici non potuit, sequentibus, sæpiusquè repetitis „ gyris, vltimum vtilitatis gradum indispiscatur. Non igitur crudo „ chylo, seu sanguine imperfecto nutriuntur partes, sed illo, cui com- „ plementum circulatio addidit: imperfectus enim partibus non appo- „ nitur, sed per circulationem redit, vt perficiatur.

Quomodo
de circula-
tione sen-
tiant Pecque-
tus, ac Bar-
tholinus.

Qui quidem animi conceptus (etiã si modo per recentiores dispo-
sito circulatio prædicta daretur), vix capere possum, quomodo in men-
tem talium Virorum insurrexerint; cum à quauis proba ratione, aut
verisimilitudine prorsus abhorreant: Ponamus enim in homine viginti
quinque libras adesse sanguinis, si totus is per arteriosam venam, pul-
mones, & venalem arteriam transire per horæ dimidium deberet, stan-
te pororum, vasorumq; exiguitate, nonnè continua inundatio, turgor,
& murmuratio fluentis, imò furentis sanguinis persentiretur?

Eorum opi-
nio respici-
tur.

Prima ratio;

Sed & si toties temperatis Viris circuletur sanguis, vt probus, defæ-
catuq; enadat, in agrestibus, & intemperatis, qui quater, quinquiesquè
in dies singulos cibum capiunt, quoties circularetur? An enim putant,
circulationes ipsas proportionè respondere cibationibus, an verò om-
nibus hominibus eandem numero esse? forsàn, vt suos tueantur con-
ceptus, nihili pendent illud primum admittere, supponentes, quot ciba-
tiones augentur, tot proportionato numero plures circulationes fieri:
Verùm, & illud absurdissimum omnium erit, & omnino impossibile:
nam si in continentibus, & bis in die cibatis bis qualibet hora circulus
impletur, in alijs quater fieri debet: nonne ergo hoc erit potius præ-
cipitum, quàm naturalis motus? itaut sic Sanguinem Virgiliãno illo
metro alloqui liceret.

Secunda ra-
tio.

„ Quis furor, o succi, quæ vos dementia cepit?

Verius autem, quando talis daretur sanguinis circuitio, eadem debe-
ret omnibus non secus, ac integrales partes, & naturales alijs instinctus,
vel semel, vel bis ver. gr. in die, vel hora; vel, si deberet quicquam in
velocitate

Alia cibatio-
nis alia cir-
culationis
causa.

velocitate mutari, non à cibo, sed à motibus, ætate, sexu, & similibus mutaretur; non enim eadem, sed omnino differens est cibationis, coctionisq; ipsius, & supposita circulationis causa tum efficiens, tum finalis; & ideo non valet proportio ab vno ad alterum; Est namque cibationis, coctionisq; finis, vt de perdita, scilicet dissoluta substantia instauretur, & imperfecta moles augeatur; & sic in quibus crebra sit, vel propter labores, vel propter vacationes, vel propter habitus raritatem calori additam dissolutio, crebra quoque cibatio, coctioque expetitur, necessaria est, & bene toleratur; sicuti in quibus ob osium, aut spissum habitum modico calori adiunctum, tarda, raraq; dissolutio contingit, rara quoque instauratio appetitur, & fertur. Sed præter hæc alius quibusdam finis præfigitur, gulosis præcipue familiaris, vt scilicet gustu suauium tum ciborum, tum potuum fruantur. Sic efficiens coctionis causa est naturalis caloris actio, siue ipse calor agens, vt sibi assimilet passum; qui non definit, sed quoties aliquid coquendum offertur, insurgit, vt sibi assimilet: cum autem cibationis causa partim naturalis, partim animalis sit: (ex suctu enim oris ventriculi insurgit animalis sensus ad cibum quaeritandum) sit ex hoc quoque, vt multi, præsertim pueri, & ignari, exemplo, vel consuetudine ducti, cibos sæpius ingurgitent, & potiones.

Quis finis
circulationi,
& quæ causa
efficientis at-
tribuitur.

Circulationis autem finis (vbi illa detur), si eius Auctoribus standum, est, vt nouus semper partibus enutriendis sanguis offeratur; vt sanguis in ambitu refrigeratus, ad cor redeundo recalefeat; neue otando putridus fiat: Efficiens verò non animalis facultas est, non consuetudo, non naturalis calor agens, vt sibi assimilet passum; sed naturalis, inuoluntariaq; se habet vitæ insita facultas. Ergo, sicuti variis ambarum finis, varia efficiens causa, ita quoque non inuicem proportionata erit repetitio; Et sicuti pro vna cibatione potest bina, vel trina fieri, prout variat voluntas ingurgitantis, cui, & actio ventriculi potest ob caloris valorem respondere; ita ex altera, cum non euariant circulationis causæ, nec ipsa euariari potest. Quod si repetant, etiam in hac euariari posse, si non finem, saltem efficientem causam, vel etiam vtrumque, cum in cibatis pulsus sit maior, quam in famelicis, & maior calor, qui citius, velociusq; perficere possint opus; Respondeo, variari quidem aliquo modo, sed non eo, qui duplicato motui tribuere possit aniam, & effectum. Dico etiam, vel ex cibo calorem augeri, dum in ventriculo sit coctionis lucta, non ideo circulationi valiturum; vel ex eo ob caloris concentrationem, occupationemq; in coquendo, motui potius torporem, vel tægitiem addi. Patet igitur, saltem in sic crebro cibatis, siue pueri, siue agrestes sint Viri, magis adhuc chylum incoctum remansurum, atque talem partibus alendis offerri.

Ratio tertia.

Sed & impossibile esse huiusmodi circulationum prouentum in sano homine, vnicuique rem intimè consideranti patebit: nam primò considerandum (siue dyastoles, siue systoles causa pulsionis ponatur), eam ferè imperceptibili momento temporis perfici, alteramque alteri oppo-

sitam

fitam immediatè succedere. Item venæ arterialis osculum esse tùm ob cordis duritiem, tùm ob sygmoides membranas angustatum, itaut à modico sanguinis obturetur facillimè: igitur, dato etiam, quod in quacunque cordis adstrictione, vt putat Harueius, vel dilatatione, vt alij possit in illam aliquid impelli, vel attrahi an putamus, amplius quàm guttam vnā, vel alteram ab ea excipi? si daretur longitudo ictus sine contrario statim succedente motu, possemus ariolari, plures multò guttulas, & considerabilem quantitatem ingressuram: at cum subito vni motui impellenti alter attrahens succedat, impossibile est, quid considerabilis acceptari. Numerentur ergo ictus, & inueniemus, antequam quantitas ea, quæ ab vno pastu in sanguinem, vel chylum abit, pertraherit, aliam ex nouo pastu superuenire, itaut modicum quid ex reliquo massæ sanguinæ ad hoc opus explendum esset satis.

Quinimò non in omni Cordis ictu sanguinem in huiusmodi arteriosam venam posse propelli, siue excipi, omnis ratio suadet: nam cum ex pulmonis arctatione idem vas constringatur (sicuti in inspiratione dilatatur) fit quidem, vt tunc temporis ab ea potiùs sanguis Cor versus, vti vbi vas latius euadit, abigatur, quæ de causa à Natura affirmatæ sunt tres illæ membranulæ tricuspidales ostiolo ea figura adnatæ qua regressum in Cor sanguini contendant, vt ait *Gal. lib. 6. de vsu part. 10.* Ponamus ergo, in pulmonis arctatione (ea autem pulsu saltem duplo, vel triplo rarior, & tardior est) Cor constringi, vel dilatari; tunc, si dilatetur, nil ab eo impellitur, sed potiùs vacui ratione trahitur; si verò constringatur, manifestum, quod in restrictum quoque, & contrapressum vas, vel nil, vel modicissimum quid impelletur, & potiùs aer, qui subtilior quouis adigitur faciliùs. Et hæc ex parte eiusdem venæ, quæ non ad nutum Cordis, sed potiùs à respirationis effectibus, vt dictum est, mouetur.

Ex parte verò Cordis eadem expulsionis modicitas à pluribus potest argui. Et primò quia in sano homine parum Cor dilatatur, parumque constringitur, itaut ridiculum sit metiri quantitatem sanguinis transeuntis, & circulationis celeritatem à capacitate ventriculorum Cordis, quæ sanguinis vnciam, vel paulò magis continet: cum nec in maximo pulsu ventriculorum parietes valde constringantur: quandoquidem ex omnium mente in systole, etsi Cor adstringatur in latitudine, oblongatur tamen, vel si decurtatur, dilatatur ferè tantundem, itaut pauca omnino, facta computatione, fiat angustatio. Secundò, dato etiam, quod semper Cor in sua diastole aliquid à Caua trahat, longissimè illud minus est, quàm ij arbitrentur; cum receptioni obstat tùm sanguis, quì in quâtitate aliqua semper in ventriculo eius moratur, tùm aliquid aeris, quem ab arteriosa vena, ab alijs suis osculis, & poris attrahit. Tertiò quia Cor hominis continuis agitationibus deditum, multoties in suo impeditur, & distrahitur munere. Addatur his alia ratio, quæ infra legitur

cap. 12., vbi etiam contraria argumenta soluuntur. Quare, data etiam

Modicitas sanguinis in arteria lem, ad Cordis quemcunque motum introeuntis ostenditur.

Non in omni Cordis ictu sanguinem in arterialem venam introeuntis ostenditur ex parte ipsius.

Idem est pars Cordis esse ostenditur.

(at non concessa) aliqua circulatione, sufficeret, quod nec semel in die, omnibus ritè perpenſis, illa fieret. Et hoc modo manifestum, quod chylus incoctus, sanguisque crudior remaneret, (& hoc esset pro partium alitione incongruum, & perniciosum); vel etiam in lacteis moraretur, vel in subclavijs.

Ratio quæ-
ritur.

Item si talis detur motionis celeritas, ita ut per solam diastolem in Cor ingreditur cum sanguine chylus, & per statim subsequentem systolem expellatur, quæ illi coctio obueniet, & quam à Corde gratiam est acquisiturus? nulla naturalium alterationum fit in instanti, & maxime ubi substantiæ modus, & forsan forma commutanda sit, prout si ex chylis, qui aqueus, tenuis, insipidus, vel aliquando acidulus, & in summa à sanguinis natura dulci temperata, in mediocri, & spirituosus valde distans, debet sanguis euadere. Nec dicant, illum, transeuntem per glandulas, & per lacteos tubulos, coquendum, & disponendum: nam à partibus exanguibus, frigidis, albis, & nulli visceri contiguis, vel dependentibus, quæ dispositio, pro sanguine gignendo speranda?

Ratio quia-
ritur.

Adde, quod neque huiusmodi circulationum Pecquetianus proveniunt in sano homine admittendus est: mirum enim, quod ei locus esse possit citra mentis amentiam, ingenij stoliditatem, memoriæ vacuitatem, imaginationis instabilitatem, voluntatis inconstantiam, animi agitationes perpetuas: Si enim continuè, & furenter sanguis in cerebrum ab arterijs eiatur, & à venis in Cor reducitur, quæ quies primo tribuitur ad contemplandum idonea, ad iudicandum apta, ad retinendum necessaria? Et quæ secundo ad cogitandum commoditas, ad deliberandum facilitas, ad sustinendum idoneitas dabitur?

Cum igitur nec detur, nec congruat à Pecquetianis supposita circulationum crebritas, patet, suppositam quoque coctionis, ex moræ defectu, imperfectæ compensationem per transitus iterationes cessare, & sic alimentum partibus offerendum crudum, vel malè coctum. At vero dicent ipsi: si ergo datur mora, dabitur, & coctio, sicquæ cessat ratio: Verùm animadvertant, quod sic retorquere ijs non valet: nam hinc alia succedet supra tacta imperfectio, nimirum quia per sictardum, rarumque sanguinis progressum ad Cor, chylus in lacteis remanebit, nec à venis subclavijs cum sanguine in cor feretur; præterquàm quod tunc omnia insurgent absurda, & pericula, quæ in primis prioris libri capitulis recensentur.

Incoctum
remanere
sanguinem
admittunt
Neosensici.

Igitur, cum illud effugere non possint, flocci facere, nec curare decernunt; non incongruum arbitantes, incoctum alimentum partibus offerri; quoniam unicuique, inquit, parti inest virtus assimilandi sibi, quod probum sit, & expellendi, quod noxium, vel inutile; Quasi quælibet pars a Natura dotata sit canalibus duplicibus, qui alimentum deferant, & qui excrementa recipiant, aut secernant, veluti cerebrum, Cor, lecur ventriculus, pulmo, renes, vesica, vterus &c. At quis, quæso, modus supererit cæteris integrantibus partibus sese à noxijs exonerandi?

At hoc in-
congruum
monstratur.

Musculi,

Musculi, caro, glandes, ossa, castilligines qua via tum tenues, tum crassum excrementum, si multum sit, extra mittent? Porro non omnibus illa celebris daza vsa est, quæ didis visceribus, & cuti contigit. Nonne ergo congruentius illud Naturæ institutum est, ut sanguis, quoad licet, defæcatissimus, & optimus heheretur, expurgatis nimirum partibus noxijs per communes cavitates? Vapore cum nec sic fieri possit, quia aliquid superfit, à partibus euitandum, & in communes venarum, ac porulorum riuulos dereliquendum; quod, quia paucissimum est, per capillaria eorum extrema oscula extra pro foris, ac pilis extruditur, & si copiosius, aut vitiosius, in vicera, vesiculas, porrigines, bubones, furunculos, erysipelata, scabies, aliasq; cutaneas affectiones abijt, & tandem si plurimum, in venis resistat, quoad natura eorum magna molestiam tolerare potest, na&aq; aliqua occasione, per alium, vinas, sudores, stomacum, nares, hæmorrhoides, vterum, aut aliam ei commodiorem viam, si valida illa sit, expellit, sin ægra, aut defatigata, febris sustinet, & contra noxia pugnans, valetitice vincit, vel paulatim dissolvens, atterit, vel tandem ipsa occumbit.

CAPVT SECVNDVM.

Contrarie rationes pro circulationis velocitate probanda allata dissoluntur.

Huiusmodi autem circulationis prædictæ velocitatem ne quidem putandum est ab hisce Auctoribus gratis positam, creditamque esse: Eam enim ex multis phænomenis sibi visi sunt rationabiliter coniecisse, ac eliciisse, quæ quia juniorum mentibus tenebras offundere ob verisimilem apparentiam possunt, hic libet examinare, & illorum lubricitatem, ac fallaciam summam detegere.

Præter igitur præmissam Cordis ventriculi capacitatem, cui iam pro parte responsum, corpus viuum secantes, & venam aliquam exutam alligantes; obseruauerunt eam citissime versus Cor inuolutam fuisse. Item Caua vena constrieta, & vulnerata Aorta, viderunt singulo cordis ictu sanguinem copiosum prodijisse, breuiq; interiecta mora, sine sanguine, & Cauam ipsam versus Cor, & Cor ipsum remansisse. Vt ideo (cum horæ dimidia plusquam mille fiant Cordis pulsationes) aptè concludere liceat, posse simili tempore totum corporis sanguinem circulationis metam attingere, & in Cor, iterum circuiturum, redire, iteq; simul facillimè chylum à subclauijs venis in idemet Cor ingredi, totiesq; regredi, quoad optimam coctionem nanciscatur.

Verum his, & similibus alijs experimentis, unica responsio satisfacit; aliud nempe esse, considerare sanguinis motum naturalem in homine, vel alio animali integro, sano, & quiescente; aliud verò coactum, in eodem lacero, vulnerato, angoribus, angustijs, pressuris, & interitibus

Experimenta à quibus circulationis velocitatem venarum perqueantur.

Ad eandem respondens.

facie affligto: Sicuti enim in illo naturales, ordinati, lenesquæ sunt motus, & actiones quæcunque; ita in hoc omnia violenta, subita, confusa, inordinata, & præcipitata conspiciuntur. Quorum signum euident, simulquæ causa est, in hoc non pacificæ; & submissæ, sed saltuosæ, tensivæ, palpitantes, & omnifariam dimoueri Cor, & arterias; corpus vndique se efferre, torqueri, exudare, vociferare, spumescere; Mentem agitari, tremiscere, irasci, effrari: his autem contraria prorsus omnia in sano, quieto, & pacifico corpore prædicari. At quantum illiusmodi pathemata valeant (relinquatur pro nunc illius perversio, alibi tangenda) ad motum sanguinis augendum, citandum, & cogendum, nemo sanæ mentis diffitebitur.

Alia experi-
mentis lenio-
ribus.

Quapropter, & ipsi contrarij Auctores, scopulum inevitabilem videntes, ad leniora transeunt experimenta: Abcissa ergo vena in phlebotomia, inueniunt horæ quarto ad libras sanguinem, vi arteriarum demandantium, exire; & sic, computato eo, qui à tot alijs partibus posset ad venas quascunque regredi, non videntur extra rationem conijcere transitus suppositam velocitatem. Abcissa etiam arteria aliqua insigni, referunt ex Galeno, horæ dimidio totum sanguinem tum arteriarum, tum venarum omnium euacuari posse.

Ad phlebo-
tomiam experi-
mentum
respondetur.

Sed quamvis primum experimentum cæteris violentia cedat: non tamen in eo violentia neganda, cum in vulneranda parte frigidio, ligatura, vulnus, balneatio, motusquæ fiant, & per consequens dolor aliquis adsit; omnia ad exeuntis succi motum maximè augendum, & accelerandum valde idonea: præterquam quod in progressu videbimus, in phlebotomia non ab arterijs, sed à venis præcipue, & sic præter Cordis transitum sanguinem exire. Addatur, aliud esse succum contineri in vase integro; aliud verò in rupto, vel discisso: sicuti enim in eo potest, vel quiescere, vel insensibiliter repere; in hoc necessario, & mouetur, & celeriter exit: cum humidi proprium sit fluere, vel ab alio terminari, & sic per successionem succus succum, sequatur, adigatque simul. Quantum quoque improprium sit ab artificiali hac euacuatione ad naturalem sanguinis internum motum arguere, perspicit is, qui in hoc præcuntis succi impedimentum, in illa ineitamentum agnosceret. Tum, & qui considerat, in corpore centenos esse venarum ramos non brachiali illo scisso minores, & qui, si vulnerentur, non minus sanguinis sunt effusuri, faciliè arguendi insufficienciam detegit, dum non horæ medio, sed minima sic horæ parte totum sanguinem effundendum fore, perspicit; quod in integris ipsa cogitare, vel imaginari, insulsum.

Ad arteriæ
incisionem
respondetur.

Idem dic de vulnerata arteria: quis enim crederet, ab ea non exire sanguinem, nisi qui à Corde in eam singulo istur transmittitur? An nè potius ab omnibus tum superioribus, tum inferioribus arterijs ad scissionem confluet? Spirituosus succus, & calens ipse sibi aditum parat. Quinimò, & per pulsus diastolem credendum est, per crebras illas anastomoses, quæ passim inter hæc duo vasorum genera habentur, sangui-

nem à vehis quoque omnibus in comites arterias exugi, & ab his ad
 lauciam conuoluturum. Abiis ergo à nobis similis arguendi, & conio-
 candi modus.

Cæterum si quæ alia huc faciant experimenta, ea omnia in progressu
 Libri, ubi tùm Harueij, tùm Affectarum ponderantur pro circulatione
 adductæ rationes, in veram reducuntur causam, & inconcludentia
 ostenduntur. Hic igitur pedem figamus, concludamusq; iterum, siue
 stetur Harueio circulationis inuentioni, siue consideretur ipsius circula-
 tionis (si modò datur) lenis motus, nil pro chyli deductione ad Cor ex
 ea desumi, sed inconcussum manere assumptum, secur sanguinis officina-
 nam esse, ab eoquè in totum corpus distribui, & in Cor speciatim.
 Hæcquè verior, & à sæculis confirmata opinio est, cui insistere, decen-
 tius multò, quàm singula hucusque à nostris Parentibus longissima ex-
 perientia excussa dogmata inuertere, negareq; ea, quæ nostri iudicii vis
 capere non potest.

Concludunt
 iterum pro
 securis con-
 uolutione

Vanissima siquidem illa Iuniorum quorundam iactatio est, quæ præ-
 sumit, & prædicat, Literas, & Artes in dies augeri, nouaq; inueniri
 semper; Veteres autem desipuisse: cum potius ratio dicat, quò magis
 ab origine quid distat, eò minus de sua virtute participare; Et sic cum
 omnes scientiæ, ac liberales Artes ex Adamo, & primis ijs Heroibus,
 quibus à Deo specialius infusæ fuerant, per vim semini inditam, & per
 traditionem emanauerint, facilius est, vt per obliuionem, in capacita-
 tem, incuriam, egestates, tribulationes, bella, terremotus, incensiones,
 ac alia deuastationum genera paulatim minuantur, quàm quòd incre-
 mentum quotidie capiant, vel sine capturæ. Et hoc unicuique singula
 percurrenti patebit: Nam etsi quædam nouiter inuenta videantur, si
 benè examinetur res, siquè omnium Mundiorum, & quoruncunq;
 Scriptorum liceret habere notitiam, inueniremus, vel ab alijs regioni-
 bus emanasse, vel à veteri aliquo Scriptore ad aliud propositum, vel
 diuersis vocibus, nomenclaturis, aut significationibus exiisse; multoq;
 plura esse, quæ prætiosissima in Arte nostra Antidota, delitiosa vnguen-
 ta, medicationum genera, compositionum formæ, simplicium cogni-
 tiones, opinionum celebritates, sententiarum pondera euauerunt,
 quàm quæ non de nouo inuenta, sed aliter depicta, vel illinc huc depor-
 tata, aut ab Exteris Auditoribus tradita, tamquam noua, inferiorum
 oculis offeruntur. Quorum ratio est, quòd omnia voluntur, sicut
 Cæli, & quòd nunc cunctis placet, sit ex longa consuetudine asperna-
 bile; ideo ad alia, quæ antea pro derelictis habebantur, recurritur, &
 veluti noua amplectuntur, prout, & in mechanicis Artibus experimur
 quotidie.

Hæc verò pro abundantia Cordis obiter sint dicta in patrocinium
 famæ Antiquorum nostrorum, à quibus omnis nostra Ars, & omnis
 scientia dimanat; nequaquam autem in detrimentum veræ laudis Eo-
 rum, qui bonis insudantes virtutibus, ea, quæ temporis vetustas, aut

bellorum tonitrua, aut ingeniorum otiositas conspuit, Orbi literario restituunt, instaurant, innouant, expolunt. His (testis mihi Deus sit) ne latum quidem vnguem inuideo, sed ominor meliora semper.

CAPVT TERTIVM.

Adducuntur quædam, quæ admittendæ circulationi obstant plurimum, & à contrarijs solutionibus vindicantur.

HVeusque de adinuenta sanguinis circulatione incidenter egimus, eoquæ consilio in primis, vt monstraremus, ea etiam data, datoquæ, discursus gratia, chyli peruentu ad superiora, non posse, nisi incongruenter, subsistere Pecqueti, ac Bartholini suppositam chyli commigrationem per venam subclauiam ad Cor. Nunc vero seriò disquirendum, num talis circulatio detur, & realiter subsit, necnè, quò, illa, si fieri potest, profligata, res omnis in pristinum redigatur statum, & sumiora semper sese præferant Antiquorum dogmata. Multa ergo sunt, quæ illi admittendæ obstant sumoperè, & ea hic adnectere liber, vt aliorum præcipuè ingenia melius pro veritate indaganda acuantur, & eleuentur. Primò ergo.

*Obiectio
prima.*

Si daretur huiusmodi circulatio, sanguis, in quafibet corporis vna (ni adsit obstructio, aut partis peculiaris affectus) idem, eiusdemque qualitatis esset: Sed contrarium quotidiana docet experientia: Ergo non datur. Probatur prior ex hoc, quod ab eodem fonte (iuxta Circulationem mentem) omnis promanat sanguis, ad eundem totus insatiabiliter redit, sicquæ per plures, & multiplices circulationes miscetur: ideo videri non potest, quomodò, adhuc sano existente homine, vel saltè in vniuersali affectione detento, in vna parte sanguis sit vitiosus, & in altera probus: Quod tamen euenire, in dies conspiciamus, tum in phlebotomijs, quæ in præseruationem, & præuentionem sunt, tum in ijs, quæ communibus morbis, vt synochio, exercentur: Nam, secta vena, multotiès sanguis in principio bonus, in progressu prauus, vel e contra in principio vitiosus, inde consequitur optimus, nonnunquam in vna phlebotomia vnius qualitatis, siq; reteretur, alterius; ab vno brachio laudabilis, ab altero, vel à crure malus. Huic obiectioni respondebunt Contrarij, non futuram in sanguine mutationem, nisi aliqua pars sit affecta, cuius etsi sensu nondum percipiat affectus, vel oblescitatem, vel ob inaduertentiam euenire. Non tollit verò hæc responsio obiectionis efficaciam: quia ad hoc, vt dicta de causa aliqua in sanguine diuersitas esse possit, necesse est, in illa parte circulationis vira cessare, & sic diuersum in ea sanguinem asseruari; quo stante, cum arteriarum hominibus in eadem seruetur pulsus (alias extremè pateatur), & per consequens arteriosis sanguinis noua semper per eos affluxio fiat; horum vnum necessariò euenturum est, vel scilicet affluentem foras propelli,

& sic

*Responsio
ad eandem.*

Relinquitur.

& sic prauum quoque foras exire, vel ibi constipari, acruari, in tumoremue eleuari, & sic sensum minimè latere, vel nec per phlebotomiam extrahi. Sed sine his diuersitas prædicta experimento ordinario in æutris corporibus phlebotomatis obseruatur.

Quinimò, si dicta daretur circulatio, idem quoque, eiusdemque; qualitatis esset sanguis tùm in venis, tùm in arterijs. Sed diuersus cernitur: Ergo nec datur. Probatur prior; quia si à venis per Cor in arterias, ab his in venas, iterumque; ab his in arterias circuyendo commigrat, & remigrat incessanter, nescio, quomodo, qui in arterijs reperitur, varius, sed differens possit esse ab eo, qui in venis. Dicit forsan Pecquetus, qui in venis est, insici seù variari à chylò ei admixto: Sed hoc non est verum ex sua suppositione: quia ex ipso chylus refunditur in axillarem venam quatuor solùm digitis longè à Corde, & in Cor statim migrat, vt in arterias statim quoque ingrediatur. Præterea si ex chylò insiceretur, minus purpureus ex eo in venis fieret; at e contra cernitur. Dicit alter, in transitu per Cor sanguinem mutari: At quomodo in vno ictu mutabitur? Et si iterum in venas redit, cur non sic mutatus?

Obiectio secunda.

Pro Pecqueti responsio refellitur.

Alia responsio inutilis.

Probatz secunda propositio.

Alterà verò propositio constat experimento, ratione, & auctoritate. Experimento quidem; quia in arteriotomijs, tùm studiosè, tùm casu factis, obseruatum fuit semper, sanguinem viuidum, floridum, tenuemque; & spirituosum exire, cum in phlebotomijs purpureus, obscurus, crassus, & multoties cacohimus exeat. Idem, & in vulneribus obseruatur, in quibus eodem tempore à sectis arterijs sanguis tenuis, rubicundus, & seruens proflire conspicitur, à venis autem crassior, densior, obscuriorque; egreditur. Ratione; quia cum arteriæ Cordis, in quo natiui caloris, & spirituum fons reponitur, vera sint germina, non potest nisi sanguinis pars melior, & spiritosior in ijs contineri: in venis autem, quæ nil, vel parùm à Corde immediatè recipiunt, ac dependent, iecoris autem ventri appendices sunt, sanguis, qualiscunque est, ac iecori similis gignitur, retinetur, & ad membra fluit. Auctoritate aurem, quia, vt tradit Gal. lib. 4. de placit. Hipp. & Plat. cap. 4. quem plures alij sequuntur, sanguis, qui in arterijs reperitur, sicut, & in sinistro Cordis ventriculo, tenuior, flauiorque; nonnunquam verò nigrior, semper autem calidior visitur eo, qui in venis, & dextro ventriculo cernitur. Vesalius etiam lib. 3. de corp. hum. faber. cap. 2. in fine ait, tenuiorem, rarioremque; & velociori impetu ruentem substantiam arterialis, quàm venas, amplecti, cuius testimonium ratificare videtur arterialis constructio, sextuplò venali crassior. Hic tamen consistunt Juniorum nonnulli, præcipueque; Hermanus Conringius hanc sanguinis diuersitatem denegantes, & utrunque sanguinem similiter rubicundum, & æquè conrescentem asserentes: Verum hoc negare est negare sensum ipsum, cuius tamen iudicio ipsi profitentur omnia sua statuminare dicta; & illud idem, quod plurimi suorum Sequacium admittunt, sicut, & Harucius ipse, qui solùm circa spirituositatem, non circa tenuitatem contendit. Imò Gal-
truchius,

Ad eam oppositio.

Refellitur.

truchius, vt videbitur inferius *cap. 22.* ex diuersitate, quæ in educatione sanguinis per venæ incisionem pulchrioris in fine eduçti, inuenitur, confirmare prætendit (quamuis perperam, vt ibi dicitur), exitum illum ab arteria fieri.

Obiectio
tertia.

Item si deberet illa eadem fieri circulatio, arteriæ capacitare, & numero venas æquarent, imò potius superarent, cum illæ ultra sanguinem spiritus copiosos (quibus nec suus denegari debet locus) contincant, & quoquoersum deducant: Sed aliud cernitur: Ergo non debet dari. Prior probatur, quia si sanguis a toto corporis venoso genere confluit ad Cor, & ab eo consequenter æquali motu rythmoq; in arterias pellitur, itaut quantum vno trahitur motu, tantum altero pellatur, manifestum est, si æqualitas in hoc seruanda, quod recipientes arteriæ respondere deberent demandantibus venis, sicuti, & expulsio attractioni. Sed verò hoc non esse, ocularis inspectio docet, quæ arterias generaliter ob binas tunicas, easq; sextuplo crassiores, quam venarum tunica, vt etiam tradit *Gal. 6. de vsu part. 10. Vesal. vsupra ex Herophilo, & Arist. ipse lib. 3. de hist. anim. 3., & 4.*, minores multo, & incapaciores esse, visitur. Adde, & numero pauciores, maximè in partibus iecoris, mesenterij, & totius abdominis, vt testatur *Arist. loc. cit.*, & clariùs *Gal. lib. 16. de vsu part. 12.*, nec diffitetur contraria pars, docetq; nouissimè Riolanus. Huic obiectioni, sibi met etiam factæ respondet *Reu. 10.* Paulus Galtruchius è Societate Iesu, sicuti, & Coniungius, ac alij: Sed eiusdem responsio ponderatur, & infringitur infra *disco. cap. 22.*, vbi peculiariter Egregij illius Philosophi rationes considerantur, dissoluiturquè; Sicuti non parua vltiorem explicationem, & confirmationem nostra hæc capit obiectioni ab ijs, quæ in decima octaua obiectione enodantur.

Obiectio
quarta.

Adde, quod, si talis debuisset dari circulatio, necesse erat, vt & aliqua daretur continuatio cavitatum venarum cum arterijs, harumq; cum venis, vel alius canalis ab his ad eas, ab illisq; ad has deferens. Ast nulla huiusmodi continuatio datur, nec alius apparens canalis cernitur: Ergo &c. Prior probatur ex eo, quod in necessarijs nunquam Natura defecit: quod autem necessaria sit osculorum connexio in ijs vasis, per quæ fieri debet ordinarius alicuius humoris fluxus, patet exemplis, per quæ videmus Naturam prouidisse de congruis canalibus ad transmigrationem cæterorum succorum chyli, feri, feminis, bilis &c. Hæc tamen continuatio inter Cavam, & Aortam nullibi cernitur, cum inter eas intercedat septum Cordis, & illud crassissimum, per quod veluti refudare cogitur, & per cæcos meatulos à Riolano admissos *lib. 3. anthrop. cap. 12.* & à Bartholino alios referente *lib. 2. anatom. reform. cap. 7.* veluti transcolari pars sanguinis tenuior à dextro eius ventriculo in finistrum, pro arterioso sanguine, ac spiritibus instaurandis. Arterialis autem vena, per quam transmigrationem fieri, autumant Neotericorum permittit, contigua quidem est Aortæ caudici in sui exortus principio, sicuti, & arteriæ

arteriæ venosæ germinibus : non autem earum cavitati continuatur ; nec præter originis funiculum , seu nodum in fatibus , alio modo cum arterijs confluit , conspiratq; quàm per quasdam anastomoses , non secus , ac inter cæteras corporis vniuersi venas , arteriasque fieri , docet *Gal. lib. 6. de usu part. cap. 10.* propè finem his verbis : In toto corpore , mutua est anastomosis , atque oscillorum apertio , arterijs simul , & venis , transsumuntq; ex sese pariter sanguinem , & spiritum per inuisibiles quasdam , atque angustas planè vias] Sic etiam neque à finibus arteriarum continuatur in venas cavitates , sed vel caro , vel aliud corpus intercedit , ita ut non nisi per quasdam veluti diapedesim possit ab vno ad alterum vas transitus fieri .

Contra obijciunt autem , similem à nobis supponi chyli sanguificati traductionem per hepar à vena Portæ in Cauam , inter quas , vel intercedit caro lecoris , vel si se osculantur oscilla vtriusque venæ , id inuisibile est , & sola ratione euictum : Sed respondetur , non esse parem rationem , nec vllam proportionem vnius ad alterum : nam in hepate non solum chimitransitum supponimus , & desideramus , sed & ipsius coctionem , & excrementorum secretionem ; quæ ideo hoc obstaculo indigere ad hoc , vt plus temporis in Hepate succus retineretur , inibi à fœcibus per lienis , ac fellis adiutorium expurgandus : At in Corde , ac pulmonibus nec talis pro circulatione mora quæritur , nec haberi potest ob subalternantes systoles , quæ sanguinem foras exprimunt , & ob carentiam latebrarum , aut venæ gyrorum , qui ipsum remorentur . Quod si hæc expetebantur ad attenuationem , dissolutionemq; sanguinis in spiritus , iam non infimum hoc signum est , circulationem non desiderari . Quinimò , & debilius multò est impedimentum , in iecore suppositum , eo quod in Corde , pulmonibus , carne , osse , aut alia parte inuenitur ; cum imò Vesalius cum alijs multis ponat , oscula venularum Cauæ cum Portæ propaginum osculis coire , & visibiliter vniones obseruari , sicuti , & circulationis acceptatorij plurimi testantur , cum e contra in Septo Cordis oscula cæca , & forsan sola porosa quædam raritas adsit , nec in pulmonibus aliqua inter hæc varia vasa apparens semita adsit , nisi quædam rationabiliter admittantur anastomoses , vt necesse est . Item tertio per hepar sola portiuncula , nimirum ex quotidiano alimento enata , & vnica vice tantum transire habet : at pro circulatione supposita vniuersus corporis sanguis , & pluriès in die , & celerrimè pertransire prætenditur , quod an fieri per inuisibiles coniunctiones ordinatè possit , quilibet cordatus Arbitrè decernat .

Contra obijciunt.

Soluitur.

Has difficultates videns Conringius *lib. de sang. gen. , Et mot. nat. cap. 43.* ab Auctore Harueio deuiare coactus , eiusdem sententiam de sanguinis transitu per partium poros refellit non aspernendis rationibus ; totusq; est in probando , dictam transumptionem per anastomoses , sed coniunctiones vasorum ad inuicem fieri ; quas dari permultas , quamuis non appareant vbique , probat exemplo multarum coniunctionum , quæ videntur

Coniunctionem migrationem in venas per anastomoses fieri statuit.

Impugnata.

videntur in liene, renibus, feminalibus vasis &c., & ratione convenientiae, quæ, sanguinis vase in vas redictionem, concedens non fuisse, per extrausationem fieri, suadet. Omnia bene, si illam fieri, patens esset, vel necesse: sed cum nec fieri pateat, nec sit necesse, frustra ad exempla, & ratiocinationes similes confugitur. Quod non pateat, est clarum, cum pro illa affirmanda ad ligaturarum coniecturas, quæ æque contra, ut infra dicetur, possunt concludere, sit recurrendum. Non esse necesse, verisimillimum est; quia sanguis mea sententia ad partes fertur non animi gratia, non ratione superflui, sed nutritionis, sed necessitatis, ut naturalia omnia, non per modum transeuntis, sed alentis. Obiter autem hic notatum velim, Circulationis fautores, qui omnia sua putant per sensatas demonstrationes probare, in plurimis ad coniecturales rationes confugere, ut ideo illorum quiuis ab altero passim dissentiat. Et verò, si intimius responderetur, non ritè ad huiusmodi anastomoses confugitur: quia cum huiusmodi coniunctionum oscilla utrinque sint peruia, non videtur, quomodo tantum non valeant ad reddendum arterijs, quantum ad recipiendum ab ipsis, tantumdem apta ad retrahendum dilatatione earundem, quantum ad remittendum pollet constrictione. Item, & arteriæ omnes, si sic esset, finire, & insinuari in venas, non in carnes, ossa, & cæteras alendas partes deberent, alioqui sanguis ille per fines exiens, non in venas migraret, sed per partes ipsas, spargeretur, vel foras exiret: illud autem non esse, sensus negat, & auctoritas Anatomicorum, qui suas utrisque vasis capillares extremitates in partes finientes assignant. Patet item, è directo magis ad fines sanguinem ab arterijs eiacularum, quam in laterales anastomoses. Sed & non magis in capillaribus arterijs, quam in ramis, & truncis similes observantur connectiones vasorum: in has autem, & per has fieri reditum sanguinis, & difficillimum, & inutile; ergo nec in illas.

Obiectio
quinta.

Respondetur
ad eandem.

Confutatur
responsio.

Accedat, si eadem daretur circulatio, frustraneam, & superfluum fuisse illam Naturæ diligentiam in ferè ubique associando arteriam venæ, illasquæ inter se varijs oscillis inuicem conspirantes officiendo: quia si per circulationem sanguis à venis in arterias, & ab arterijs in venas totus erat transiturus, ad quid illa itineris associatio, oscillorumque tam decantata coitio? Respondebunt, non frustra, sed utiliter, ac ad rem id à Natura factum esse; coniunctas scilicet arterias venasque ire, ut mutuo, ac vicissim se calore foueant; ut arteriæ venarum adiuvant crebra sua vibratione motum; & ut extremis anastomosis occlusis, per alias vias ab arterijs in venas ciaculetur sanguis: Sed inutiles, & superuacuae hæc utilitates sunt, nec à Natura intentæ: nam quoad primam, manifestum est quod, si mutuo fotu vasa hæc indigerent, id esset magis ex parte venarum, quæ iuxta Circulantium dicta sanguinem in extremitatibus partium refrigeratum ad Cor reuehant, quam ex parte arteriarum; vel saltè in inutuum; & tamen reperiri contingit venas sine arterijs, non has sine venis, prout tradit Gal. 16. de vsu part. cap. 13., &

non

non inficiantur ipsimet contrariam opinionem insequentes. Quoad secundam res potius è contra est: nam siuè ex arteriæ motu, vt à multis autumatur, siuè à gravitate descendens succi, alterius tubi succum, vt Conringio videtur, ad ascensum impellente, ea expectetur utilitas, potius contrarium fore expectandum, rationabile est: mobile enim, vbi aliud mobile ad motum inuitat, secum trahit illud, non è contra; & sic cum arteriæ per eos ad extrema deuehant, sic etiam venas incitarent: Succum autem per tubulum ad infra fluentis impetus iuuat quidem alterius ascendens motum, si in quadam moderata, & paulatina ascensione alter dilongetur tubus, non autem si per idem ferè iter retrogredi per alterum quidem tubum, sed simul eundo conexum, ei opus sit. Quoad tertiam verò utilitatem frustra expectatur ea; cum non minus superiores, quàm extremæ anastomoses obstrui possint, & sicut ad recipiendum, ita ad remittendum aperta oscula prosint; vt ideo non magis sint per ea venæ recepturæ, quàm reddituræ per eadem.

Sed nec talis fieri potest per arterias sanguinis transitus perennis. Obiectio sexta. Primò ob continuum ipsarum motum per constrictionem, & dilatationem; cum eodem istu non in vna parte sola, vel propè Cordis hiatum, sed in toto corpore idem arteriarum motus obseruetur: quare quantum receptioni prodest dilatatio, tantundem constrictio obest: Siquidem, si in rerum natura non datur vacuum, manifestum est, in dilatatione pulsus fieri in toto arteriarum excurso attractionem, vel sanguinis, vel spiritus, vel aeris ad totam dilatatæ cavitatis capacitatem implendam; in constrictione verò eorundem expulsionem: Ideo non per determinatam partem, nempe à Corde, poterunt sanguinem, ac spiritum totum recipere, & inde alio pellere: quia sic vna pars alteram impedit, aut agitat, & sic regurgitatio, vel vndositas saltè, quæ non nisi in præternaturalibus obseruatur; tùm quia nec tantus à sinistro sinu euolare potest succi, ac spirituum proventus, vt dictam possit replere cavitatem, & sic aliunde necessariò aduenient. Secundò, quia, his etiam datis, cum arteria corpus durum, ac crassum sit ad hoc, vt spiritui retinendo esset idonea, sic docente Galenoratiōi innixo *lib. 6. de vsu part. cap. 10. iam cit.*, oscilla autem, si quæ adsunt adeo tenuia sint, vt lynceum quoque visum effugiant, sicuti, & earum fines in densa corpora carnem, membranam, cutem, ossa &c. interancuntur; difficile ab ea exhibit per anastomoses, & in eam recipietur sanguis, & non nisi tenuissimus; crassior autem remanebit, ne circulabitur. Neque dicatur, a Corde illum extenuatum iri: nam quod crassum est, per vltiorem coctionem crassescit magis; nec calor dissoluenso semper attenuat, sed multoties crasse facit: Ast hic animaduertendum, quod Marucius cum suis Contrapositio ex Hæuicio. Pedissequis, quando dilatantur arteriæ, Cor constingit, quando illæ constriunguntur, hoc dilatari tenent, & sic videtur cessare obiectum constrictionis, dilatationisq; nil propterea repugnantium; cum clarum sit indicium pulsionis à Corde in dilatatam Aortam. Illud autem expe-

rentia oculari obseruauit in corde viui animalis à suis capsulis libero, ac dissecto: obseruabat enim, quando pectus pulsatur, tunc Cor dilungari, tendi, & adstringi; cum verò pulsatur in pectore, in quauis arteriæ parte pulsari.

Resoluitur.

Sed experientia hæc nimium fallax: nam clarum est, membrum sensituum, vt Cor, dilaniatum, scissum affictumque; non naturaliter quidem dilatari, ac moueri, sed modo quodam ferè conuulsivo. Et hoc est, quod ei imposuit, vt putaret, illam elongationem, quoniam cum tensione dolorifica, & quodammodo constrictiua fiebat, systolem esse. Hoc autem verisimili nimium repugnaret, cum sentiamus per tactum, quo tempore pulsus in regione Cordis sentitur, eodem, & in carpo, ac temporibus ferire: Si ergo ille ictus in alijs partibus diastole est, ac dicitur, cur non in Corde? Et ratio idem dicat: nam vnumquodque sequitur naturam sui principij, nec potest quid moueri motu contrario ei, quo suum principium mouetur. In his autem hallucinatum ipsum esse, patet ex modo, quo Cor pulsans considerat, ac describit in suo *lib. de motu cordis cap. 2.* Nam inquit, dum Cor mouetur, vndique contrahi, magis verò secundum latera: in quiete autem ipsum laxum, flacidum, enervatumque; iacere, præcipuè quando emori incipit. Nemo verò est, qui nesciat, pulsus, sicuti ex duobus motibus contrarijs constat, nempe ad extra in diastole, ad intra in systole, ita duas quoque esse quietes, vnam in diastolis, aliam in systolis sine: Si ergo in vtraque Cor flaccescit, & in vtroque motu tenetur, manifestum, quod etiam, & magis in diastole erit Cor duriusculum, ac tensum; cum maior vis ad se dilatandum, quam ad se constringendum plerumque requiratur: Quare videmus, ipsum considerasse pro systole motum, pro diastole intermissionem morientis Cordis, non diastolis, ac systolis, quæ ambæ motus sunt, differentiam.

Patet etiam, ipsum in tali elongationis, & temporis obseruatione falsum esse ex eo, quod à Fautoribus suis in hoc experimento desertus est. Vnde videmus, Conringium *cit. lib. cap. 36.* cum Cor pulsatur, sursum ad basim mucronem eius contrahi, enunciasse; Deusingium quoque non equidem Cor elongari, sed quia tunc circum angustatur, longius ideo tunc videri *lib. de motu sang. & Cord.* asseruisse. Sed de hoc fusius proprio capite, vbi eodem, quo Cor, arterias motu moueri, firmatur, differetur inferius.

Obiectio septima.

Quod verò magis refert, Non est necessaria talis circuitio sanguinis. Ergo nec dabitur. Consequentia est nota: Naturalia enim talia ex necessitate sunt, & fiunt. *Arist. 2. Phys. 75.* Probatur antecedens: quia nō ad nutritionem (cuius gratia sanguinis præcipuè motus est) partium: nam ea fit quiescendo, non transeundo: vt enim partium natiuus calor agat, in futurum alimentum, & sibi illud assimilet, requiritur quies vtriusque, & aliquo tempore contactus; per circulationem autem non solum qui peruenit sanguis iter suum sequitur, sed & si quid antea iam firmabatur,

batur, vel illud secum rapit, vel continuo noui aduentu immutabitur, recrudescet, sicquæ actio turbabitur, nec vera nutritio fiet. Non ad euentuationem: quia motus calidi succi per loca calida potius maioris est causa caloris. Non ad pulsū: quia cum is idem, & æqualis eodem tempore in toto corporis ambitu fiat, non sanguinis, alteriusuē tenuioris substantiæ per determinatum locum motus, sed per totam arteriarum communitatem eiusdem tractio, & expulsio necessaria est, vt in obiectione quinta diximus. Non ad eius euitandam putredinem: quia vnumquodque in sua minera conseruatur sine alio motu; tūm ad hoc sufficit continua transpiratio, fumorumq; excretio; & si quidem aliquis requiratur motus, sat ille est, qui à continua partium attractione, consumptioneq; consequitur; tūm & iugis ipsius, ac spirituum ad varias corporis partes in occurrentibus animi, & corporis motibus transfluxus: nunquam enim vigilans homo quiescit, quin ad aliquid intendat Cor, & moueantur aliquæ corporis partes: vigilæ autem somnus succedit, vt possit homo sufficere, vt absumpti spiritus instaurentur, vt internæ coctiones melius perficiantur, vt partes inde omnes elaborato succo quietè fruantur. (quod enim caret alterna requie durable non est.) Non tandem ad recalcificationem sanguinis ab ambiente refrigerati, vt vellent alij: quia dum in vasis est, suum retinet calorem sanguis, extrahatus, in partis abit naturam, vel concrefcit; tum & in partibus tantūm externis hic haberet locum finis, quibus occurrit aer, non in internis, quæ mutuo calore fouentur; & tamen idem in omnibus, imò & in ipso Cordis ambitu supponitur motus. Quæ contra hanc obiectionem militant, & quæ pro ea sunt, infra, vbi rationes pro circulatione afferuntur, examinantur, & refelluntur, ne sæpius eadem repetantur, legi poterunt.

Insuper: Vel in Corde datur chyli in sanguinem conuersio, vel sanguinis circulatio, vel vtraque, vel neutra. Non vtraque; quia hæ duæ actiones, sibi inuicem contrariæ, & prorsus incompatibiles sunt: nam circulatio cum sit motus inquietus, retentioni, quæ quietem importat, opposita est, nec potest nisi tractione, vel pulsione, vel vtraque continua, & ordinata fieri: Coctio autem, cum alteratio sit, fugacem spernit motum, retentionemq; potius supponit, & mutuam actionem, ac passionem alterantis, & alterati. Quomodo ergo ambæ simul poterunt eodem tempore, & ab eodem exerceri subiecto? Sed & illo dato, non autem concessio, quomodo poterit Cor tot adstare, ac resistere munij, sanguinis coctioni, circulationi, cogitationi, animi passionibus? Non alterutra; tūm quia id esset contra Iuniorum ipforum dogmata, quæ in Corde, & sanguinem confici, & ab eodem continuè excipi, impelli; pro circulatione contendunt; tūm quia sanguificationi obstant, quæ in prioris Libri principio, & progressu rationes allatæ leguntur; circulationi autem, quæ nunc adductæ, & quæ plures adducendæ sunt; tūm quia rationes, quæ pro earum vna faciunt, alteram impugnant:

Obiectio
Ostendit.

Ergo neutra valet exerceri, sed quid medium ex vtraque refractum, coctio scilicet cuiusdam portionis pro sanguine arterioso, & spiritibus instaurandis necessariæ, eiusdemq; impulsio in omnes arteriacas regiones, vt cunctis calorem, vitamq; impartiatur partibus.

Ad hanc ob-
iecti onem
responsio.

Eiusdem dis-
solutio.

Respondet autem nonnullus, coctionem, vt quædam veluti generatio est, momento posse à valido Cordis calore perfici, & ideo non esse impossibile, vtrunque, motum scilicet, & sanguificationem simul esse: Sed fallitur sic respondens; primò quia huiusmodi actio propriè generatio non est, sed alteratio in qualitate, vt ait *Gal. 3. de sympt. cau. 1.*, cum non corrumpatur substantia, sed quædam solummodo accidentia immutentur; quæ ideo mutuam actionem, passionemq; agentis, & passi requirit, nullo modo in vnus ictu oculi habendam, quicquid dicatur de præuia dispositione in deferentibus vasis acquisibili, quorum temperies quantum in calore Cordis temperie remissior subsit, alia egere nequaquam probatione opinor; vt propterea talem in ijs dispositionem adipisci, quæ finalis ferè sit, & Cordis temperaturæ proxima desperandum censeam. Fallitur secundò: quia, etiamsi talis operatio generatio dici mereretur, neque in instanti haberi potest: præuia enim ad eam præparatio requiritur, non ab alijs, sed ab eodem generante inferenda; vtcunque sit de aliqua extrinseca adiuuante causa, vel præambula dispositione ab alio acquirenda; quia talis nunquam est, vt simile quid omnino generanti fiat, ni eiusdem sit naturæ.

Conringii
animaduer-
sio.

Sed verò hoc aduertens Conringius *cit. lib. cap. 34.* statuit, non singulo ictu, quod in Cor ingreditur ob diastolem, systole exire. Hæc porrò (inquit) elaboratio sanguinis non sit longa quadam temporis mora, sed exigua: aliqua tamen. Neque enim omnis sanguis, qui illabitur, siuè indextrum, siuè in sinistrum sinum tempore diastoles, proijcitur, iterum in systole: Namque id fieri non posse, arguit capacitas orificij venæ arteriosæ, & Aortæ longe minor orificio arteriæ venosæ, atque venæ Cauæ.] Huius alteram quoque assignat causam, quod sanguis ex auriculis Cordis in sinum elabens, quodammodo descendit, sensim post modum ascensurus, donec emittatur: At in hoc, quod verissimum apud me est, videat acutissimus Vir, quomodo Circulatio sua possit consistere: si enim quolibet ictu maior ingreditur quantitas, quàm egrediatur, clarum est, vel postea Cor ab attractione destitutum, in expulsi-
one preseuerans, vel ab vtraque cessaturum, vt coctio-
ni incumbat. Patet igitur, nec vtrique muneri,
nec alterutri irrefracto Cor incumbere. Iam
verò ad alias non infirmiores obiectiones
gradiamur.

Aetorquetur
in ipsum.

CAPVT QVARTVM.

Ostenditur causarum dicti circulatorij motus insufficiētia, & pro eo dispositi modi incongruitas.

N E C enim imbecilliora adhuc supersunt famigeratæ circulationi obstantia, ex quibus pronuncyū tantum asserre, delibero, ne in tædiosam longitudinem Capita abeant. Obstat igitur eidem non minus, quod nullum est dare mouens, quod vel solum, vel cum alijs cumulatū possit huic circulari motui vitam dare; nec modum, quo aptè is possit persistere. Et primò non sufficit Cor: quia dato, quod & attrahat, & consequenter expellat, solum id quo opus habet, vt & alatur, & spirituoso gignendo sanguini sit satis, trahet. (nil enim vltra suam quærit indigentiam); expelletq; id solum quo grauatur (: quid namque aliud, nisi molestans, eijcitur?) nec ea vi, quæ possit vsque ad extrema pertingere, ac multò minus, quæ valeat retrogressum in venas sic è longinquo iuuare. Cum nulla vis adeò efficax, quæ in tot flexuositates impingens, non frangatur.

Non secundò arteriæ: quia vel admittunt solummodò, & sic nil conferunt; vel attrahunt, nec impellunt, & sic vltra se nil operantur; vel impellunt nec attrahunt, & sic in se nil efficiunt, extra verò paruum habent efficaciam; vel vtrunque agunt, sed non simul: quia contrariæ hæc duæ actiones sunt, varijsq; fibris, & varijs conatibus gaudent; proinde non possunt, nisi consecutiue, vna scilicet actio post alteram considerari in arterijs, itaut in dilatatione attractio, in constrictione pulsio fiat, vel è contra: Sed, vt vt sit de attractione, pulsioneq; in genere, quæ procul dubio in arterijs adsunt, de ijs, quæ pro circulatione iuuanda requiruntur, summè dubitandum est, neutram in arterijs locari; non attractionem: quia, si omnes simul attrahunt arteriæ, quomodo ille solus à Corde exitus sufficiet, vt modicum quid omnes accipiant, quod pro implenda earum dilatata capacitate sufficiat? & sine tempore extremitates contingat? Clarum est, in diastole arterias omnes saltē semiduplò fieri latiores: quantum ergo sanguinis, ac spiritus ad hoc requiratur! & qua velocitate mouendi! Si verò non omnes simul, peristalticus, vndosusquè, non æqualis erit arteriarum motus. Non impulsione: quia, si simul omnes impellunt, cum longus, multiformis, & sæpè flexuosus sit illarum excursus, itaut illico non possit quid à caudice ad capillamenta ob mutuū expellendi corporis impedimentum peruenire; manifestum est, expulsionem non ad extremitates solas, sed & ad omnes anastomoses (& hæc etiam in truncis adsunt); imò & ad Cor ipsum fieri. Et sic inturbabitur venalis sanguinis motus; si verò non omnes, eodem modo vndosus, seu fluctuans arteriarum motus erit. Adde, neque Harueianos hæc actiones in arterijs admittere, qui putant,

Obiectio
nona.

Ad sanguinis circulationem peragendam non sufficit Cor.

Nec arteriæ sufficiunt.

tant, sanguinem sola cordis impulsione per arterias ferri non secus, ac si vasa ænea, lapidea, coriacea, in animata essent; imò & ex illo in partes impictu iuvari regressum in venas vsque ad Cor ipsum; quasi, & sanguis impictus, & passificta lapidei sint; & repercussionem efficientes. Quibus positionibus nil inuicissimilius poterat enunciari; Vt ex hoc multi ab Auctore descuerint; Et inter cæteros Conringius, ex venarum

» ligatura falsitatem illius opinionis venatus: cum videatur (ait ipse)

» ligata vena, sanguinem nihilominus ad Cor versus moueri; ligata

» verò arteria, etiam vltra ligaturam sanguinem ad membra fluere,

» & sic non solo cordis impulsu, qui tunc a vinculo citra dubium im-

» peditur.

*Non partes
ipsum sunt
tis.*

Non tertiò partes ipsæ: quia ipsæ etiam vel solum excipiunt; vel attrahunt, consequenterq; expellunt. Si excipiunt solum, clarum est, nil ad motum sanguinis collaturas; Si attrahunt, cum in eas non arteriæ solæ, sed & venæ inferantur, & utræque sanguinem contineant, liquet, non minus ab his, quàm ab illis eas attrahaturas fore; Tùm &

» non, vt expellant, sed vt alantur, fruuntur; Cum nihil in rerum sit

» Natura (ait Gal. lib. 3. de nat. facul. 6.) quod propter ipsum, vt sic

» dicam, trahere, siue trahendi functionem trahat; imò vt eo, cuius

» per tractum sit compos, fruatur: atqui frui eo non licet, nisi retineat. Tùm consequenter nec attrahent semper, sed quando indigent; non indigent autem, si iam potiantur, nec magis, quam possint conficere pro sui alimonia (omne namque naturale a non errante intelligentia ducitur.) Tùm nec sic validè, vt Cor, & viscera euincant. Si expellunt, non magis quoque in venas, quàm in arterias, videntur impulsuræ; imò magis in has, vt quæ dilatatione sua adhuc influuii possint præbere succo, suamque capacitatem non nullo sanguine, sed cedente spiritu refertam possident; neque sanguinem, quo aluntur, nisi ipsis grauis, vel molestus fiat (talis autem non erit semper); & sic neque continenter, sed vbi solum suæ satisfecerint egestati; nec ea efficacia, quæ extra se valeat in venis ceptum motum iuuare.

Non venæ.

Non quartò venæ: quia nullam habent in se sic trahendi, aut indescinenter impellendi occasionem, non trahendi, quia attractio, dempta vacui ratione, vel gratia fructuonis, vel similitudinis sit, ipsæ verò iam sanguine fruuntur, nec illo indigent. Non impellendi: quia sanguis ipsis familiarissimus est, & nisi sit vitiosus, aut copia exuperet, ipsis molestus esse non potest; & vbi sit, potius aperiendo ora sua, quam intra se, pellunt; & sic videmus per nares, os, anum, vterum, multoties salubriter sanguinem exire: omnis enim expulsio extra se, non ad intra per expellentem fit.

*Non simul
omnia.*

Non tandem dictæ partes omnes simul, tum, quia plurimæ exceptiones adductæ, quæ singulis obsunt, etiam omnibus iunctis nocent: Tùm quia vnaquæque harum partium ab alia situ, forma, temperie, & substantia differt, ideo etiam functione; Tùm non æqualis singularum potentia,

potentia, sicquē nec in vllam actionem communem ordinata habilitas esse potest; Tūm per earum singulas, præcipuē arterias, venasquē longus est excursus, propter quam mutua coadiuuatio inturbabitur eō, vt effugi non possit, quin ad earum singulam actio tota interdum incumbat, & sic vigeant contra singulas iam adducta obstacula.

Aliqui ad sanguinem ipsūm consurgunt, sic sperantes vniformi, & generali motui vniformem quoque, & vniuersalem adaptasse causam: Et sic ei motus facultatem tribuunt, tamquā animato, suisq; potentijs ducto: Sed hi omnium maximē decipiuntur. Primò quia nec sanguis viuit, nec quicquam perrepat, vt videre est in pelui, etiam statim ipso exhausto ē venis, nullum in eo ne minimum quidem motum obseruari; nec ab eadem rationali, vel sensitiua anima informari potest, cum à partibus omnibus seiunctus sit, non continuus; nec, vt liquor, corpus organicum est, cui possit ritē anima, quæ organo pro motibus necesse habet, adaptari. Secundò quia, etsi animatus esset, & ex se moueretur, non posset tali perenni motui se dedere: nullum enim naturale agens sine fine agit, esset autem sine fine motus, cui quies non sit annexa; nec minus circulari; quia nullum mixtum superat conditionem miscibilem; cum autem nulli elementorum talis motus naturaliter inest, nec sanguini, qui ex elementis constat rectē adscribi potest. Tertiò quia nec vllum animatum corpus in gyrum naturaliter mouetur, ergo nec sanguis.

Sed nec est assignare modum, quò aptē dictus possit circularis motus subsistere: Etenim ad hunc non valet æquipondium tūm quia hoc in animalibus non valet, in quibus nec grauitas, nec leuitas quicquam primario operantur; Tūm quia nec in casu datur, cum maior semper sanguinis copia adsit in venis, quā in arterijs; Tūm quia, etiam si daretur, sanguinis arterialis raritas, leuitas, caliditas, ac spirituositas opponitur quodammodò densitati, grauitati, tepori, ac corporeitati sanguinis venalis, itaut, si in illo fugacitas, in hoc otiositas, si in illo volatilitas, in hoc fixatio, & si in illo celeritas, in hoc segnitias rationabiliter debeat præualere; quæ quomodo ordinato motui quadrent, iudicet quiuis distarum causarum, & motus speculator egregius.

Non sola valet attractio tūm quia hæc propriē ad fruitionem, alitionem, vel vnionem, non ad motum, non ad fugam, non ad separationem videtur à rei natura ordinata: motus autem continuus hæc in se videtur includere. Tūm illa videtur validiorem energiam in attrahente, quā in remittente, seu permittente, quæ in casu nec habetur, nec haberi potest; illud quidem, cum nulla pars Corde in trahendo validior sit, ipsumquē qualibet validius, multò; hoc verò, quia in circulo pars attrahens simul sit remittens, remittens, attrahens. Tūm illa supponit terminum motus, ad quem res trahatur; in circulo autem nullus terminus, nullus finis; sed omnia finis, omnia principium.

Non sola pulsio: quia hæc auersionem in pellente significat, violentiamq; in impulsio: at neutrum in partibus animatis versus familia-

Nec sanguli-
ni ipsi mo-
tus adscri-
bendus est.

Ad talem
motum non
valet æqui-
pondium;

Sole attra-
ctio ad fru-
itionem
non valet.

Neque sola
pulsio;

riissimum,

riſſimum, & alimenticium ſuccum debet ſupponi. Item hæc validiorem ſupponit, & exigit impellentem partem recipiente, ac admittente, & hoc nec in caſu habetur, nec ritè, admittitur. Non illud; quia Cor validius quolibet alio impellit; quare ad recipiendum ineptius: non hoc; quia, vt dictum eſt, in circulo nullum impellens, quin fiat recipiens, & e contra. Item hæc ſupponit originem motus, nimirum ubi pellens conſiſtat: at nec in circulo hæc habentur, cum nullibi origo, nullibi meta.

Neq; vtraq;
ſimul.

Neq; ambæ
alternatim
poſſunt.

Non vtraque ſimul: quia attractio, & pulſio motus contrarij ſunt, igitur à contraria cauſa, ergo nec ſimul in eodem ſubiecto, & eodem proſus tempore eſſe poſſunt. Non tandem alternatim, vt aduerſò ſupponitur, ſingula iſtus parte: quia, vt dictum eſt, quies intercedere debet; diaſtoles autem, ac ſyſtoles, tùm in Corde, tùm in arterijs ſic breui tempore completur, vt plerumque interſtitium ſenſu indiſtinguibile ſit: hi ergo motus, vt iſtantanè, poſſunt quidem tractionem, pulſionemue aliquam alternatim inducere; at non eam, quæ tùm reſpectu materiæ, tùm quantitatis, tùm lationis, ad circulationem totius ſanguinis perenniter repetitam requiritur.

De congru-
entia ſanguis
motu in Cau-
a ambigetur.

Rurſus non videtur, quomodo in Caua, quæ è directo à Iecore aſcendit ad Cordis dextram auriculam, ac inde, ſolo in eius dextrum ventriculum aperto foramine, iſdem fibrarum duëtibus rectis, tranſuerſis, ac obliquis, eademque cavitatis reëtitudine, ſine valvulæ vllius obſce, ſuſum continuatur uſque ad axillares; poſſint duo contrarij motus excitari, nempe à ſuperioribus ad inferiora, & ab inferioribus ad ſuperiora, itaut in Cor ſanguis vtrinque moueatur; niſi ponamus, vel ſine Cauæ tractione, ac pulſione ſanguinem ab ipſo Corde attrahi, vel à Cauæ ipſius foraminato circulo in illud impelli, ac reliquam ex vi vacui ab omnibus ſuccedere partibus. Sed vtrunque eſt incongruum, & irrationabile: Nam quomodo Cor ager indiſtans contrarijs motibus, impellendo ſcilicet per arterias, trahendo per venas? patet quippè, quicquid in remotum agit, per inuiſibilem, ſpirituofamq; qualitatem, vel ſubſtantiam quandam agere, à qua contrarios motus cieri, impoſſibile eſt: ſi enim ſympathica ſit, attrahet quidem, vt magnes ferrum, non pellet; ſi antipathica, pellet, non attrahet. Quod ſi dicamus Cor trahere à Caua, & ab alijs vi vacui ſuccedere (de pulſione ſat ſupra dictum eſt), quæ Naturæ diſpoſitio, vt ſemper violenter à venarum ramulis omnibus ſanguis rapiatur? Si autem illud Cauæ foramen impellere dicatur, fruſtra impellet, ni ſubito alius ſuccederet ſanguis, iterum impellendus, qui ſi ſuccedat, iam in dictum incidimus violentum ſuccèſſum. Integra ergo remanet obiectio, quomodo per eandem Cauam ſanguis poſſit contrarijs motibus agitari, vt tamen nec inferius, nec ſuperius ſine vlllo obice ſiſtatur à ſuo motu ſanguis vterque, ſcilicet aſcendens, & deſcendens, & in Cor deſſectat.

Quandam ſolutionem aſſert Galtrucchiuſ, quam tamen ſolutam in fine

hæc Libri, ubi huius Auctoris seria ponderantur, ac effringuntur obiecta, inuenies.

Hermannus Conringius lib. de sang. generat., & motu cap. 41., & 42., volens causam exquirere ad circularem motum suscitandum, & manutenendum idoneam, ac sufficientem, respuens in primis omnes ab Antiquis morui sanguinis in animalibus adscriptas causas, tum & solam redarguens Cordis pulsionem ab Harueio habilem putatam, proindeq; concludens, necessarium, & attractionem requiri; utranque ingeniosè quidem in Corde disponit: nimirum pulsionem ex valida eiusdem contractione in systole exerceri, stabiliens; attractionem verò ex eiusdem met exuperante calore, qui vndique à venis trahat, deuenire, arbitratus. Eo scilicet modo, ut in arterias sanguis pulsione feratur, à venis autem calore iterum ad Cor alliciatur; Quas quidem, ut insufficientes putatas, iuvari, credit à grauitate, & leuitate sanguinis, & à fuga vacui; videlicet grauitate iuuante descensum præcipitem in arterias descendentes, & a venis superioribus in Cor; consequenter autem ascensum in arterijs superioribus & in inferioribus venis, per out aquæ, aut alterius succi descensum per ductum aliquem, aut syphonem videmus ascensum parere in ductu alio ad eandem prioris altitudinem ascendente: Leuitate verò, à calore illi præstita ascensum in Aorta superiore, & Caua inferiori accelerante; Sicuti, & vacui fuga operante, ut succo præterfluenti contiguus alius succus indecipienter succedat.

Verum enim verò tot cumulare causas, easq; inuicem contrarias videtur in naturalibus absurdum: Vtunque enim esset, quod ab eadem causa possent duo contrarij effectus prodire, vnus quidem illorum erit per se, alter verò per accidens, sicut Sol diei, ac noctis; grauitas descensus, & ascensus: At quod vnum, & idem possit contrarijs operari modis causisud, contrariisq; edere effectus per se, hoc nullibi apud Philosophos inueni: quomodo ergo in vno grauitas esse, & secundum illam operari potest, quod simul leue sit, & per leuitatem agat? iuuat sanguinis grauitas descensum suum in Aortam descendentem per se, per accidens autem ascensum in inferioribus venis ad Cauam; iuuat pariter eodem modo descensum suum in superioribus venis ad eandem Cauam per se, & per accidens ascensum in Aortam superiorem: quomodo concipiemus exinde, eundem sanguinem leuitate sua, sibi à calore præstita, coadiuuare per se ascensum, qui fit in superiorem Aortam, & in Caua inferiore, per accidens autem descensum, qui fit à superioribus venis in Cauam ascendentem, & Corde in descendentes arterias? Enim verò, vel grauitas in sanguine est, vel leuitas: Ergo vel secundum illam, vel secundum alteram operabitur.

Gratis autem dabantur hæc: sed si exactè res perpendatur, inuerisimillima est illa comparatio sanguinis per venas, arteriasq; delati ad aquam per canales, & aqueductus efluentem. Primò quia in hac consideratur aquæ motus secundum suam naturam, per quam, ut grauis,

Idem opus
non respicitur

Exemplum
aquæ, in ductibus fluentis, sanguinis morui improprietate iam.

deorsum abit per decliuem locum, huncq; inanimatum, & qui nil, præter datum transitum in ipsam agit. Secundò in descensus, vel ascensus sine durum, ac solidum corpus adest, in quò influens impingitur, & sic retroagitur succus. Terriò in dictis aqueductibus, si ascensus aliquis descensui interponitur, non ille subitus, vel retrogradus, sed paulatinus, & cursum suum prosequens; Quæ omnia contrario modo in fluente se habent sanguine: nam hic, vt actualiter calidus, & in viuientis corporis facultate positus, secundum grauitatem suam, aut leuitatem minimè operatur, vel mouetur, sed à viuentibus, ac animatis partibus vehitur; in fine descensus, vel ascensus non in duram illidit substantiam, quæ icùm valeat retroagere, sed in porosam, spongiosam, & potius allicientem, quàm reflectentem; & per retrogradum deberet motum incedere, nimirum per venam arteriæ coniugem, & vbiq; contiguam, vt proinde, solo vase remisso, contrarium omnino iter illi esset peragendum. Ex quibus, nisi decipiar, constare, arbitror, improporionatam arguitionem illam esse, à grauitate labentis aquæ desumptam.

Gravitas, leuitasq; circulationem nõ promouent.

Sed & amplius, incongrua est dicta grauitatis cum leuitate associatio pro circulatione promouenda: quia, (data etiam comparationis congruentia) si grauitas iuuat in Aorta inferiore, & Caua superiore descensum, cur non, & in Caua descendente, & in superioribus arterijs? eadem enim decliuitas in omnibus est. Vel si leuitas iuuat ascensum in Aorta ascendente, & in Caua inferiore, cur non similiter in ascendente Caua & in Aorta inferiore? Idem in eodem corpore, & per eadem vasa quomodo non idem efficit? Adde, in animato corpore, cuius positus ad libitum variat, non benè decliuitatem, vel planitiem, descensum, vel ascensum describi, ac determinari: Non benè igitur grauitas, leuitasq; inter causas circulationem promouentes reponuntur.

Additio caloris inter causas circulationis incongrua.

Eadem incongruentia sequitur constitutionem caloris vt i cause attractionis, & constrictionis arteriarum, per quam sequatur expulsio: Etenim si ob id calor systoles causa est, quia spiritus agit (verius eleuat) fibras insitos, à quibus validata & pulsifica vehementer constringat, & sic pellat, cur non eodem modo, eandemq; ob causam tum Cor, tum arteriæ dilatabuntur, & sequetur attractio? frustra igitur additur attractioni, & pulsioni Cordis calor; cum vel sufficiat duas illas statuere circulationis causas: quarum tamen insufficientiam supra tetigimus) vel solum calorem, tanquam ambarum causam, adducere: nam si dixerit, à calore per accidens sequi expulsionem, hoc est per systolem; non minus per accidens ab eodem sequitur tractio, hoc est per diastolem, aut aliquam sanguini aditam qualitatem calori consecranteam.

Vacui fugam à circulationis causa ableganda.

Non iuste minus vacui fugam à causarum circulationi adscriptarum consortio ablegabimus, si dicemus primò, hanc in corpore circumquaque aeri, spiritibus, humoribusq; peruio inutiliter tineri, imò nec dari: manifestum siquidem est, facilius aerem, spiritumq; in locum educi corporis subsecuturum, quàm sanguinem. Secundò nec in molli ductu,

& facillimè concidente. Tertiò nec in animato, cui æque retinendi, ac pellendi, vel attrahendi facultas indita sit. Quartò nec in eo, quod, succo plenum, illum non extra semittat, sed in se contentum à supra infra, ab infra supra agitet. Quintò nec in rationali animante cuius formæ dignitati non parum detrahitur, si vacui timore eam induci dicamus ad inutilem sanguinis gyrationem; cum ei sufficiat motum sistere, & corpus alere. Sed & alijs ferijs iuribus huiusmodi causarum Conringiana cumulatio à D. Gaspare Brauo refellitur *Resol. Medic. part. 3. dispus. 1. resolut. 11.* Vt propterea hic pluribus non sit opus.

CAPVT QVINTVM.

Alia admittenda circulationi oppositiones fiunt, & earum solutiones adductæ superantur.

NON minus eidem Circulationi obstant ij circuitus, qui in doloribus capitis, oculorum &c. quotidie, vel alternis diebus, vel per longiora intervalla observantur; sicuti, & in febribus quotidianis, tertianis, & quartanis tam intermittentibus, quàm continuis. Nam si circulatio fiat, clarum est, sàkèm quotiè circulationis motus perficitur toties cum sanguine humorem morbificum ad affectam partem, vel ad Cor rediturum; imò maior, & generalis circuitus particularem deberet atterere: quomodo enim quiescet humor in venis, si totus sanguis movetur? aut quomodo in parte, si per eam continuus sit sanguinis ab arterijs ad venas transitus? Et si hæc obstruata supponitur, cur poterit aliàs, & non cum circulato succo illum movere? Ut verò hanc objectionem effugiant, variè se contorquent circulationi fauentes, se tandem in hunc angulum conferentes, esse huiusmodi res præter naturam, & ætuncque lateat specifica illorum circuituum causa, non tamen perinde fieri, quin circulatio subsistat. Bona quidem verba, & quæ, si de circulatione constat, acceptari merentur. Illud verò disputatur, negatur, & per hæc, quæ ob stare videntur, contenditur. Motus quippe humorum ille est, etsi morbosus, naturalis tamen; nec per vim, sed à Natura peractus; nec extra venas semper, sed per venas ut plurimum, per arterias non rarò; nec pravi humoris tantum, sed & magis sanguinis, vel vitiosi, vel exuperantis. Quibus omnibus, nullo externo addito, nullavè mutatione extrinsecus adueniente, quomodo possit, si delationi reductio, & reductioni traductio per circulatorias leges respondet, vita dari, intelligi minimè potest, nec ab vlla causa circulationi attributa suaderi. Quicquid autem sit, ex hoc proinde arguitur, circulationem minimè necessariam, quin sine ea homo possit consistere, cum intermedio accessionum tempore liber ea in parte à dolore degat homo, & febre vacuus, nullumq; ex his aut paruum vitæ periculum impendeat, item nec sic ab impulsu Cordis trudi sanguinem, quin, & partium recipientium, &

Obiectio 4^a
simè.

Quid ad ill
responden-
tiam.

Eadem re-
sponso in-
fringitur.

vasorum tùm deferentium, tùm receptantium actio requiratur præcipuè; tùm & circuitus humorum, si qui in homine sensu percipiuntur, præternaturales esse, partium parere affectiones, earumq; diagnostica parare signa.

Obiecto
vudicina.

Reijcienda
in responsio

Alia respon-
sio confusa
est.

Tertia re-
sponso re-
siliuit.

Obiecto da-
medicina.

Obstant autem, & cutis efflorescentiæ, exanthemata, erysipelata, phlegmones, varices, scabies, aliaque tùm sanguinis, tùm humorum exiturarum genera: quia, si circulatio fieret, nil horum persistere deberet, sed solum cundo fieri, redeundo euanescere: si enim venæ id habent, vt sanguinem, ab arterijs ad membra delatum, in Cor reuocent, cur inibi illa firmantur? Nec possunt dicere, vitiosos humores esse, ideo non trahia venis, tùm quia iam ipsi fatentur, non trahione sola, sed & pulsione simul, vel etiam hac sola circularem perfici motum; à vitiosis autem succis magis pultrix excitatur facultas: tùm quia plerunque æstuentes, & ab exuperante calore attenuati huiusmodi humores, magis ad motum apti, & proni videntur: tùm quia aliquando sanguis copiosus quidem est, sed probus, vt in phlegmonibus, & varicantibus quibusdam venis: Nec rursus valet dicere, non redire ea propter aliquā obstruktionem: cum in huiusmodi corporibus, ac membris, siuè hæc phlebotomia, siuè ligaturæ adhibeantur, eadem experimenta proficiunt, & recurrentis (vt putant) sanguinis obseruentur, vt in alijs. Signum, si à talibus phænomenis sanguinis reditus probatur, etiam in ijs fieri, nec impediri; vltra quod, si reditus impediretur, daretur autem aditus continuus, in molem intolerabilem omnes abirent abscessus. Nectandem vrget responsio: non valere exempla corporum ægrotantium ad sana. Primum, quia, si tali responso nostra elideretur obiectio, necessario omnis Neotericorum istatim corrueret innovatio. Cum quodlibet suæ opinionis fundamentum consistat in experimentis factis non in ægris tantum, sed & agonizantibus ipsis. Secundò corpora huiusmodi propriè non semper ægrotant, sed aliquando adhuc valent, vel in crisis conualescunt, vel neutra sunt. Tertiò siuè sanum, siuè infirmum sit corpus, si circulatio sit, sanguis circueus omnia secum trahere deberet: necessario autem, si datur naturaliter, perseuerare habet: quælibet enim siuè naturalis, siuè vitalis actio aboleatur, vel in toto, vel in membro, illius interitus est, vel dubio procul appropinquat. Præter quod, si pulsus est circulationis origo, & fundamentum, illo in talibus existente, & hæc persistere debet.

Obstat in super ea, quæ in quibusdam partibus, earumq; venis fit collectio residui nutrimenti, vt in mamma lac, in testibus semen, in glandulis albus succus: si enim circularetur, qui sanguis partibus superest, cur in ijs illa exuperantia? & cur ex maiori mora maior quoque horum succorum copia congeritur, vsquequo Natura lasciuens eos extrudat per naturales earum ductus? manifestum enim, quod ibidem stagnare non deberent, sed recurrere, si modò omnium venarum proprium est reducere versus cor sanguinem ad partes ipse arterias transmissum.

Enim

Enim verò, si quid aliud, obiectum hoc summè circulationem deprime-
re videtur: Propterea huic dupliciter obveniunt pro ea pugnantes: Pri-
mò namque negant nonnulli, & inter cæteros Deusingius, Bartholinusq;
ex sanguine lac fieri; sicuti, & alij inter quos nuperimè Pallierius,
semen: sed ex chylò immediatè procreari contendunt. Secundò vasa
lac deferentia, continentiaq; vti & semen, inter veras venas non con-
numerant, sed alterius generis tubulos opinantur. His positjs, qui pri-
mum, ac secundum tenent, facillimè se ab his exbrigrant obiectis: si enim
non ex sanguine, neque in venis illa collectio, nec quicquam contra cir-
culum operatur. Qui secundo soli inhærent, ad naturam partis, quæ
illam succum ex sibi adueniente alimento coaceruare studet, reliquo
succo per venas circulari permisso, confugiant hoc fieri, asserentes citra
circuli infractionem: Atuerò contrà sensus ipse est, qui, vt Veteres Ana-
tomici vnà cum Vesallio, & Faloppio literis tradidere, venarum axilla-
rium, & feminalium illas respectiue soboles esse, iudicat; & euentus,
qui docet, per sanguinis missionem lac, semenq; non solum minui, sed
retrahi ad spatularum, lumborumq; venas; lac nonnunquam ex re-
pentino timore, mærore, & iædia à mammis abire, & ferè cum mu-
lieris querela, & dorssi grauitate euanescere; papillarum suctui nimio,
violentoq; coictui sanguinis excretionem, loco lactis, ac seminis subse-
qui. Se de his, Deodante, in sequenti Libro ad vnguem disceptabitur.

Ad eam re-
spondetur.Responso
deijcitur.Obiecto de-
climatertia.

Amplius: Multi videntur in corpore sanguinis, ac spirituum motus
contrarij circulationi ipsi, & inter se: Ergo ista non datur. Antecedens
probatur ex eo, quod homo diuersis animi passionibus tam ob fortunata,
quàm ob aduersa fortis accidentia, quotidie subiacet; gaudio scilicet,
mærore, iræ, amoris, odio, pudori, timori, horrore, spei &c.; item & alijs
corporeis, simulq; animalibus passionibus dolori, horrore, somno, con-
cupiscentijs venereis, alijsq; similibus affectibus, per quos videmus ma-
nifestò, sanguinem non magis spirituosum, ac arteriacum, quàm veno-
sum, volare, ne dicam moueri, modò ad Cor, modò ad exteriora, nunc
ad varias, nunc ad determinatas partes; Quod non fieret, si circuitio da-
retur, eo modo maximè, quo supponitur, nempe quod arteriæ hoc ideo
pullent, quia impleantur, vt vtres, ac sanguis per eas impulsu Cordis
feratur. Videmus ergo, in gaudio ad oculos, genas, os, ac in totum
corpus statim sanguinem expandi, per lachrimas, rubicunditatem, ri-
sum, titillationes, gesticulationes partium. In timore, ac terrore san-
guinem è contra, ac spiritus intro se recipere, ac concentrari, itaut ani-
mus langueat, tremant artus, pallefcant omnia, & frigus inuadat am-
bitum, nec ligatæ venæ turgeant, nec tunicæ effundant; In ira sanguinem
circa Cor ebullire; feruere ideo spiritum; furere artus; oculos, os, ma-
nus quodammodo conuelli; pulsusq; augeri; In mærore, odio, amore
sanguinem inibi si mari, macerari, extenuari, quod dignoscimus ex
cordis palpitationibus, demissionibus, & interturbationibus pulsus, par-
tium palliditate, virium languore &c. In pudore mirum, quomodo sic
statim

statim conuolet ad genas sanguis, & inde statim retrocedat. In horrore demittitur pulsus, anima contremiscit, spiratio confunditur, calor aufugit, robora languent. In somno item ex sanguinis, spirituumq; inter-
natione clauduntur sensus, otiantur membra, iacent omnia, exteriora pallent, frigent, silent. Sed quid de impetu Veneris? in quo cuncta titillant, turgent, vrgent, angunt, languent, tandemq; flarescunt. Quæ, & quot mutationes in his omnibus raptim eueniunt? Quas contrarietates circa hæc subito non experimur in dies? Consequentia ergo clara est, cum facillimè hæ metamorphoses eueniant, arterias nulli ligatas esse sanguinis, ac spirituum determinato motui; sed vt occasio, ac animus fert, imperat, hos moueri, retrahi, restitare.

Conringij ad
illam respon-
sio.

Huic obiectioni occurrit Conringius *cis. lib. cap. 43.* Summaq; suæ responsionis in hoc consistit, quod, constituto, perpetuum illum circula-
rem dari motum, hos verò etiam peculiare motus verissimos esse; di-
cendum est, ab his peculiaribus generalem non impediri motum, sed
potius eiusdem varias esse differentias, itaut simul possint, & generalis,
& particularis motus consistere; Et varietatis causam esse, quod arteriæ
aliquando minus deferant, venæ autem referant magis; vel aliquando
plus arteriæ deducant, minusq; reducant venæ. Id vero modò in toto
contingere, modò in aliqua parte; sicuti nec impediri, quin, & per
quoddam tempus in parte aliqua ceilet modò afflusus, modò refluxus,
modo vterque.

Resoluitur
d. 1. responsio
duplici-
ter.

Sed videat solertissimus Vir, ex suis hypothesibus, & natura rei, di-
stas rationis metas non subsistere: Prius autem notandum est, Ipsum
sub conditione responsionem deducere, itaut, cessante illa, hæc simul
corrui, sit necesse. Cessat autem conditio: quia nulla ex suis, alio-
rumuè rationibus, sensationibus, illationibusquè, quibus prætendant
perpetuum illum circula rem motum arguere, ac probare, ad hoc suffi-
ciens est, vt iam commonstrari cæptum, & melius commonstrabitur
infra, vbi contraria soluentur argumenta. Constat deinde commenta-
tionem suam non subsistere. Primò ex natura rei: Si enim hoc ideo cir-
cularis motus admittendus est, quia arteriæ sanguinem ad membra de-
ferant, venæ autem recipiant, & quod membris superest, ad Cor repor-
tent; manifestum est, simul esse non posse, vt illæ operentur magis, hæ
autem minus, vel è contra; cum vnum ab altero dependeat indissolubi-
liter: Quia non possunt arteriæ plus deferre, quin, & a venis plus reci-
piant; nec venæ plus reducere, quin plus excipiant; vltra quod pauca
in idibus motus, vel ex superfluitate attracti; vel ex defectu transmissi
cessaret. Secundò ex suis positionibus: quia si calor Cordis magis tra-
hit à ventis, magis quoque mouebit, impelletq; in arterias, cum a calore
efficacia, spiritus agitante, motus fibrarum proueniat per Ipsum; Si ca-
loris debilitas minus impellit, minus quoque attrahet, siuè dilatationis
medio, siuè aliter attrahere calorem, ponamus. Idem dic de grauitatis,
leuitatisq; ab Eo posita cooperatione: nam si grauitas minus iuuat
arteriarum

arteriarum ad inferiora motum, minus etiam venarum ad superiora, cum à proportionē vsus sequatur, & alterius motus (ex suis positionibus) viuacitas. Sic si leuitas iuuat ascensum, & descensum quoque valdiori percussione iuuabit. Satiū ergo, vti diximus, fuit, Naturam nulli alligatam motui esse, vt posset occasionibus datis occurrere, vel accedere ad libitum, non intermissa interim ex adhærente, & imbibito succo nutritionis actione.

Insuper: Cum sanguis per sentientes corporis partes fertur, pruritus calorem, inquietudinem, parit: Ergo signum, non solere ipsum ea continuè tenere vestigia alioqui ab assuetis non sit passio. Probatur antecedens, quod in dictam causam referuntur æstuationes, agitationes, pruritus, ac similia cutis accidentia. Huic autem obiecto respondebit Conringius, hoc ideo non per carnes ipsas, sed per anastomoses, talem translationem ab arterijs in venas fieri, à se positum esse: Cui tamen positioni nec sua defunt inconuenientia, vt in quartæ obiectiōis vindicatione dicebatur. Aliquis autem pro Harueio reponeret, sanguinem, si naturalis sit, ea non pariturum symptomata; vbi autem talia persentiantur, sanguinem aliquo vitio laborare: Verū talis responsio inualida: quia, etiam naturali sanguine existente, talia aliquando eueniunt à copia, vini potu, animi commotione, labore, ac similibus, quæ sanguinem solum commouent, non vitiant. Ergo si talia saltē motionem indicant, signum, ni præter naturam commoueatur, vel copia exuperet, tale ab ipso non teneri iter.

Obiectio decimaquarta.

Conringi exculatio. Non valet.

Alia responsio.

Inualida monstratur.

Item tū venæ, tū arteriæ, ex Anatomicorum, & præcipuè Vessalii doctrina, totæ ex fibrarum triplici genere intertextæ sunt, scilicet rectis, transuersis, & obliquis, quarum vltimæ præsertim retentioni inseruiunt, sic ipso tradente Auctore, & alijs, potissimum Gal. 3. de natur. facul. 11., & 5. de vsu part. cap. 11. Essent autem frustra, si in continuo motu sanguis esse deberet, vt in circulatione ab Auctoribus nunc figurata fieret: Sed Natura nil frustra. Ergo &c.

Obiectio decimaquinta.

Contra hanc tamen obiectiōem illud est, quod ex Faloppio assert Guernerus Rolsincius dissertat *anatom. lib. 5. cap. 13.* (prout, & Conringius *cap. 41.* confirmat); nimirum venarum fibras pro mero earum munimine, minimè autem pro sanguinis adiuuando motu inferuire; Quorum ratio est, duplicem ex Auerroe *lib. 7. Phys. com.* 10. esse tractionē (sicq; & pulsionem, & retentionem), vnā propriè dictā, & vniuocè, per quam quid ad se, vel ad aliud trahitur, & in qua velocior est motus mouentis, quàm moti; aliam verò analogicè, seu æquiuocè, per quam quid sic disponitur ab alio, vt, illo immoto, hoc ad se moueatur, sicuti de magnete ad ferrum, de ambra ad paleam dicitur: neutro autem istorum modorum inferuire videntur fibræ illæ. Non primo; quia dictæ venarum fibræ nec mouentur, vti videmus illas æsophagi actualiter deglutiendo, sicut, & intestinorum egerendo moueri; nec possunt reapse moueri, cum adeo inter se contextæ sint obliquæ, rectæ,

Neoterisorum contrasitio.

Ne verò tri-
aspide velo
recunditur,
de primò.

& transuersæ, vt nullæ illarum moueri possint, quin simul aliæ mouean-
tur. Tùm etiam, vt ex carnes, potius in potentia sunt, quàm actu.
Non secundo; quia sic nò minus dicentur trahere obliquæ, quàm rectæ,
non magis hæ, quàm cæteræ partes omnes, ad quas alimentum pertin-
gat. Verum enimverò huiusmodi responsionem faciliè retundere pos-
sumus, dicendo primò, non de futurum fuisse Naturæ modum tunicam
illam, sine tot fibrarum intertextibus, muniendi, vt in membranis mul-
tis obseruatur, nisi ex voto ei fuisset, ijs ad aliquid vti. His autem soli-
tam esse pro motibus vti, omnes Anatomici tùm in musculis, tùm in
vasis permultis, ad excretionem dicatis, vt sunt intestina, vesica, uterus
&c. liberè admittunt: quæ autem similia sunt, similes edere actiones,
par est. Nec valet, eas carneas, siuè musculosas non esse: nam & huius-
modi eæ sunt, licet crassiores, (vt ait *Gal 3. natur. facul. 11.*) quæ in
intestinarum tunicis, vtero, vesica, alijsq; in partibus obseruantur;
quemadmodum nec obest, quod actualiter eas moueri, non conspiciatur:
quia venæ vasa parua sunt plerunque latentia, vt ideo lentè, & obscurè
moueri in tractionibus, & pulsionibus possint, absque quod per nos illud
obseruari ad sensum valeat; nec tertio quod se mutuo sint impedituræ;
quia Natura mirabilis, & sine Doctore agit ea, quæ ne sensui quidem,
sed nec intellectui constant, prout circa motum in Corde vndiq; fibroso,
motibusq; continenter contrarijs obnoxio videmus: scit enim illa ad
otium aliquas appellere fibras, cum alias ad opus excitat, has incitare,
illas fræno cohibere, pro sui cogniti finis adeptione.

Secundò;

Dico vltèrius, vt à venis pro nutritione propria æquiuoce succus
aliquis trahatur, non deesse tamen illis vniuocam tùm tractionem, tùm
pulsionem, quæ omninò ijs pro publico obeundo munere necessaria
sunt: si enim venæ canales sunt sanguinis, benè arbitrandum, Naturam
eis potentiam indidisse illam, quæ delationis, & retentionis suæ officio
contingit: si verò potentiam, cur non instrumenta? Et cur ad pom-
pam ea putantur data, quæ, oculis minimè conspicua, latent sensus,
solosq; solertes non effugiunt Artifices? Aliter quid different à non vi-
uentibus animata, ab artificialibus naturalia?

Tertio;

Additur tertio, non minus oblituram hanc tractionis, pulsionisue
venalis carentiam ijs, qui perennem in sanguine motum pro circu-
latione præferunt, quàm nobis qui temporaneum, & omnige-
num. His verò concessis, concedenda necessariò est, & reten-
tio, quæ obliquis adscribitur fibris; cum cæteris operantibus,
nec operatio sit deneganda his, quas non frustra Na-
tura addidit: siquidem non esse ad pellendum com-
paratas, quod non transuersim, sed per lon-
gum constringere sint potis, vltro cuili-
bet persuaderi potest.

CAPVT SEXTVM.

Adduntur alia obiectiones ad dictam circulationem elidendam, & additæ responsiones refelluntur.

NEC hic obiectionum finis: aliæ enim non ignobiliores sunt, ex quibus sequens una est: Vnaquæque pars viuens, si vivere debet, alicione indiget, quæ consistit in assimilatione, agglutinationeq; assimilatae substantiæ ad alicam partem. Hæ fieri non possunt, nisi competenti tempore, mutuaque actione, ac passione aliti, & alimenti, quod præcipuè sanguis est. Ergo non in continuo motu sanguis esse debet, sed in quiete aliquando manere, ne alendi corporis actionem subterfugiat. Nec valet dicere, in transitu partes in se ipsas trahere, quod placet: quia si per ipsas partes sit sanguinis transitus, vt Harueio, cum partialium nonnullis placuit, hoc dici non potest: quorsum enim vnio, si ambulat vniendum? Si verò vnitur, quomodo motus? quod si transitus fiat per vasorum coniunctiones, magis multò difficile erit, & à naturæ ipsius sagacitate abhorrens, à moto, fluenteq; succo sibi consonam selligere portionem, quàm à quiescente.

Obiectio de
circularitate.

Videatur Gal.
lib. 1. de
facul. 1.

Hinc ideo Conringius *cit. lib. de sang. gener.*, & *motu cap. 38.* quamvis per arterias alimentum in partes delabi statuat; non tamen immediate ab ipsis, sed à venularum extremitatibus, aliquantisper quiescentibus, subministrari, opinatus est: Huius tamen enunciationis instantia infra in responsionis ad vltimam obiectionem factæ, ponderatione detegitur, hoc solum pro nunc tacto, sic necessarium fore, arteriarum fines omnes in venulas inferi, ac finiri, quod à nullo Anatomicorum dictum, aut dicendum arbitramur; cum non minus arteriæ, quàm venæ in cutem oblitterentur suisq; hiatibus intro spirent aerem.

Conringij
diffugium.

Dissoluitur.

Præterea: Plures partes manifestè repugnant, redarguuntq; dictam circulationem sanguinis: Ergo nec fit. Et probatur antecedens; quod ideo fit circuitio (sic elicit Harueius); quia sanguis ad partes peruenit copiosior, quàm pro alitione absumant, qui idcirco in venas reassumitur, vt iter iteret versus cor. In plurimis autem hoc non posse fieri, videtur: quia quod ipsis superabundat, vel in suis cavitatibus conseruant, vel educunt, vel in quandam sibi congenitam substantiam transmutant, vel crebris suis motibus, ac laboribus absumunt; Sic mammæ (vt supra in obiectione decimasecunda dictum fuit) in lactantibus, & gravidis, quod superfluit, in lac transmutant, in cauernulis suis detinent, & per papillas excernunt; Testes ex affluente sanguine semen gignunt, in tubulis suis reponunt, & ad tempus eiaculant; Adenes, quod ex nutritione superest, in suis venulis, & cavitatibus album conseruant, & cum debillimi sint, non illud repellunt, sed vel sudoris modo dissolunt, vel etiam suppurati disrumpuntur, inaniantur.

Obiectio de
circularitate.

fluum est, excernit toties, quoties opus est, itaut nonnullis menstrua bis quolibet mense fiant; nonnullis per plures menses, & annos continuè aliquid euacuetur; sanis autem omnibus semel in mense per plures dies sanguis emittatur; Hæmorrhoides, ac anus, si aliquid superfluit sanguinis, statim periodis educunt, vt multis vtrinq; per intervalla cernitur; Os, quicquid superabundant, in saluam mutat, & expuit; Cerebrum per multiplices canales se exonerat, nervos irrorat, & in spiritus plurimos se diffundit; Caput autem totum non raro salubriter per nares suam sanguinis plenitudinem deponit. Sic intestina, mesenterium, renesquæ superflua in adipem conuertunt, seq; circumsepeliunt; Ossa in medullam nutrimenti superabundantiam mutant, ac seruant. Sic partes, quæ in motu continuo sunt, tum spiritus, tum sanguinem conterunt, & absumunt; vnde pulmo, & pectus, sicuti in perpetuo versantur motu, continuo quoque egent refocillamento; Cor, arteriæq; similiter sanguinem atterunt, & spiritus dissoluunt; Brachia, cruraq; extra somnum, vt plurimum mouentur, & sic omne alimentum digerunt. Cutis tota porosa est, & omnia sibi superflua, vel sensibilibiter, vel insensibiliter eijcit, vel in pilos vertit. Venæ tandem sanguinis propriè continentia sunt, nisi quæ nimis turgcant, vel vellicentur, à se illum non pellunt. In paucissimis igitur partibus hæc fieret circulatio, & ideo melius dicendum, non fieri.

Quid à contrarijs respondetur.

Eadem responsio repetitur.

Sed verò quibusdam, cum nullum aliud subterfugium subest, non incongruum videtur, posse in quibusdam partibus proprio ipsarum instinctu sanguinem firmari, & concoqui, sicuti, & in alijs præter naturam retineri, generali circuitu prosequente: Sed si talis valeat admissio, si bene examinetur res, ad paucissimas circulus reduceretur partes, quod esset incongruum. Alij cum maius rationis pondus in lacte, & semina agnoscant, non solum negant, ex sanguine ea fieri, sed & in venis alterius generis, nempe lacteis asseruari eadem, volunt. Verùm hoc supra refutatum est &c.

Obiectio de-
circulatu.

Vltcrius: incompetens illa videtur via, quæ ab Harueio, & cæteris circuenti sanguini designatur: Nam neque arterialis vena arteriæ venali, neque Aorta sua capacitate respondet Cauæ osculo triplo latiori, quàm osculum suum sit, vt docet *Vesal. lib. 6. de corp. hum. fabr. cap. 12.* hæc verò arteriali venæ æquetur, vt ait Conringius. Et tamen res potius è contra esse deberet; nimirum capaciores esse vellent, quæ à Corde recipiunt, quàm quæ in ipsum immittunt, si verum est, sanguinem in Corde rare fieri, & spirituosum veluti eleuari, dilatariq; vt Neotericorum multi tradunt. Arterialis item vena, quæ à pulmonis motu nunc dilatatur, nuuc perstringitur, non videtur Cordis ictibus paritura, si in huius pulsione ab incumbente restricto pulmone ardeatur; nec in venalem arteriam impulsura, si pulsu caret, & constrictione non nisi per accidens in pulmonis compressione, ideo longe rariori, dotatur. Venalis item arteria, quæ aeri inspirato potissimum excipiendo à

Natura

Natura dicata est (quamuis nec sanguine priuatur), neque potest tanto circuitui incumbere: si enim per suas inconspicuas porositates sanguinem continenter excipit, quomodo aerem? si hunc, quomodo illum? Sufficiat ei id, quod pro sui alimonia, integritateq; requiritur, posse trahere, non vltra. Ventriculus Cordis sinister, & ipse dextro angustior, ut confitentur omnes, speciatim *Vesal. cir. lib. cap. 11.* qui tamen ferè omnium voto calidior, spirituumq; fucina, sanguinis parum conuinet, rarefacit, & in spiritus conuertit. Ideo *Conringius cap. 34. iam &c.*, veritati inserviens, fatetur non omnem sanguinem, qui in diastole Cordis ventriculos ingreditur, in systole proijci: namque id fieri non posse, arguit (inquit) capacitas orificij venæ arteriosæ, & Aortæ longè minor orificio arteriæ venosæ, atque venæ Cauæ. Sed quæ absurda inde sequentur! Si enim introitum non æquat exitus, & id in singulo accipit istu, quid de reliquo introgresso fiet? totum a Corde absumi, inconsumum est. Sed si nunc magis, nunc minus ingreditur, quid est, quod istum numeretur, & amplificetur quantitas?

Conringij
exceptio.

Reijctus.

Obstant vltimò plura absurda, quæ, data tali circulatione sanguinis, necessarîo in sequuntur. Quorum primum est, Cor omnigeni sanguinis, & excrementitij succi receptaculum facere, itaut, vbi animæ sedes præcipua, vitæ thesaurus, origo spirituum reposita fuit, angiportus, expurgatorumq; omnium fermè sordium constituat. Cui frustra obueniunt Neoterici, dicendo, sicut lux, ignisq; non coinquinantur à fæcibus, ita nec animam, nec spiritus inquinandos impuro sanguine: nam longè distat mortale, & vndique alterabile corpus ab incorruptibili anima, & inuincibili Sole; momentaneus calor, à lucidissimo igne: sicut enim quodlibet, vel leuissimum vulnus, veneficus odor, phlegmonis principium Cordi mortem minantur; leuissimisque animi motibus, vel putrium vaporum ab vtero, ventriculo, & intestinis eléuatione, spiritus languent; quid ab inquinorum omnium contactu, ingressu, congressuq; expectandum fuerat? fateor, animam, quæ incorporea est, ab his minimè sedandam; sed benè dixerim, vel illam fore fugandam, vel illius sedandos esse mores obinquinatorem spirituum.

Obiectio de
cimanona.

Primum est
circulatione
absurdum.

Huic frustra
obueniunt
Neoterici.

Secundum est, arterias, quas ventriculi omnium vitalium spirituum, purissimi sanguinis receptacula, natiui caloris moderatrices, vitæq; in totum corpus delatrices Natura præfecerat, & quas ideo ferè vbique reconditas voluit, ut ab iniurijs melius custodirentur; inquinamento- rum omnium ductulos, vrinæ canales, sudorum semitas, faculentorum succorum viacula ad vterum, renes, lienem &c. statuere. Huic occurrit *Conringius cir. lib. cap. 38.* dicens, quod, quemadmodum alius aliquis calor optimè fouetur oleo, aut sebo, etiâ si eorum nonnullæ portiones in fuliginem abeant satis crassam; ita nec calor vitalis inficitur, aut corrumpitur, vt quædam cum sanguine sint commista minus pura, & quasi fæculenta: Sed hic considera, Lector, nùm flamma lucida adeo, & purgata, à sebo, vt à cera; ab hac impura, vt à nigida; ab oleo

Secundum
absurdum.

Huic Con-
ring. occur-
rit.

Sed falsum.

amurcato, vt à perfectò, à ligno viridi, vt à sicco eleuetur. Flammulæ scilicet vita nostra rectissime assimilatur, cui si nitidum subieceris pabulum, lucida, & ipsa virescet; si verò excrementosum, fumida vndique, & infecta flammescens, spiritus verò fuliginosos, infectos, fumosos emitter. Calor quidem fouebitur, sed non temperatus, & humanarum, nitidarumq; actionum parens: verum vel præternaturalis, vel ferinus: siquidem à nullo alio distinguuntur humani à ferinis moribus, & natura (prætermissa formali causa, anima nempe, cuius actus specificam differentiam progignit) quam à qualitate natui caloris; cuius pabulum sanguis, cuius exhalatio spiritus est, immediata animæ tum rationalis, tum sensitiuæ ad omnia exercenda munia dicata instrumenta.

Spigelij de
eius argui-
tur.

Nec est, vt apud eundem Conringium rideat Spigelius eos, qui veretur, ne spiritus vitalis ab excrementis humoribus contaminetur: quia potius ridendus ipse est, si putat eosdem spiritus à puro, ac ab impuro sanguine generandos. Si incorporei spiritus essent, ab ipso aliqua ratio vigeret: sed cum corporei, quidni iuxta materię qualitatem puri, vel impuri fiant ad exempla fuliginum supradicta? Consideretur, quam animi tristitiam, vel etiam quandoque lypothimiam pariant à solis aluinis retentis facibus, vel transeuntibus diarrhæis eleuati vapores, & quid ab ijs, qui per arterias, & venas sic transirent ad Cor, sit expectandum, eliciatur.

Peritum ab-
surdum.

Tertium est, venarum bipartiri naturam, vt scilicet alia firin truncis, alia in ramulis: Qui enim omnem nutritionis materiam per arterias partibus offerri, tenent, tenentur quoque asserere, non immediatè ab illis mobilibus, & inquietis nutriri, sed à capillaribus venis, in quas quiescentes sanguinem alentem arteriæ deponant. Rursus, & qui sanguinis effluxus omnes, & excrementorum eiectiones arterijs demandant, fateri coguntur, non immediatè per eas, sed per venarum ora fieri, vt, omnibus perpensis, statuit idem Conringius cit. cap. 38. Cuius sententia his verbis describitur. Quamuis verò per arterias affluere omnem nutrimentitium sanguinem, asseramus, non tamen probabile videtur, ex arterijs proximè carnes, aliasque partes nutriri; Nimirum in quiete quadam opus est ad vltimam partium nutritionem: qualis tamen in arterijs fortè nullibi conceditur. Affluit quidem ergo per arterias sanguis omnis: at in venis minoribus, in quas ex arterijs transit, potissimum quiescit, atque exinde partibus in nutrimentum proximè suggeritur. Et in fine capitis sic: Obseruandum est, etsi affluxus excrementitiorum humorum omnis per arterias fit, non tamen etiam effluxum per eas contingere. Imò verisimile est, eos, qui secundum naturam sunt, effluxus, apertis venarum orificijs, fieri, eo quod solæ venæ videantur ad extrema partium hiare: (hoc tamen perperam dicitur), arteriarum sinibus per anastomoses cum venis coniunctis. Cuius absurdi vim, & efficaciam agnoscant, quæso, circulationis fautores: Si enim per eos sanguis omnis ad maiores

venas

venâ à minoribus peruenit, qua lege perueniet, si in his potissimum quiescit? Et quid est, quod alia natura in his, alia in illis sit? eadem corpora, simul continuata, diuersas habere functiones, mihi inuerisimile est, nec tale quidpiam siue in arterijs, siue in venis, à quoquam fuit vnquam, aut vsquam agnitum. Sed si hoc sit (quod maius est), qui fiet circulator sanguinis prætenfa? vnde à paribus attrahetur, si non per venas? Sed & si arteriæ ad extrema non deueniant, in venasque terminentur, quid ad Moebium, qui, vt nunc nunc dicitur, opinatur, depurationem sanguinis partim fieri per arteriarum extremitates in os, ventriculum, intestina, & cutem vniuersam inbiantes? Sed de hoc plura cap. 9. dicentur.

Quartum est, negare (instar Asclepiadis à Gal. cit. lib. 1. de nat. facul. 13.) vel confundere expiationem sanguinis ab excrementitijs succis: quandoquidem in corde, & propè ipsum nullum esse vas expurgatorium, nemo non habens admittit; totum sanguinem remeare ad hepar, per arterias, quid impossibile est, siue ab impulsu sanguinis dilatentur arteriæ, siue ex se sanguinem vehere habeant; cum per totum corpus dispergantur, & vnica ad hepar veniat; totum item ad renes peruenire, & ad lienem, inuerisimile est; cum Aorta à Corde exiens bipartiat, & æqua lance in omnes corporis partes ramos expandat, trunco suo per corporis truncum æqualiter diducto. Nec est, vt conetur Conringius suadere, sanguinem feriosum renes petere, biliosum hepar, atrum lienem, hæmorrhoides: hæc enim partitio incompatibilis est cum illo impetuoso sanguinis à Corde in arterias traiectu à se laudato: Si verò quis recurreret ad attractionem harum partium, nimis longinqua earum regio à Corde est, nec possent illæ ad superiorem Aortæ caudicem pertingere tractione. Quare Gotofredus Moebius Epitome Institutionum Medic. cap. 12. statuit, sanguinem depurari in pancreate, quibusdam per vterum, aut hæmorrhoides, omnibus verò per os, nares, aures, & per arteriarum extremitates, siue in fauces, siue in ventriculum, siue in intestina, siue ad cutem terminentur. In his autem aduertat dexterrimus Auctor summam, quæ nihilominus in sanguine imperfectio remanet: nam si per Eum chylum per pancreas in receptaculum Pecquetianum, siue in glandulas lumbares se colligit, vt per thoracicum tubulum ad Cor sanguificandus perueniat (sic tradit cap. 11.) leuissimam à pancreate purificationem chylo aduenturam, cogitandum est tum ob moræ minimum; nam raptim chylum transire, supponunt, vt viæ angustia celeritate pensetur; tum ob partis naturam glandosam, quæ ad excrementa potius excipienda, quam expianda idonea est; tum ob eius exiguitatem tanto negotio imparem; tum ob præuentionis importunitatem, cum in corde per eum sanguificatio celebretur. Cæteræ autem depurationes omnes inopportuna sunt, & vt vulgo dicitur, post pastum veniunt; nimis enim post partium nutritionem, post arteriarum transitum. Adde, & peculiare esse illarum partium, quæ nominantur, expurgationes, nisi

Quartum ab
surdum.

Conringii
soludo tolli-
tur.

Moebii de-
puratio im-
perfecta.

criticè

criticè ad totum expurgandum illas natura instituat, vt in mēstruis, hæmorrhagijs, diarrhæis, & similibus, quæ à nostro casu quotidianæ depurationis longè absunt. In summa per eos vnicuique parti competit excrementorum omnium expiatio. nullo generalis operationis requisitæ respectu; quasi verò, sicuti dan tur communes alimentorum officinæ, non eadem lance debeant impuritatē, quæ per generalem coctionem emanant, secretoriâ assignari loca.

Quintum
abscidum.

Quintum est, nesciri sic, quomodo febres typhicæ, & Epialæ gignantur, & possint consistere? Si enim in earum vna vruntur interna, quod ex lingue nigritie, vhiæ ardore siti intensa, & corporis nudatione dignoscitur; quomodo si adest pulsus, per quem transmittuntur (vt aiunt) torrefacti humores ad cutem, exteriora frigeant? Si autem in altera externa calidissima sunt, intus autem refrigeratio sentitur, cur, si venæ ad cor calefactus humores reuehant, non calefiunt interiora quoque? Vel ergo non impellitur in priori à corde calefactus sanguis ad extrema, vel non reuehant venæ frigida ad intus; sicuti in secunda aut non impellitur frigidus succus ad exteriora, aut non calidus ad interiora retrahitur? Quicquid enim de statu præternaturali excogitetur, non poterit excusare, quin; si in sanis, non detur etiam in ægris vitalibus, & quibus idem, vel imò frequentior pulsus est, circulatio, cum qua neutrum eorum posset subsistere.

Sextum ab-
scidum.

Sextum est, nullos in corde, & arterijs moraturos sic esse spiritus, sed actum genitos in partes diffundi: quorum tamen tanta vis est, vt, ijs dissipatis, cessat vita, solvatur anima, corpus intereat. Et prior patet consequentia: quia si impulsu cordis sanguis velociter excurrit ad extrema vsque, qua fouea spiritus, qui fugacissimus est, latitabit; quin totus rapidissime excurrat? Scio igitur non ob aliud in dubium vocari spirituum existentiam ab Harueio; in quo tamen à suis sequacibus derelinquitur; cum omnibus inficiari displiceat, ad vitam spiritus requiri, & in homine plurimos morari, sola ratione, licet non sensu ob illorum tenuitatem; igneamque raritatem cognitos; quorum existentiam, si non ab alio, ex hoc certam tenere possumus, quod in nil aliud repetinam ex animi affectu mortem, syncopem, vel hyporhymiam referre possumus, quam in spirituum dissipationem, vel suffocationem, à subita expansione, vel restrictione seu concentratione pronatas; vt ideo non raro solis vaporosis halitibus reparentur: cita enim deperditio, citaq; reparatio substantiam prorsus volatilem, non crassam, non hærentem arguit.

Haruei dis-
fugium ex-
tinguitur.

Quam con-
stitutionem
Veterum
cum Neote-
ricis incir-
culatione ex-
cogitauerit
Gasp. Bra-
uo.

Plura autem ex his absurdas videtur e medio tollere Gasp. Brauo Excellensissimus in suo *Resolut. Medic. Volumine, lib. sen disputat. 5. resolut. 11.* Hic enim celeberrimus Auctor, circulationi contentiens, à Veterum verò lucidiori doctrinâ minimè abhorrens, studuit rem quoquo modo componere, admittendo, fieri quidem Harueianam circulationem, negando verò, sanguinem per arterias moueri mero Cordis impulsu, vt Harueius cum Coringio, & alijs statuit, sed verius à facultati-

bus attrahente pellenteq; gradus vegetatiui; Id quod viriliter probat primò ex Galeni, Veterumq; vniformi doctrina; Secundò ex natura nutritiæ facultatis, quæ suas necessariò ministratrices postulat. Tertio ex proprietate viuents corporis trahendi vile, pellendi inurile. Quarto ex clusione cæterarum, quæ ab Haruicio, & sequacibus designantur causæ: Nam contra Harueij impulsione plurima concludentia opponit; contra Conringij cumularas causas caloris, vacui, leuitatis, grauitatisuè non minora, nec minus seria; itaut superuacuum sit eis quicquam addere, vel minuire. Et sic non videntur currere multa ex dictis absurdis: quia si partium tractioni, ac pulsioni motus sanguinis impunitatur, trahet vnaquæque, quæ suæ naturæ conferent; pellentur, quæ displicent, nec dissipabuntur spiritus; cum ex alia illius *resoluit. 12.* spiritus a Corde pellantur; & ad Cor redeant per vim systolis, ac diastolis iuxta occasiones coctionum, somni, animi accidentium &c.

Sed bona illius pace, non est, vt, ijs seculis cauis, speret Vir Excellentissimus Circulationem manutenere: Vt vt enim sit de causis motus sanguinis in genere, (de quibus secum profusus sentio); pro circulando ipso, atratrix, & expulatrix potentia vegetatiui gradus omnium viuentium partium minime satis erunt: quia vti potentia naturales, ordinatissimæ sunt, nihilq; superflui admittunt, nisi vt necessitatis tempore, vel ad vsum aliquem communem loco, ac tempore inferuiat; Sed in hoc circulationis negotio nil horum concurrit. Non respectus ad necessitatis tempora: quia supponitur, non in partibus ipsis trahentibus asseruari superfluum, sed continuè migrare, ac remigrare, accedere, & recedere. Non ad vsum communem: quia pro hoc sanguis ipse, & illius presentia facit, non illius motus. Si autem quis dixerit, esse ad vsum communem ex parte Cordis, dicitur, dari etiam in his determinatam quantitatem, & eam, quæ necessitati communi sit satis. Sumit ventriculus sanus superfluum sui ratione, sed necessarium tantum ad totius alicionem, & in ea quantitate, quæ reficiendo toti sufficiat. Sic & Iecur attrahit, & sanguificat non indefinenter, sed quoad corporis indigentia, & dissolutioni instaurandæ sit satis. Sic ergo de corde dicendum: attrahet enim, quod opus, non ad superfluitatem: Vel namque sibi trahit, pellitq; vel toti. Si sibi, patet, non magis, quàm opus, attractorum, pulsorumuè, & sic non continenter; Si toti, vel quod eius sentiat egestatem ob omnium partium suctum, vel naturali ductu non errantè afficitur. Si primum, partes plenæ non fuent. Si secundum sufficere quantitas siuè ad alendum, siuè ad viuificandum necessaria, non nauseabunda saturitas.

Eadem de pulsione viuents corporis meo iudicio ferenda sententia est, eam scilicet non frustra, nec superflue in sanis ad actum duci; quo sensu accepta, ad circulationem non sufficit. Sed de hoc abundè discipratum, & assertum est supra cap. 4.

Neque valent rationes à perspicacissimo Viro adductæ (quæ aliàs

Reprimis
talis conclu-
sio.

Attractio, &
pulsio vege-
tatiui gradus
pro circula-
tione non
sufficiunt.

Soluentur o-
bustem ratio
pro

pro nutritione statuenda optimè valent): quia iam prima pro nobis est; cum omnium Veterum sententiæ de causis motus sanguinis agunt, prout ad nutriendum dirigitur, nullibi autem pro circulatione, vel alio indefinente motu statuendo. Secunda item, cum non minus nutritiæ facultatis ministra sit retentio, sicuti, & coctio, quàm tractio, pulsio: illæ verò quietem important, non motum, vnde à circuli causis hæ ablegandæ, & per consequens illæ. Tertia adhuc magis pro nobis est; cum attrahatur vtile non vt subito pellatur, sed vt propriæ inferuiat alitioni; pellitur autem inutile, non vt alteri oneri, vel inutili aduenienti, seù quærendo pars se subijciat, sed vt ab omni se subleuet. Alioqui quid referet traxisse, si abijciatur statim, pepulisse, si aliud subito trahatur? Quarta quoq; similiter: quia seclusis omnibus alijs causis, hæ etiam ipsidem rationibus secludendæ sunt. Ablata enim nutritionis causa, nil est, quod ad attrahendum partes viuentes naturaliter excitet; dempta inutilis grauitate, vel noxijs molestia, nil est, quod ad pellendum easdem inuictet.

Eiusdem
Auctoris cõ-
ditionate lo-
cutio.

Equidem, cum sic viriliter viderim, Virum hunc peritissimum infestari ibidem Harueij, & Conringij præcipua fundamenta, nimirum motus causas, non potui non opinari, illum pro circulatione sic, & in quantum sentire, quasi diceret, si detur circulatio, nullam aliam causam, præter attractionem, & pulsionem, nutritionis famulas, iuridicam esse; id quod, & ipse libenter fateor, nisi quod eam minimè dari contendendo. Similem autem coniecturam, præter dicta, adauget illiusmet loquendi modus multoties conditionatus. Nimirum eodem *lib. resol.*
 „ 8. hæc habet: Resoluendum primò, quod totus sanguis fertur ad Cor
 „ propter circulationem, & ob vtilitates, quas in illa consequitur. Sic
 „ omnibus in confesso esse debet, qui sanguinis circulationem admit-
 „ tunt.] Quæ verba quis non videt conditionata esse? ac si diceret non
 „ teneri admittere. *Resolut. 9.* sic loquitur: Resoluendum primò, quod
 „ sanguis, qui perficitur in sinu sinistro cordis, & spiritus, qui generantur
 „ in illo, simul trudentur in Aortam: Sic admittentes spirituum
 „ vitalium generationem, simulq; sanguinis circulationem, debent
 „ fateri.] *Resolut. 10.* sic: Resoluendum, quod omnis sanguis repertus
 „ in venis communicatur illis per arterias, & per anastomoses transco-
 „ latur. Sic tenendum, admissa sanguinis circulatione.] In his verbis
 „ quis non facile agnoscit conditionem quandam, quæ adesse possit, &
 „ abesse? Non tamen negem, illam ab ipso clarissimè admitti: Cuius
 „ tamen rationes, si quæ intactæ remanent, vndecimo, & decimosexto
 „ tangentur capitibus.

Septimum
absurdum.

Nunc verò horum Gasparis verborum occasione nata, nolo septimum prætermittere absurdum, in quod circulationem acceptantes incidunt; fateri scilicet, omnem sanguinem in venis repertum ab arterijs venire. In id autem nescio, quomodo tanti Viri sic oscitanter incidant, & hi maximè, qui sanguinem in iecore generari, lata sustinentur fronte,

fronte, vt facit dictus Brauo *Resol. Medic. par. 1. disput. 5. sect. 1. resolut. 6.*, ac alibi, sicuti, & *Conring. cit. lib. cap. 10.*, & *Rolfine. dissert. anatom. lib. 6.*, & 7. alios multos referens, inter quos non pauci ipsismet lecoris venis sanguificationem attribuunt: Si enim vera hæc sunt, prout, & in primi libri principio visum, probatumq; est, & à lecoris venulis in Cauam, à Caua in Cor, ab hoc in arterias transluit vel totus, vt ipsi volunt, vel pars tantum, vt Galenici sustinent; quis, etiam cæcus, non conspicit, a fontibus in riuos, non à riuus in fontes, motus, ac originis principium assumendum? Dato enim (non autem concesso) ab arterijs in venas totum sanguinem remeare, si rectum adhibeatur iudicium, non hæc mutatio, sed redditio, non concessio, sed retributio erit. Cui veritati lucem addit modus quo sanguis in Embryum ingreditur, qui est per vmbilicalem venam in secur, Cauam, & Cor: quamvis nec in hoc desinit, qui non sanguinem, sed chylum ad Embrium peruenire autumant, de quo inulitato dogmate tertio differetur Libro.

Scio equidem, nec deesse supradictis verbales euadendi loculos: dicunt enim, in hepate chylum aliquam tantummodò ruditatem sanguinis acquirere, perfectionem autem ei totam a Corde obuenire, & idcirco optimè currere sanguinem (hoc est perfectum) ab arterijs in venas deportari: Sed hæc mera figmenta sunt, & à veritate ipsa aliena, quæ docet, & oculis ostendit, sanguinem optimum in lecore generari, talemque ab eo in Cauam tum ascendentem, tum descendenter propagari, & ab his tum Cordi per latum osculum, tum arterijs omnibus per anastomoses, tum & vniuersis corporis particulis per innumeros earum ramulos, & capillares horum extremitates participari, ab ijsq; mutuo retribui, prout sæpius dictum, & dicitur non semel. Vt iam in eam verè liqueat, in Arte nostra.

Retrogrado passu dogmata cuncta labi.

CAPVT SEPTIMVM.

Probatnr vltcrius, non dari sanguinis circulationem.

Obstant igitur supradicta omnia, & alia nonnulla, quò minus tam famigeratam circulationem admittendam esse putem; quæ quamuis singulariter omnia non demonstrent, nec per se singula irrevocabiliter concludant: multa tamen seiunctim, eòq; magis simul iuncta omnia, adco certam apud me demonstrationem pariunt, vt nefas existimem ab antiquissima medicorum, Philosophorumq; omnium opinione fallaces ob qualdam experientias, facile conuincendas, recedere: Nam, vt aiunt iuristæ Quæ singula non probant, simul vnita, perfectionem inducunt *Gratian. discept. foren. 138. num. 19.* Verùm nec alia adhuc deest ad dictam circulationem expiodendam demonstratiua ratio. Et est huiusmodi.

Pro circula-
tione capla-
denda argu-
mentum.

Si naturaliter daretur sanguinis circulatio supposita, aliquo vel sensus, vel rationis argumento in sano corpore ostenderetur: Sed nullo aut sensus, aut rationis argumento in tali ostenditur. Ergo nec datur naturaliter. Patet maior: quicquid enim in natura est, vel iudicio, vel sensu coniicitur, aliàs fantastica, vel supernaturalia habentur, quæ à nobis comprehendere minimè possunt. Solùm ansa aliqua dubitandi circa minorem videbitur adesse, ut quæ negationem continet, probatu impossibilem, nisi loco, & tempore sit restricta, ut Iuristæ loquuntur. Ast hic, dum loco, nempe venis, & tempore; (quod quodlibet sensui manifestum continet interstitium, motum à perennitate seiungens) optimè restringitur, facillimè eius veritatem demonstrare licet.

Contraria
experimenta
de integro
animali, vel
de motus pe-
rennitate nil
concludunt.

Suppono igitur primò, omnia experimenta tum Harueij, tum sequacium, vel nil de integro, ac sano animali, vel nil de motus perennitate, aut actu spontaneo concludere. Non primum; quia multa, quæ ab ipsis proferuntur experimenta, per viam anatomem eliciunt; & sic in scisso, & agonizante animali, quod quantum à sano, & integro distet, cuilibet notum. Non secundum; quia quæcunque alia per ligaturas, incisiones, pressiones, tandemque per vim corpori illatam eliciunt, nil aliud, quàm præsentaneum ostendunt motum, illumque violentum; qui à naturali dupliciter distat, vel ratione oppositi, nimirum, quæ sursum naturaliter tendunt, deorsum per vim commouentur, & è contra; vel ratione temporis, scilicet motus naturalis ordinatus, commotus, violentus inordinatus, præceps: is ad metam peruentus, quiescit; hic vel quiete caret, vel violenta potitur, vel à naturali motu refrangitur.

Et præsentaneum quidem; quia ablata ligatura, & incisione occlusa, motus cessat, exitus retinetur, tumor residet, coincidentia resurgit; Violentum verò, quia partes à naturali statu semouentur, & dolore, calore, seiunctione, compressione, diuisione, tensione afficiuntur. Cætera autem, quæ indicij, & coniecturis eliciunt, vel fallacia sunt, vel æquè contra reiorquuntur.

Et iudicio.
sum absen-
tia negatur
circulatio.

Ijs itaque omnibus seclusis, prout infra per nostras responsiones secluduntur, restat, ut quæ alia dictum circulem, ac perpetuum motum possent quoquo modo ostendere, indicia, abesse, ostendamus, ut sic inconcussa maneat propositio, quod nullo sensus, vel rationis argumento ostenditur circulatio.

Non ad-
venarum mo-
tum.

Et primò non adest venarum actualis motus; & tamen in Philosophia certum est, nullum mouens naturale mouere immotum, ut ex *Arist. 3. Phys. tex. 8., & 16.* Illum verò non adesse, & ocularis inspectio, & tactus in venis exterioribus denotat, & ipsimet Harueiani fatentur. Neque hic obijciant, partes alimentum tranere, & tamen non moueri sensibiliter: quia aliud est motus aliti, aliud fibrarum; aliud alimenti, aliud circuli sanguinis: is enim insensibilis est ob exiguitatem, & contiguitatem, & ratione sola comprehensibilis: hic verò sensibilis; quia velox, & per caua corpora, ut in excretionibus, deglutationibus, digestionibus, cructatio-

eruentionibus, fluxionibus, arteriacis motuationibus, pectoris dilatante, comprimenteque motu, & videmus, & sentimus. Is forsan æquiuoca tractio est ad fruitionem, & vnionem, quæ immoto attrahente, celebratur, vt in magnete respectu ferri; hic autem potius vëctio diceretur ad solum transitum, quæ nunquam, vehente immoto, accidit.

Nec sanguinis ipsius motus continuus in præfatis venis cognoscitur sensu exteriori: etenim, siue intentè aspiciantur, siue attentè tangantur venæ, quæ nonnunquam in summa manu, aut pede gracilibus turgidæ, subliuidæ, & in candidis ferè lucidæ sunt adeo, vt in ijs contenti succi perreptatio, si fieret, nullo modo lateret; ne quicquam tamen intus moueri aut visu, aut palpatu dignoscitur. Non interiori sensu, cum hominibus nil de huiusmodi motu continuo in se ipso perferat, & tamen catarrhos descendentes, fluxionesquæ alias ad partes determinatas non rarò percipiat. Non ratione tandem in sano integroque corpore: nam si aliqua diætarum venarum summæ manus, vel pedis siue vngue, siue alia subtili, re comprimatur sic, vt claudatur cavitās, nihil tamen versus digitos turget, nec versus lacertos inanitur; quorum quidem vtrunque fieri deberet, si suppositus fieret continuus sanguinis motus. Sed & ligetur totus carpus lato funiculo, ac si salua tellam tundere vellemus, videbimusquæ, aliquantisper quidem statim ex ligaturæ expressione versus fines suos venas in summa manu turgere, nil magis progressu inflandas; supra verò ligaturam nil imminui easdem, siquæ; si altera deinde in gibbero ligatura fiat, eas itidem statim turgiores inter duas ligaturas euadere, siquæ feciantur, sanguinem projicere. Quod verbum statim elidit simulatam transfusionem per arteriarum anastomoses in venas; Et quo experimento clarè cognoscitur, eis ligaturam venas non inaniri, vt vellent circulatorij motus amantes.

Non rubor perpetuus in toto corporis ambitu conspicitur, qui sanguinis præsentiam comitari posset, ac deberet (: color enim similis efflorescit humoribus, nisi retrocesserint, ait Hipp. primo de humor. 1.) cum multi candidi, alij triticei, alij plumbei, alij nigri (vt Aethiopes) naturaliter videantur, ruborque in pluribus solum genas, labia, papillas &c. comitetur. Posse autem, vel debere ad rubicundum cutem vergere, si talis fieret ad extrema per arterias iugis affluxus, cui libet constet, qui sciat, in externis partibus innumeras arteriarum, venarumque fines inferi, & omnigenè insinuari; & præcipuè si, vt opinatur Harueius, sanguis non per anastomoses, sed per carnis, & partium poros ab arterijs transfunderetur in venas: Videmus siquidem, ex affluxu sanguinis ad cutem rubigines, phlegmonosa erisipelata, & rubicundos ignes enasci, qui per dies etiam integros perdurant, etiamsi pulsus adsit, & vehementior; quod signum est, affusum sanguinem vel non remigrare ad interiora, vel continuè nouum effluere: sic ergo etiam fieret, si in naturali statu talis sanguinis perpetuus fieret accessus.

Non quartò continuus calor in tota corporis circumferentia similis,

Non sanguinis perreptatio.

Non corporis rubor.

Non conti-
nens, & a
qualis calor
in toto.

Non corpo-
ris motus co-
tinuus.

Antiqui ve-
ritas circa
sanguinis mo-
tum.

Alteri ad-
dem ratio
à totius Or-
bis propor-
tione desum-
p. 6.

Tertia ratio
à Naturæ or-
dine in om-
nibus serua-
no.

ac vniformis perſentitur; qui tamen deberet iugem eiſdem ſpirituofi ſanguinis acceſſum, contactum, ac tranſitum comitari; cum dantur cor-
pora, quæ ſana cum ſint, frigidiuſcula foris ſentiantur, ſicuti & plurimis
volæ manuum, ac pedum calidiores alijs multis partibus obſervantur.
Sic & in ſomno totum corpus frigidiuſ extat, vnde largiori indiget ope-
rimento; quod prouenit, quia in eo natiuus calor cum ſanguine intrò, &
ad ima ſe recipit, vt docet *Ariſt. 2. de parti. ani. 7.* & idè etiam pallidius
obſervatur. Non tandem continuæ agitationes, aut corporis perpetuus
adeſt motus, qui videretur poſſe continuum ſanguinis, ac ſpiruum cir-
culum ſequi, vt qui, præcipua ſunt omnium actionum, ac motuum in-
ſtrumenta: quia ſaltèm in ſomno animal omne quieſcit, & ab omnibus
motibus otiaſur perſæpè liberaliter.

Cum ergo indicia hæc omnia, quæ in ſano, integroq; corpore poſſent
quoquo modo perennem ſanguinis motum à centro ad peripheriam, à
peripheria ad centrum, arguere, abſint; iure concludere poſſumus, dictâ
ſanguinis circulationem non dari; ſed imò per venas ſanguinem quietè
deferri ad Cor, & ad ſingula membra, vt ex eo commodè alantur, vtquè
ab ijs arteriæ ſimul cum Corde ſubtiliorem attrahere ſanguinem per
anastoſes vbique intercedentes, & per cauæ oſculum reſpectiue poſ-
ſint, ex quo non ſolùm alantur ipſa, ſed & per continuum pulſationem,
reſpirationemq; ſpiritus tùm vitales, tùm animales perſiciantur, qui ad
vniuerſas particulas cum ſubtiliori ſanguine delati, foueant, & irrorent;
moueant, & viuificent; robovent, & ad omnes adiones adiuuent.
Hæcque certior veritas eſt, à primis vſque ad nouiſſima ſæcula dima-
nata, auctoritatibus fulgiſſimis roborata, rationibus ſuffulta, & expe-
rimentis confirmata.

Et ſic omnis, quam homo cum toto Orbe congruentiam, vt micro-
coſmos, habet, requirere, ac præſcribere quoque videtur: Sicuti enim in
illo, pro totius machinæ complemento, non ſolùm decurrentes hinc
inde fontes, riuus, & flumina ſufficiant, ſed Oceanus etiam, & Maria, &
Lacus, à quibus dicta mutuare, & ab irrigatione ſuperfluas retribuere
aſuas, credimus, ac videmus, requiruntur, & adſunt; ità & in humano
corpore non ſolùm motus antes, & quoquò deferentes arteriæ, tamquàm
labentes riuus, & flumina ſubſunt; ſed & Caua, Porta, earumq; venoſa
ſoboles, quæ veluti Maria, & Lacus, cruorem ijs vbique ſubminiſtrant,
reciprocum recipiunt, quietumq; in ſe continent, niſi quatenus vel irri-
tantur à tempeſtatibus, vel ab ijs attrahunt partes, & flumina reddunt.
Sicuti ergo vanum eſſet aſſerere, vniuerſas Oceani, & Mariæ aſuas in
flumina, ac fontes per vnicum ductum abire, & in eadem circulariter ab
his redire; ita meo iudicio vanum eſt, putare, vniuerſum venarum ſan-
guinem per Cor in arterias fluere, ab hisq; ad venas periodicè remeare.

Sic etiam rerum ordo, qui tam arctè in omnibus ſuis operibus à Natu-
ra affectatur, vt ſine eo nil concinnum, nil durable, nil decorum fiat,
ſeruabitur; qui alioqui, data ſimili circulatione, confunderetur: Nam
ſic,

fic, Cor solum illum attrahet, ac in arterias reponet, corpori distribuendum halituosum sanguinem, qui à vigilijs, animi motibus, laboribus, & ambiente consumitur; Cordi verò à lecore (iecoriq; à ventriculo) suggeretur id, quod illi ad vsum prædictum opus est; quemadmodum & per venas toti corpori, quicquid de ipsismet viuentibus partibus lapsum, dissolutumque ab enuciatis causis fuit; Sicuti ex altera, toto sanguine in Cor abeunte, & ab eo in totum corpus processionaliter moto, nec ipsi cordi ad suas functiones aditus, nec partibus coquendi, assimilandi, & quiescendi locus, nec sanguini, ac spiritibus vicissitudinaria, omnibus alternandis rebus attributa, ac necessaria quies; nec appetentiæ modus, terminus daretur; sed è contra in cunctis superfluitas, nauscatio, instabilitas esset.

Quod si Harueij fautores sic circulum introductum interpretarentur, vt scilicet Cor, ac arteriæ sanguinem per Cauæ foramen, & per multas anastomoses partim recipiant, partim reddant, ita tamen, vt ne credant, totum venosum sanguinem sic circulariter moueri; iam & ego cum ipsis sum, & vniuersa Medicorum schola ab ipsis erit: Verùm, quoniam sanguinem non à venis in membra (siue ab ijs commodissimè moueatur, siue per eas ab his, ac à visceribus alendis trahatur) deriuari, vt docent Veteres; sed ab extremis, externisq; venulis ad earum truncos, ab his ad Cor, ab hoc in arterias, ab arterijs in membra, & à membris iterum in venas perpetuo circulo moueri, prædicant, & contendunt: Ideo ab illis omnimodè dissentire cogor, & omnis Medicorum, saltèm seniorum, chorus dissentiet.

Ne autem gratis loqui, sanguinisq; ad partes venosum iter, sola Veterum auctoritate ductus, nulla ratione, aut euidencia fultus, & ad aerem, vt dici solet, collaudare videar; iam tempestiuum erit, re, quæ nunc nudis verbis prolata sunt, comprobare; incepto à venarum quieto, naturali; itinere ad Cor ipsum, & ad omnes tum superiores, tum inferiores partes; inde vero ad arteriarum ipsarum delationem omnigenam, & vitalem deueniendo, prout sequentibus tribus capitibus videbitur.

CAPVT OCTAVVM.

Sanguinem non ad Cor solum, sed & ad membra omnia naturaliter migrare per venas, probatur, ex phlebotomia.

Quoniam verò iam per Harueianos omnes non solum conceditur, sanguinem per venam Cauam naturaliter ad Cor conscendere, sed imò simul contenditur (quamuis iniustè), per eam à singulis partibus illum continuè ad illud remeare totum; non est, vt in eo probando frustra tempus conteratur: Quare solummodò ad contrarium probandum non minus consuetum sanguinis per eundem ad membra iter me conferam.

Et

Et quod sanguis à maioribus venis ad minores, & ab his ad minimas naturaliter permeet, ac moueatur, multa, quæ tùm in venæ sectionibus; tùm in spontinis excretionibus; tùm pro corporis alitione obseruantur, & vrgent; suadere, imò certò comprobare videntur.

Prima ratio
in venæ sec-
tione à co-
lteri iuuam-
to sumpta.

Nam, si secetur vena, quæ parti superiori, seu versus ipsius radices infirmæ communicet, multoties in ipso fluxionis, seu exitus actu, aliquando parùm post, clara sentitur subleuatio: Ergo supponendum, per venas superiores, venæ sectæ, & læsæ parti communes, fieri versus ipsam sectionem sanguinis illam partem affligentis fluxum, & extractionem. Pro cuius rationis clara explicatione, suppono affici phlegmone guttur, vel oculus, vel mandibulam dextram, & pro ijs curandis secari cephalicam eiusdem lateris; vel pleuram inflammari, & scindi basilicam è directo; vel labore coxam, & aperiri saphenam lateralem. Tunc, & in his casibus ægrotantes sæpè in ipso fluentis sanguinis actu sensibiliter partem subleuari, doloremquè sedari, sentiunt; nonnunquàm paulò post. Si ergo tunc sanguis veniret vel à manu, vel à pede extremo per arteriarum anastomoses, vt sibi suadent circulationis partem tenentes, quomodo illa pars determinata, sine aliarum iactura iuuaretur? & quomodo sic citò? Non primum; quia, vt ipsi ponunt, arteriæ non habent vim à parte retrahendi, sed ad ipsam tantum deferendi, quod à Corde suscipiunt; & sic manifestum, ipsas à Corde attracturas, hoc à Causa, hanc verò ab alijs venis, suis germinibus, sine partis detractu; præcipuè Sistetur Conringio, qui nullam aliam admittit viam sanguini à venis ad arterias, quàm per Cor, nullibiq; consentienti, à venarum anastomosis aliquid ipsis communicari: quod tamen, quam sit a veritate longinquum, quilibet, qui consideret, anastomoses sine valvulis esse, & sic per ipsas mutuam patere viam, tam ab arterijs ad venas, quàm ab his ad illas, facile fatebitur. Non secundum; quia atequàm per tot gyros illa pars affecta leuetur, non potest nisi aliquid temporis consumi. Quare necessario concludendum est, in tali phlebotomia per venas laterales, earumq; continuationes, & connexiones mutuas, non per arteriarum anastomoses fieri pro maiori parte dictam euacuationem. Iudicio sit illud quoque, quod, si secetur vena oppositi brachij, vel alia non communicans, non nisi post longum a sectione tempus iuuat, teste Gal. de cur. rat. per sang. miss. cap. 16. præiq; idem attestante.

Altera à mu-
tatione san-
guinis.

Idem si scindatur vena prope partem affectam, non solum per sentitur supradictum velox iuuamentum, sed & sanguinis color immutatur, & consistentia, itaut pro rubro flauus, vel ater, pro crasso tenuis, vel è contra exeat; id quod, in altera parte celebrata phlebotomia, non accidit. Ob id. Hippocr. in pleuritide curanda dictæ mutationis expectationem, vena secta collaudat lib. 2. de rat. viff. acut. tex. 10. Quemadmodum, & Gal. lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 14., nisi aut virium obstet infirmitas, aut plegmones malignitas: interdum enim (ait ipse) nihil ab ea emittitur, sed inibi fortiter sanguis coarctatus est.

Et hoc quidem ergo indicat, per venas sectioni superiores, læsq; membro per multiplicem venarum lateralium unionem communiore sanguinem ab ipso venire; cum arteriæ manus non ab oculo, gutture, vel pleura, nec arteriæ pedis à coxa, sed à Corde ipso, impellente (sic ait Harueius) sanguinem recipiant, & ad membra depellant.

Item ligetur brachium aliquantum strictè; ita tamen, vt arteria in suo pulsu non impediatur, feriatq; iuxta ~~ista~~ styli vna vena; tunc videbimus sanguinem, subito profusientem, paulò post lentè, ac guttatim exire laxetur aliquantùm ligatura, & videbimus, statim velociter recillire, vt quotidie à me, & ab omnibus obseruatur. Signum ergo, sanguinem à superiori vena, quæ per ligamen impediatur, non autem ab inferiori per arteriarum suppetias suppeditari. Nec valet dicere, ex laxatione arteriam à compressione liberari, vt indè liberius sanguinem impellat, vt excipit Conringius *cit. lib. cap. 29.* tum quia ipsa antea non occludebatur ob eius duriciem, & profunditatem, vt ex libero eius pulsu dignoscebatur, quicquid de vena esset molliori, ac exteriori. Et in hoc non Primrosius, vt ibi Conringius ait, sed ipsemet fallitur, qui potuit centies experiri, citra pulsus interceptionem, brachium strictiusculè vinculatum, vel parùm, vel lentè sanguinem, vena secta, emittere; Tum quia sic citò post mediocrem laxationem augetur fluxio, vt non sit possibile, antea sanguinem infra ad manum deuenisse, in venas transisse, & ad vulnus ascendisse.

Item facta solita ligatura in brachio non valde stricta, sed moderata, fiat infra venam secandam alia ligatura strictior, itaut tollatur in carpo pulsus, inde feriat, & videbimus, sanguinem lætè exire; stringatur superior, & sistetur sanguis statim: Ergo non à manu, sed à superioribus sanguis venit. Neque dicendum, sanguinem tunc venire ab arterijs intra duas ligaturas per suas anastomoses sanguinem in venam pelentibus, vt Primrosio simile quid Harueio obijcienti respondet ibidem Conringius, & Vallæus: quia nō cernuntur adeo frequentes, & lætæ inter hæc vasa anastomoses, vt in quatuor digitorum (spatio possit sic copiosè ab vno ad aliud sanguis transfundi; alioqui quomodo sufficeret arteriarum sanguis pro tot exituris, & pro extremis? Adde, quod anastomoses non possunt esse, nisi inter arterias, ac venas coniuges: humerariæ autem venæ nulla ita comes arteria, vt ex Vesallio, & Rolincio *lib. 5. dissertat. anatom. cap. 2. ad finem constat*; quinimò nec vlli ex eius ramis præter eum, qui interiùs in cubiti articulum tendit, *Gal. de dissect. ven. & art. 9.* Ergo, hac secta inter duas ligaturas, non per anastomoses poterit venire sanguis: igitur à trunco venæ superioris, cum inferiori via sit per inferiorem ligaturam intercepta. Dato autem, quod inter basilicam, & comitem arteriam in dicto spatio vna sit anastomosis, quid hæc, quæ visum, exigua, fugit, ad sanguinis profusientis quantitatem?

Item ligetur cubitus, vt moris est, itaut intumescat vena, ex arteq; feriat,

Tertia à ligatura modo.

Conringii exceptio soluitur.

Alia expectantia ex ligatura.

Responsio Conringii reijcitur.

Alia à ligatura experientia.

feriatur, ac tunc ligetur infra vulnus brachium, vt a manu non possit ascendere inde laxatur ligatura superior, aut auferatur omnino, & nihilominus sanguis exibat, etsi nō adeo impetuosè, vt cum ligatura; quia, vt hic infra dicemus, ligatura vim fluxui addit versus extrema, ac germina, non è contra: Non est tamen, quin sic clarum appareat, sanguinem à superioribus venis, etsi tunc lentè, exire; quod nobis sufficit.

Quarta ratio ab exitu quantitate & velocitate

Sed & quod non ab arterijs, sed à venis, sanguis ille in venæ. Sed ratione exiens transmittatur, fluxus quantitas, & velocitas suadent: quomodo enim imaginari possumus, tam citum, & tantam sanguinis transfusionem per arteriolarum vnus manus, vel pedis anastomoses, vel per carnis porulos, ad venam sectam fieri, vt, pulsu non mutato, ad libras breui hora possit extrahi? ne quidem si caro esset veluti cribrum, & anastomoses permultæ; præcipuè cum sanguinem in arterias venire, ipso cordis impulsu, astruant: si enim sic est, quomodo, si non augetur pulsus, nec in brachio, nec in Corde, poterit tanta sanguinis copia tam citò ad brachij arterias exprimi? manifestum quippe, impulsione Cordis æquè in omnes fieri regiones, si modò pulsus æqualis in toto remanet corpore, & is aliud non est (secundum eorum sententiam) quam sanguinis impulsio.

Conringij responsio refutatur.

Respondet Conringius, eam esse amplitudinem, & quantitatem anastomoseon, vt facili negotio, & breui temporis spatio possit sanguinis ingens copia ab arterijs effundi in venas: Sed hæc sententia nemini ferè, nec Harueio ipsi, vel sensui accepta est; cum coniunctiones illæ osculorum adeo exiles sint, vt sensum omninò lateant, solaque ratione disponantur; Et ideo vbi eas admisit Galenus, supposuit, per eas subtilioris tantum sanguinis, & halituosi portionem potius in arterias vtilitatis introire, constrictione verò in venas repelli.

Alia Gasparis responsio rejicitur.

Addit Gaspar Brauo *Resolut. Medic. par. 5. disput. 1. resol. 10.* quauis inconspicui sint ij meatus, experientiam conuincere, per vnam sectam posse totum sanguinem, qui in arterijs est, permeare; & in telis linteis videmus, nullo apparente meatu, liquorem facillè percolari. Sed prior ratio nil conuincit de phlebotomia ordinaria, per quam sanguis in moderata quantitate, & celeriter mittitur: per eam enim, credendum est, sanguinem prius, qui est in venis, educi, & tandem, si in maxima quantitate extrahatur, etiam ab arterijs inaniri, non per anastomoses solas, quæ in extremitatibus venæ sectæ communicant, sed cæteras omnes, quæ venoso generi in corpore vniuerso conueniunt; sicuti, & secta arteria, etiam venæ omnes possunt euacuari. Exemplum verò telæ adhuc minus urgere videtur: quia verum est, per eam transcolari citò, sed non per vnum aut duo oscula in tubulum determinatum contiguum, aut insinuatum, sed per totam telæ vniuersitatem; ideo non quadrat casui nostro, in quo prætenditur, in venarum tubulos non per totam arteriarum substantiam, sed per oscula paucissima exprimi: Hoc enim æquissimum est, non vniuersum vnus manus, vel pedis anastomoses arte-

riacas venæ sectæ communicari, sed has his, illas illis venis, quæ sibi coniunguntur, annectuntur, & non cæteris. Quæ autem rationes illum suadent ad tenendum, sanguinem in vcnas per anastomoses remeare, omnes ex suppositis, quæ falsa ostenduntur, deductæ sunt, nec, vt dixi, ab eo ibi pro phlebotomia adductæ, sed pro circulatione in genere.

His alia iungatur ratio à qualitate sanguinis exeuntis tùm simpliciter, tùm iuxta scissionis latitudinem: Etenim, si ab arterijs veniret, planum est, ipsum exiturum subtilem, & subtiliter semper, siuè lata, siuè stricta in vena fiat scissio; idquæ pluribus ex causis; videlicet quia, & talis in arterijs vt plurimum reperitur, cum ad eas per septum cordis, per arterialisq; venæ, at aliarum anastomoses veluti refudare cogatur; & quia in venam sectam iterum non nisi per cæcæ porositates, vel partium, vel arteriarum ipsarum percolaretur; & quia arteriæ ipsæ tùm magnitudine, tùm cavitare venis longè minores sunt. Sed contrarium experimur: nam si latum foramen fiat, crassus, & quantitate, & substantia exit adeo, ac lentus, vt nonnunquam, & citissimè peluim impleat, & scissu durus valde euadat; quæ quantitas, & qualitas arterioso sanguini minimè omnium quadrant.

Quinta ratio à qualitate exeuntia.

Tandem, si à finibus arteriarum in venas reponentibus sanguis veniret, & velocius, & copiosius, vel saltè non minus velociter, & copiosè exiret, scissis venis manuum, ac pedum, quàm cubiti, vel cruris, vt quæ distis arteriarum finibus sunt proximiores; non repugnante illarum exiguitate, cum nihilominus tantæ sint, & semper maiores, quàm arteriæ: Contrarium tamen experimur; quia plerunque, nisi balneum addatur, quamuis ligatura adsit, sanguis per eas sectas ventas non exit: Dicendum ergo, in phlebotomia sanguinem à venis interioribus, & maioribus præcipuè venire, & exire, non negato, interim ab arteriarum quoq; anastomosibus aliquid effundi, & fluxui addi.

Sexta ratio à modo exeundi.

Sed quis forsan in medium afferet salientem motus exeuntis sanguinis concitationem, quæ arteriarum propria videtur: Verùm hanc à sola ligatura fieri, constat, cum ea ablata, hæc cesset, & apposita illa, hæc iteretur: quo enim posito, aliquid ponitur, & quo ablato, aufertur: illud causam esse, apud omnes in confesso est. Quam quoque concitationem ab arteriæ pulsu non venire, arguit æqualitas motus, quæ ab arteriæ motu aliena est, vt cui saltus, & subsidentia mutuo, & alternatim insunt.

Concitatior exitus à ligatura accedit.

Ligaturæ autem quatuor de causis impetum faciunt in venas versus extrema primò ob dolorem cum expressione allatum, per quem pars, vt viuens, expellere cum impetu conatur, & vt pressa, versus foramen emittit; & hoc in inferiori parte, seu versus extrema fit, quia illic, nec ultra succus mitti potest ob venarum fines iam turgidos effectos: non autem in parte superiori, quia succus à cavitatibus multis potest acceptari, quæ maiores sese offerunt semper vsque ad Cavam. Cuius rei exemplum in aliquo exteriori tubulo membraneo facile habemus: in eo enim, succo nec ad saturitatem pleno, si ligatura versus occlusum

Versus extrema concitatio fit à ligatura quatuor de causis.

caput fiat, vbi osculum in aliquo latere impictum sit, videmus succum eiaculari; si verò supra, vbi cauitas, vel longa sit, vel aperta, nulla eiaculatio fit, sed simplex exitus. Secundò ob cordis, & corporis totius sympathicam compassionem, per quam partes superiores insurgunt, & ad eas, quæ affliguntur, partes, quæquæ ab ijs dependent, sanguinem, & spiritus transmittunt. Tertiò quia per moderatam adstrictionem constringuntur fibræ venarum eo ferè modo, quo in naturali earum pulsione tenduntur: pulsio autem fibrarum ad exteriora, vt plurimum fit, & cum impetu, vt in urinæ mictu. Quartò cum pars ligata exprimitur versus venarum fines, vnà cum venis ipsis intumescit; vnde os vulneris detinetur hians, & sic pars sanguinis aliam pellit, vt in vini exitu à pleno dolio: supra autem non intumescunt venæ, nisi pars doleat multum, vel alia superior ligatura addatur; quia longa nimis per totum corpus remanet venarum cauitas implenda; & ideo facile cedit; nec hiat vulnus, sed concidit. His igitur omnibus de causis à ligaturis vis fluxui additur à truncis ad germina, à maioribus ad minora, à superioribus ad inferiora, non è contra. Sed nec semper dictus adest fluendi impetus: quia, si vena parua sit, vt in summa manu, alijsq; exilibus venis, sine saltu fluit, & aquæ tepidæ fotu, vel vaporazione, vel igne opus est, vt fluat.

Etiam circulantibus sanguinis motu à maioribus venis ad minores concedunt.

Tanta verò est vis veritatis, vt nonnulli circulationi fauentes in eam cucurrerint, asserentes, sanguinem quidem in venæ incisione posse à venis maioribus in minores ire, sicuti, & per arterias posse sanguinem à partibus læsis retrahi: sed hæc per vim, & præter naturam, ob sectionem, dolorem, aliamuè violentam causam fieri, contendunt. Hi verò non animaduertunt, cum nostras impugnant experientias, proprias magis lædere, vt contra quas optimè similis exceptio laborat, & vrget. Sit pax nobiscum, vel æqua saltèm lorica induamur, lanceaq; pugnemus. Sint hæc violenta, erunt, & sua: Linquntur hæc ergo, & merè naturalia, spontanea; pro argumento sumantur.

CAPVT NONVM.

Sanguinem à maioribus venis ad minores, minimas, & extra naturaliter ire, à spontaneis excretionibus, & à partium alitionis natura arguitur.

Sanguinis excretiones in mensibus, hæmorrhoidibus &c. per veas fiunt.

Non per arterias fieri probatur.

Similis à venis maioribus ad minores, & ad extra migratio etiam in spontanis sanguinis excretionibus obseruatur egregiè: Nam menstrua per oscula vearum vteri, eiusq; ceruicis hiantia naturaliter, & singulis exire mulieribus, Medicorum cætus promulgauit. Alijs salubriter per narium venas, alijs per os, & ab alijs partibus exire sanguinem, quotidiana docet experientia. Nec dici potest, quod per arterias: quia nec saltus multoties conspicitur, qui arteriarum excretionibus proprius esse videtur; nec tantus impetus, quin faciliè, & ex seipsis, sæpius occludantur;

occludantur: arteriæ autem semper impetum faciunt, difficilè clauduntur, nec ex seipsis; Et ideo dixit *Arist. 3. de part. anim. 5.* Interdum ex ore profluvium sanguinis fit sine dolore, non per vim, vt ex arteria. ¶ Et vbi de his, quæ oculis non sic patent, dubitari contingat, nil saltèm de alijs, quæ exterius quibusdam naturaliter conspiciuntur, nimirum per exteriores hæmorrhoides, per gingivas, per crurum venas &c.: in his enim clarè, exitum à vena fieri, conspicitur. Similiter in vulneribus, vlceribusq; crurum, brachiorumquè videmus, sanguinem à superiori venæ cefæ parte magis, quàm ab inferiori, vel saltèm non minus egredi.

Quæ veritas per vim quandam Conringio expuncta fuit, dum hæc cap. 38. dixit: Quamvis verò affluxio omnis per arterias fiat, in hæmorrhagijs, alijsq; humorū excretionibus: quin tamen præter naturā retrogredi quidquam ex venis nonnunquam possit, vbi valvulæ nullæ obstant, nihil dubitandum videtur. Verum, & illud perpauillum sit, oportet ob valvulas passim impediētes. ¶ Vocat hic retrogredi, quod venis congregi est, & præter naturam, quod naturalissimum, ne sibi inconstans appareat: quamvis quid præter naturæ leges fiat in erumpentibus menstruis, nulli adhuc innotuerit. His verò proximæ in quibusdam Viris excernentes hæmorrhoides sunt, & has sequuntur, quæ criticè per venæ sanguinis fiunt, plerunque salubres eruptiones.

Cum autem quæ clara sunt, obscurare difficile sit, statuit tandem, & ipse, hæc sanguinis effluxiones per venas fieri; sed affluxionem omnem tam sanguinis, quàm aliorum humorum, per arterias venire. contendit, nimirum per anastomoses in venas ingredientēs. Imò (subdit) verisimile est, eos, qui secundum naturam sunt, effluxus, apertis venarum orificijs, fieri, eo quod solæ venæ videantur ad extrema ventium hiare, arteriarum finibus per anastomoses cum venis coniunctis. Meræ nugæ; cum ex Anatomicorum cæterorum confessione non minus, quàm ex Galeno ipso, vt dictum est, ipsæ quoq; arteriæ suos habeant in extremis insinuatōs fines: Pro qua tamen sua assertione firmat, da cap. 39. tres anastomosis modos meditaturs, Primum, quando vnus extremitas coit, cum alterius quasi medio ventre; alterum, cum duarum venarum extrema coalescunt; & tertium vbi duo vasa, sibi mutuo incumbētia sui in medio vno communi patent foramine; Venarum, arteriarumq; anastomoses prioris, & posterioris modi, pleraq; esse, secundi autem ordinis per raras, rotundè pronunciat. Quorum aliam non addit rationem, quàm quod superius docuerit (vt audisti) per venarum extrema orificia, & alimentitium sanguinem, & recrementa eiusdem excerni. Quis verò Demosthenes, quis Pericles cordato Viro suadeat, liquorem, ab alicuius tubi extremitate exeuntem, non ab illo tubo, sed ab alterius proximi tubi porositatibus provenire? Aliquam quidem ab ijs portionem vnā exire, vero consonum est; sed vel totam, vel plurimam, absolum profus: Si enim arteriarum ora,

Idem consentit Conringius, sed ab arterijs fluxum venis coëcidit.

Tria anastomoseon genera ex Conringio.

sicuti venatum, in cutem finiuntur, inanis illarum conatus fuerit in venas, dum per seipsas potest exitus perfici: si verò in venas, quomodo per eas ali corpus, bene statuitur Sed, utcumq; sit, vel hoc vnum certum est, eo in casu venas versus sua extrema, non intra se retrahere sanguinem, vt per nos contenditur.

Sanguinem
pro alitione
maioribus ve-
nis ad mino-
res perueni-
re probatur
exemp'o pla-
tarum.

Exemplum
fluuiorū pro
alitione ab-
sonum.

Alitionem quoque partium (pulmonibus exceptis) per venas communiter deportari, non autem per arterias, probatur ex modo nutritio- nis ad exemplum plantarum homini competente. In ijs enim videmus, humorem alimentitium à trunco ad ramos, à ramis ad germina, ab his ad frondes, non e contra manare. Sic ergo, & in homine statuendum est, à Cauæ trunco ad ramos suos, ab his ad venulas, à venulis in mem- bra naturaliter sanguinem meare non e contra. Nec valet exemplum per quosdam deductum à fluuijs, qui videntur à riuis multis, & hi à fon- tibus procreari: quia in primis incognua est comparatio rerum inani- matarum ad animatas; tumq; magis rerum, quæ in solo fluxu, seu de- cursu omnem finem habent, vt fluuij, ad eas, quæ non in fluxu, sed in alitione, fruitione, & vita finem suum sortiuntur, vt in hortulo aquæ distributio, in corpore sanguinis ductum: Quare melius multò adap- tatur plantarum exemplum, in quibus per radices minimas in maiores, inde in truncum, & ab hoc in quoslibet ramos, ac ramulos fertur alimentum.

Quod si aliquam propterea proportionem etiam adesse velis inter- fluuios, & sanguinis ductus, difficile non est iconem etiam in his simi- lem inuenire: cum vndiq; à minimis Portæ germinibus in ipsius Caudi- cem, in Cauamq; tamquam in Oceanum, à quo iterum fontes ad riuos, & fluuios (per Cordis scilicet mediū, & per anastomoses multas in arte- rias, quoquò excurrentes) enascuntur, prout supra cap. 7. a nobis adhu- tum est: tunc verò non alitionem, per quam pattes nutriantur, sed so- lam vitalem irrorationem exprimes.

Altera ad
idem ratio à
modo, quo
fertur alimen-
tum, scilicet
attractione,
& probatur
quadruplici-
ter.

Addito, alitionem partium, & totius corporis non impulsu fieri, sed attractu, contra quam sentiant Harueiani, & super venas, ex quibus facilimè trahitur, vt dicitur inferiùs, non ab arterijs, quarum propria magis videtur impulsio. Illud autem probatur quadrupliciter.

I.

Primò ex communi nutrientis facultatis natura, quæ certo certius dignoscitur in plantis: nam hæ, cum mera, ac simplici alt rice facultate sint præditæ, non alio modo, quam attractione, cibum a terra capiunt, concoquunt, augentur, ac viuunt (quæ enim in terra vis fingi potest, quæ humorem ad proceræ arboris cacumina per ligneas inuisibiles ca- uernulas impellat?) manifestum autem, vt docent Philosophi, eiusdem naturæ, imò perfectionem facultatem in homine, quàm in plantis repe- riri; sic habetur ex *Arist. lib. 2. de gen. ani. cap. 4.*

II.

Probatur secundo: Nam cum alitio sit quædam fructio cum volupta- te, vel actio ab his non seiuncta, non à contrario, sed à simili sit: trahi- tur autem, quod simile est, propellitur, quod est aduersum: est enim tractio

tra & io quædam sympathiæ, & similitudis, pulsio antipathiæ, & dissimilitudinis arguitio.

Probatur terciò: quod variæ sunt partes alendæ, & diuersi temperamenti, & ideo diuerso quoque ~~quæ~~ egent alimento. At per impulsione non potest diuersificari, & separari materia iuxta diuersam recipientium egestatem, ac naturam, sed potius iuxta amandantium auersionem. Ergo alitio melius attractione fiet, quam pulsione: sic enim probabile est, vnamquaque partem trahere, quod sibi magis placet, ac simile est; sicuti, & hoc facilius fieri à quietis venis, quæ molles quoq; sunt, & raræ, quàm ab arterijs, vtpotè quæ densæ, ac crassæ, paucū
,, omnino sanguinem, eundem, vaporosum, vicinis partibus trahere
,, permittunt. J quæ sunt formalia verba *Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 10.*

Probatur quartiò: quia si impulsione deduceretur alimentum, solum illæ partium portiunculæ alerentur, in quas oscula, vel fines vasorum deferentium inseruntur, sicq; vel tota porosa vasa esse deberent, vel non omnes alerentur partes, cum non vbique sint ipsorum vasorum termini. Sed porosas vbique esse venas, vel arterias, nec constat, nec licet: Ergo alitionem non impulsione, sed attractione fieri, dicendum: Sic namque partes à partibus, vasa à vasis, & contigua à contiguis tum per oscula, tum per tunicas ipsas, & per continuitatem attrahunt, & nutriuntur.

Hoc sic stante, alitionem ab arterijs communiter non deferri ad membra, sed quandam solam vaporosam vitalem irrorationem, qua ipsa suffulta omne nutritionis manus, & actionis obeunt, indicant multa, ac probant. Ipsarum arteriarum structura crassior, ac durior, ex duplici, & multoties triplici, multòq; seu sextuplò crassiori membrana, quam venarum, constans, vt tradunt Galenus, Vesalius, ceteriq; Anatomici omnes, & ideo neruacæ naturæ eas esse, non semel Aristoteles fassus est; Quod factum fuit, vt spiritibus continendis sufficerent, sic docente *Gal. 6. de vsu part. 10.* quicquid ex eo deducat Harueius in contrarium: Quare difficillimè ab ipsis attrahi, ac transcolari, seu exugis sanguis potest: Somnium namque est, & præter omnium mentem putatur, quod narrat Harueius de arterioliis, quas structura omnino venis similes esse, ait: cum eadem sit illarum cum venulis proportio, quam cum venis maioribus maiores arteriæ seruant tum in crassitie, tum in capacitate. Quomodo ergo partes, quæ truncis arteriarum contiguæ sunt, nec villa ab ipsis arteriaca capillamenta recipiunt, sanguinem ab
ijs *exsugiet, et ab*
ijsdem durioribus in eas transudabit sanguis? sic certè non nutrietur multæ.

Ipsarum motus continuus, qui potius aptus est interturbare partium coctionem, quæ quiete perficitur, & attractionem, quæ à stabilibus magis, quàm ab inquietis obtinetur, ac permittitur, quàm iuuare; quique magis ad impellendum, & subtrahendum, quàm ad continendum, vel porrigendum id, quod trahi debet, idoneus putatur.

Ipsarum sanguis calidior, tenuiorq; plurimis ob id partibus, quæ sper-

III.

IV.

Alimentum ad membra non deferri per arterias probatur.

Ab ipsarum substantia modo.

Ab eorum continuo motu.

indatæ

Ab illarum
sanguinis ca-
litate, &
tenuitate.

maticæ glutinosæ, crassæ frigidioris, vel temperatæ naturæ sunt, alendis improporionatus, ac dissimilis; Quæ causa mouit Galenum, vt putaret, hoc ideo solos pulmones arterioso sanguine connutiri, & ad hunc effectum eorum arterias venosa structura, à Natura fabricatas, sicuti, & eorum venas e contra arterioso corpore formatas esse, tradit *cit. 6. de vsu part. 10.*

A stricta ip-
sarum caui-
tate.

Ipsarum stricta cauitas, & earum sanguinis, etiam illius respectu, paucitas, quæ deprehendi potest, si ligetur simul, & semel duobus in locis arteria, & inde inter duo ligamina secetur: obseruabitur enim, multò copiosior in venis esse sanguinem; Quod factum est, vt liberè illæ pulsare possent, & spiritibus vitalibus velociùs deferendus inferuient.

A pauciori
ipsum inu-
mero.

Ipsarum numerus, quàm venarum, paucior, vnde nonnullæ partes sine nutritionis delatorio tubulo essent: Inuenies enim (ait *Gal. 16. de vsu part. cap. 13.*) venas quasdam sine arterijs, sed arteriam nullam sine coniuge vena. J Cuius rei causam præclare annuit cap. antecedenti per hæc verba: Causa verò huius est, quod partes omnes alimentum indigent, calidæ, frigidæ, duræ, molles: vt autem caloris natiui modus ad vnguem conseruetur non ampliùs similiter omnes postulant. J Hac de causa, cum in ossa singula venularum capillamenta ingredi, ratio omnis suadeat, & doceat *Gal. eodem lib. cap. 14.*, arterias in ea inferi, nec dictum, nec rationabiliter putatum tùm ob dictam causam, tùm quia ossis durities arteriæ dilatationem non admittit, hoc autem vsu sublato, inutilis esset huius existentia. Penetrant ergo intra ossa, ait idem *Gal. lib. 16. de vsu part. 10. iam cit.*, arteriæ, quæ parte inter se committuntur. J Quot verò partes sine arterijs, solisq; cum venis adsint, præcipuè exteriores, docet idem *lib. de dissect. ven. & art. cap. 9.* ibi enim inuenies crurum, manuum, abdominis, dorfi, colli superficiem arterijs carere, sicuti, & plures in brachio, in iccoris gibba, in septo, in pectore, & capite illas coniuges desiderare venas.

A modo es-
sum in
sertionis in par-
tes.

Ipsarum tandem insertionis modus in partes alendas: nam, vt opportunè aduertit Conringius sæpè *cit. lib. de sang. gen. & motu cap. 38.* Neque arterias perinde, vt venas, cernere est, per omnem musculorum carnosam substantiam dispergi, sed pleræque earum quasi in summo finiuntur. J

His opposita omnia in venis agnitu facillima sunt: Earum enim tunica vnica est, eaq; in iccore, alijsq; partibus tenuis, & facilè transpirabilis, vt possit per eam subtilior quilibet succus per quandam diapedesim exugì, & earum ora facilè aperiantur, ac concidant; tùm natura quæta est, vt quicquid libuerit, ab ijs furari, trahereq; liceat; tùm sanguis temperatior, crassior, & si sic dicere liceat, omnibus adaptabilior censetur; tùm cauitas maior, & copia succi in ijs grandior longè, vt vnique sit satis; tùm & illæ copiosius, & vniuersalius inseruntur in partes, sicuti, & altius ad intima penetrant quocunque.

Quibus si addantur, quæ in primo Libro statuta sunt, nimirum Iecur venarum

venarum esse principium, alicuius facultatis sedem, sanguinis officinam, ab ipsoq; alimentosum succum in quaslibet partes, & in ipsum Cor deduci, facile convincetur, non quidem ab arterijs propriè, sed à venis in membra sanguinem pro alimento deferri. Et hoc adhuc magis convincitur à nutritione factus in utero: hunc enim nutrit per umbilicalem venam, quæ non ab arterijs, sed à venis deducitur, & in eas per iecur inseritur, concedunt plerique, si non omnes.

Additum verò non in vanum illud Propriè est: nam, si de quadam spiritosa, vitaliq; refocillatione loquamur, libenter admittimus, & sustinemus, eam commodissimè per arterias subministrari, non cæteris partibus solum, sed & Iecori, venis ipsiis, earum. succo, & visceribus cunctis. In quem sensum intelligendus venit citatus à Conringio Galenus *lib. 16. de usu part. 10.* Huius enim verba hæc in fine capitis, posita, Nonnulla verò exigua etiam ad cutem necessariò peruadunt, alimentum partibus, quæ illic sunt, præbitura.] sicuti, & hæc paulò superius signata ibidem Siquidem vesicæ exigua, magna verò, ac duplicia matricibus vasa infixit, ut quæ non solas ipsas matricibus, sed factum etiam in ipsiis matricibus concipiendum essent nutritura;] si benè legatur locutionis series; cum ibi Gal. promiscuè tractet de venis, & arterijs, patet, illa adaptanda esse, quibus illarum ex ipso nutritio competit; quæ cum ex eo sint venæ, de illis quoque verba illa intelligenda esse, constat. Et hanc interpretationem ad Galeni mentem esse, constat ex primis verbis, quæ inferrent (si ad arterias referrentur), nonnullas exiguas ad cutem necessariò ferri, & tamen ex supra allato loco de *differt. ven. & art. patet*, per eum nullas arterias ad exteriorem cutem crurum, summæ manus &c. peruenire. Possimus etiam dicere, Galenum pronuntiassse in genere de vasis, quod sint allatura nutrimentum, intelligendo eo modo, quo utrique horum vasorum generi iam adaptauerat in antecedentibus pluribus locis, nimirum, ut venæ partibus omnibus alimentum subministrarent solidum, & ipsismet partibus congenicum; arteriæ autem quoddam spiritosum, ac vitale fomentum, seu refocillamentum nativum, & ingeni spiritus.

Vidit verò scopulum inevitabilem Auctor hic; & ideo eodemmet capite Suorum moderatus, & interpretatus sententiam, stabilivit, per arterias quidem sanguinem ad partes deferri, sed inibi in venas quiescentes depositari, ut ex eo immediatè illæ alantur, ut supra cap. 6. diximus, & eius verba citauimus. Idem sensisse videtur Rolsius *lib. 5. differtat. anatom. cap. 13.* per hæc verba: Ex his omnibus tandem manifestum, venas delatum ab arterijs ad Cor reuehere sanguinem; tantum autem, quantum pro nutritione partium sufficit, in suis, ut partibus nutriendis communicentur, retinere extremitatibus.] Sed quomodo prioribus à se positis cohererent hæc? Sit enim, quicquid volunt, si in ijs venulis quiescit sanguis, usquequò nutrantur partes, num interim arteriæ transmittent? iam ex eorum principiis hoc patet: quia

Tertia ratio à iecore, & venarum facultate.

Vitalis, & spiritosa refocillatio ab arterijs subministratur.

Sanguinem Per arterias venire, sed in venas deponi pro allatione, statunt Conring. & Rolsius.

Tale commentum revellitur,

in qualibet arteriarum diastole, imò etiam in systole, vt idem ait Conringius; sanguis ad partes mouetur: Si ergo in venis ijs quiescit, & ab arterijs indefinenter confluit, cur non in tumorem eleuabuntur intolerabilem? nec enim còstio in instanti, nec deriuatus sanguis, per Eos in arterias retrocedit, nec poterit per venas remeare: Alias obiectiones non viliores simile subterfugium fugantes vide supra dicto cap. 6. in tertij absurdi trituratione. Dicendum, ergo, huiusmodi noua commenta falsa, & labilia prorsus, esse. Et sic satis probatum remanet, sanguinem per venas ad partes naturaliter deferri tùm in artificialibus, tùm in spontanis excretionibus, tùm ad partes alendas, vt promissimus.

Quarta ratio
ab exemplo.

Ijs rationibus si aliam addideris, ab exemplo deductam, completam, opinor, afferes huiusce propositionis probationem. Inuenies siquidem alios corporis communes ductus, aliaq; delatoria instrumenta naturaliter à maioribus ad minora suas distribuere merces: Ergo, & sic in venis fieri, dicendum. Probatur antecedens ab arterijs, in quibus sic esse, & fieri, ipsimet Contrarij affirmant; à nervisq; quorum influxus à truncis ad ramulos expanduntur, & ijs obstructis, in his subito prohibentur. Excipe tamen venas eas, quæ inconfectum succum in Iecoris officinam ferunt, & veluti radicem æmulæ, in tubum maiorem colligunt, vt inde cunctis distributio fiat.

Hinc forsan occasionem arripiunt Iuniores sua fouendi inuenta, dum venas pro collectorijs riuulis ponunt, ad Cor, tamquàm in cisternam succos deferentibus, vt inde per arterias quolibet transferantur. Sed quàm futilis sit æquiparatio, cuique benè consideranti constabit. Quantum enim numero, capacitate, & succi copia venæ arterias superent, demonstrare superfluum est: Quis autem vidit vnquam in Natura Riuos flumina, hæc mare, a quo cunctæ distribuuntur aquæ, superare? Vel quis in Politicis horrea publica, Principis ærarium, a priuatis sacculis, & Procerum crumenis euinci, vel copia, vel latitudine, sine monstrofitate cognouit?

Patiantur ergo cum suo Principe Circuentes, Maria, & lacus venas esse, fontes, ac flumina cor, & arterias, vt supra cap. 7. dictum fuit: Quæcunque enim ad contrariam opinionem suafere Iuniores sequentibus ponderabuntur capitibus, &, diuino iuuante flamine, conuincuntur.

C A P V T D E C I M V M.

Per arterias etiam sanguinem versus Cor naturaliter moveri ostenditur.

PRiusquàm autem ad hoc veniam, non inconsonum putauerim, tamquàm laciniam, hic pauca adnectere de motu sanguinis etiam in arterijs contra ab Harueio disposita; nimirum à circumferentia ad centrum, ab arterijs ad Cor. Et hinc quidem non longè abeunt Antiquorum placita: Nam per Hippocratem *lib. de cord. num. 8. & 9.* propter

reâ natura osculo Aortæ membranulas occludentes disposuit, ne succus in ea fluitans in Cor introeat: ventrem enim Eam depasci, credidit. Galenus per arterias Cordi sanguinem arteriacum in fætibus aduenire, statiliuit *lib. 7. de vsu part. cap. 21.* Per Aortam venæ arteriali sanguinem pro pulmonibus aduenire, dixit *Falop. pag. 130.* Ex posterioribus Franciscus Vlms lib. de liene statuit, sanguinem in sinistrum Cordis sinum per arterias à liene suppeditari; Quem sequuti sunt Constantinus Varolius *lib. 3. cap. 4., & lib. 5. cap. 4. Anat., & Aemilius Parisianus lib. 6. nobil. exercit. de subtilit. exercit. 2. cap. 3.,* ac alibi. Per arterias cerebri, ventriculi, vteri, aliarumque partium affectus sic citò, & violenter communicari Cordi, vt nonnunquam obseruamus, omnes communiter tenent Prædicantes, docentque Auctores; quod non esset, si per eas continuè sanguis à Cordetrunderetur in membra: quippe ab ipso extra impetente succo quilibet simul raperetur, & retrotraheretur vapor.

Sed, & per has intro, ac ad Cor sanguinè naturaliter ferri, quibusdam alijs, & euentibus, & rationibus probatur. Et primò si aliqua ex arteria sanguis exeat, concitata lypothimia, resistat; quod esse non potest, nisi quia retrò ad Cor abit. Secundò in timore, & horrore valido palescunt partes omnes, & refrigerantur: signum ergo, sanguinem concentrari. Tertiò sedâ aliqua arteria, mediæ horæ spatio vniuersus ferè exit corporis sanguis ex Harueio ipso: quomodo autem hoc, nisi supponamus, ad ipsam non à Corde solo, sed & à cæteris arterijs circumquaque ad vulnus deferentibus, ac à venis vndique attrahentibus, fieri sanguinis communicationem? Quartò in admotione exterioris veneni, vel validioris medicamenti, nulla alia clarior causa adduci potest mortis, aut remedij operationis ad intra, quam arteriarum motus, qui propriè ob dilatationem attrahere, & ob copiam spirituum intrò suscipere, aduare, & ad Cor deferre valet: nam, & *Gal. lib. 1. de simp. med. facul. cap. 12., & 3. de nat. fac. cap. 14.* docet, arterias ab ambitu corporis attrahere. Quintò in pudore sanguis repentè ad genas volitat primùm, indeque statim regreditur ad Cor; quod cognoscitur ex rubore statim ibi adueniente, & subsequente non minus raptim pallore. Hoc verò ex retrahentibus venis provenire, rapiditas effectus minimè suadet: similia enim in exterius apparentibus motus nunquam agnoscitur: Ergo per arterias. Sextò in ira, & furore sanguis in principio ad Cor conuolat, vnde palescunt partes, quod per venas fieri, instantaneus euentus negat: ideo per arterias. Inde ad genas, oculos, & caput furenter irruit, vt ex rubore, calore, & alijs, pathematibus nascitur, nec postea sic citò, aut sic facilè recurrit, esset necesse, si per venas, quod abit, retroire deberet, vt supra in pudore fieri, aduersò supponeretur.

Ratio quoque idem nobis suadet: Si enim venæ, quamuis earum aliquæ nonnullis valvulis impediuntur, vtrunque iter habent naturale, vt supra ostensum est, multò magis arteriæ, quam cavitatis nullum natura naturæ obicem suere. Item sanguis fertur per arterias, vel per vim

Probat, & Hippocr., & Gal.

Idem ex vniuersorum quorundam sententia.

Ex facili particulari affectuum communicatione Cordi.

Ab euentibus idem probatur.

Probat etiam rationibus.

motus earum pulsifici, vel fibrarum ope, vel vi spirituum, vel Cordis opera, vel virtute ipsi sanguini insita. Si primum, patet, in pulsū motus adesse sibi inuicem oppositos, nempe constrictionem, & dilatationem: si ergo per constrictionem pellitur, per dilatationem trahetur; si per dilatationem eiecitur, per constrictionem sugetur. Si secundum, eandem fibrā tū in superioribus, tū in inferioribus arterijs insunt; ergo eundem efficere in vtrisque motum possunt: Si ergo superiores versus caput mouent, cur non inferiores? si inferiores ad pedes vehunt, cur non similiter superiores? Et sic vtrunque iter familiare habebunt. Si tertium constat, spiritus nonnunquam ad extra transmitti, nonnunquam Intrō recipi: ergo, & sic sanguis. Si quartum, nullum in corpore membrum est, quod à se aliquid pellat, à quo, & aliquid ad se attrahi nequeat: ergo, & sic cor. Per eadem autem vasa, per quæ fit attractio, per eadem expulsio, & è contra, vt docet *Gal. lib. 3. de nat. facul. cap. 13.* Ergo, & Cor ab arterijs aliquando attrahet; non impediēte Aortæ valvula: vt enim idem ait *Gal. cit. 6. de vsu part. cap. vlt.* Membrarum epyphisis non ad impediendum, ne nihil omnino, sed ne multum, neue repente in ipsum Cor quippiam immigret, formata est; Et vt *lib. de vsu puls. cap. 5.* non adeo os magnæ arteriæ videtur obstruere membranæ, vt nihil ex ea reddatur. Si quintum, quid vetat, quin per vasa libera, & leuia sanguis, & supra, & infra abeat, prout vsus illius postulat, & opera postulata requirit? Est autem arteriaci sanguinis præcipuus vsus vitalitas, qua non membris solummodo, sed & ipsi Cordi in angoribus, lassationibus, curis, vel laboribus, opus esse potest. Concludere itaque merito possumus, etiam per arterias sanguinem versus Cor naturaliter aliquando moueri.

Et arteriæ, &
venę natura-
lius sangui-
nem ad mem-
bra vehunt.

Cum hoc tamen certè mihi dicere, ac affirmare posse, videor arterias melius, facilius, frequentius, & naturalius versus extrema sua sanguinem, ac spiritus deferre; quemadmodum, & de venis quoque tenendum arbitror: nam omnia germina facilius à suis stipitibus, & truncis, sicuti vitam, & esse, ita & alimentitum humorem recipiunt, quàm his illa impartiantur, vel reddant: viuet enim stipes, absceito germine, non viuet germen sic læso stipite; ager hic in illud facilius, & magis, quàm è contra. Prout, & in artificialibus clarè agnoscitur; in quibus multò agilius magnus canalis in varios canaliculos dispergitur, quàm è varijs canaliculis in magnum canalem humor excurrat. Sunt autem non magis arteriolæ maiorum arteriarum germina, quàm sint venulæ venarum, nec hæ minus, quàm illæ, Vt profecto ostendit idem ramificandi in vtrisque modus, idemquè ad membra progressus vtrarumque; Vt propterea nec dissonum sit idem vtriusque officium, vel simile assignare; contentum scilicet, sibiq; impartitum succum ad membra omnia pro eorum quorumlibet iustitia deuchere: Vnde non immeritò Auicena in definitione febris pronunciauit esse calorem præter naturam diffusum à Corde per arterias, & venas in totum corpus, median-

tibus

tibus spiritu, & sanguine; Sic annuens eandem esse sanguini, ac spiritui semitam in arterijs, & venis, à maioribus scilicet ad minores, minimas, & membra.

CAPVT VNDECIMVM:

Adducuntur præcipue rationes Harueiani dogmatis.

EX hucusque traditis, ac discussis, non omnino imperfectè (opinor) videbimur probasse, quis sanguinis in corpore detur naturalis motus; nempe omnigenus, non circularis, vt Neotericorum pars cum Harueio nouiter adinuēnit, & affectat: Verùm quoniam non satis est veritatem vnius dogmatis ostendere, nisi, quæ obstant, funditus euellantur, nequæ hæc funditus euellantur, nisi, quæ ipsamet obstacula firmant, simul evertantur; Ideò hic nunc libet potissimas rationes, quæ pro circulari adstruendo sanguinis motu, ab Harueio ipso, & eius Sequacibus adducuntur, recensere; & inde, quæ pro earum dissolutione respondere liceat singulatim asserre. Et primò

Planum est, si Corde pulsante in singula pulsatione aliquid sanguinis in magnam arteriam trudi, quod Harueius cum Conringio, ac alijs ad semunciam, vel saltè ad draginam, alijs ad scrupulum, vel etiam minus ascendere putant: Cum autem singula hora plus quàm ter mille ictus fiant, non videtur, quomodo tantum sanguinis possit etiam à voracissimo ventriculo suggeri, vt compensetur, ac reponatur id, quod à Caua in Cor, & ab hoc in arterias abiit, nisi per circulum sanguis ipse, progressus, in venas retroeat, iterum ad Coriturus. Cuius rationis vim, ac fundamentum, vt probent, ad experientia Anatomica veniunt, exuentes in viuo animali Cor ab omnibus inuolucris, ac inde arteriam pungentes: ex ea enim vident, sanguinem in singula eius pulsatione exire. Item ligantes Aortam ad radicem Cordis, & tundentes in iugulo arteriam, eam citò inaniri, venas autem repletas manere, Corq; statim à copia suffocari, obseruant. Secantes etiam Cordis mucronem, vel Aortam præscindentes, singula auriculæ, aut Cordis pulsatione effundi sanguinem conspiciunt. Item, & Cordis pulsum nil aliud esse, quàm sanguinis in Aortam impulsum, per eius diastolem à vena Caua, & arteria venosa partim attracti, partim admissi, illud probat, quod, ligatis arterijs, longè à Corde, vident, eas versus Cor repleti, ac magis intumescere, versus verò extrema deprimi, & inaniri.

Quantitatem verò pulsi sanguinis venantur à capacitate ventriculorum, quæ ad illorum dicta vsque ad uncias duas sanguinis capit: ipsis verò leuiter etiam constrictis, quid considerabile eijcitur. Vt autem id oculariter probet Conringius, ipsum Cor aliquo liquore implet, & ipso molliter compresso, videt, copiosum aliquid eiaculari. Item considerat sanguinis excretionem, quæ vulnerata qualibet arteria breui

Prima ratio à sanguinis à Corde in arterias impulsæ quantitate,

Singulorū pulsus ictus aliquod sanguinis petit, faciens expiramenta.

tempore magna cernitur; ad quam tamen sanguis per Eum totus in Cor transeundo concurret; tùm & eam, quæ secto vsupra Cordis mucrone, vel Aorta seiuncta, aspicitur in Cane non minor semuncia quolibet istu exire.

Secundò Sanguis per arterias ad quæcunque membra continuè mouetur; ab his verò per venas continuato motu retrahitur, moueturq; versus Cor: dicendum ergo, necessarium esse, vt sanguis, qui arterias petit, à venis, qui has, ab arterijs veniat, & sic continuus in his circulus fiat. Et illum quidem motum per varia experimenta pariter comprobant: Cauam enim tenacula in viuo secto animante apprehendentes,

aspiciunt, eam breuissimè versus Cor inaniri, Cor albidius inde fieri, & post languere, inde Cauam soluentes, Aortamq; ex altera vincientes, cernunt, Cor instaurari, rubicundum euadere, ac inde ferè liuidum turgere, itaut ex suffocatione pereat. Item, & venam à carne disiunctam

in crure viui animalis arctè ligant, videntq; propagines illius venæ versus pedes tumescere, versus superiora detumere; sicuti, & idem in alijs venis omnibus tùm inguinum, tùm mesenterij, tùm emulgentibus experientur fieri; veluti, & in venis Cordi superioribus eas quoque versus cor inaniri, versus verò superiora, & latera impleri: Ex aduerso autem, ligatis arterijs, cernunt, eas versus Cortumidiores reddi, versus extrema flaccescere. Ligant etiam in missione sanguinis brachium, vel arctè, vt pulsus non sentiat in carpo, & ita vulnerata vena exit sanguis, sed breui retinetur; vel moderatè, itaut non auferatur pulsus, & tunc sanguis velociter exit: contra verò, si fecetur vena supra ligaturam, non exit sanguis, imò eam versus Cor inaniri, declarant. Item, & in phlebotomia observatur, per pollicem infra sectionem brachio, vel cruri

adhibitum sisti sanguinem, supra verò adhibito non sisti. Item in arcta ligatura supra ipsam sentiunt pulsus maiorem impetum, & quasi impediti sanguinis conatum, infraq; paulatim brachium refrigerari; laxata verò ligatura sub digitos quasi ruentis sanguinis motum persentiunt in arteria, & frigiditatem illam carpi ad brachium ascendere. Quibus, & alijs experimentis sibi constare, arbitrantur, quod supra dictum est, sanguinem scilicet ad membra deduci per arterias, & ad interiora, seu ad Cor reduci per venas.

Est & existentia valvularum, quæ in venis passim observantur eo ordine, & forma dispositæ, vt in ijs, quæ à Corde infra descendunt, prohibeatur omninò sanguinis descensus, & ascensus admittatur; in alijs verò, quæ supra ad brachia, iugulum, & caput repunt, illius ascensus renuatur, feratur descensus. Quare cum natura nihil frustra faciat (inquiunt), ex hoc clarè deducitur, sanguinem non ire à maioribus venis ad minores, nec ab his in minimas, sed e contra ab his in illas: In arterijs autem nullas adesse valvulas, constat, præter eas, quæ in earum implantatione in Cor conspiciuntur, quæquè sanguinem quidem à Corde in arterias recipiunt, ab his autem in illud prohibent regressum.

Cum

Est & existentia valvularum, quæ in venis passim observantur eo ordine, & forma dispositæ, vt in ijs, quæ à Corde infra descendunt, prohibeatur omninò sanguinis descensus, & ascensus admittatur; in alijs verò, quæ supra ad brachia, iugulum, & caput repunt, illius ascensus renuatur, feratur descensus. Quare cum natura nihil frustra faciat (inquiunt), ex hoc clarè deducitur, sanguinem non ire à maioribus venis ad minores, nec ab his in minimas, sed e contra ab his in illas: In arterijs autem nullas adesse valvulas, constat, præter eas, quæ in earum implantatione in Cor conspiciuntur, quæquè sanguinem quidem à Corde in arterias recipiunt, ab his autem in illud prohibent regressum.

Cum

Cum igitur per facta experimenta sanguis cōtinuè moueatur, debeantq; indelenter ali partes, videtur, aliter esse non posse, quàm per arterias ad membra meatum, per venas verò remeatum ad Cor fieri; quæ quædam circulatio est. Vt autem valvularum prædictum officium (cum de earum existentia non ambigatur) probent, multa iterùm experientia adducunt, quorum præcipuum illud est, quod adhibitus follis venæ axillari, insufflatoq; qua parte brachium respicit, non potest ventum intro pellere, sed imò in Cauam retrocurrit; sicuti, & in cassum illuc alia arte sanguinem compellere tentatur. Item ligato brachio in robustis, ac rusticis præsertim Viris, ob idq; inflatis venis videntur quidam ipsarum nodi (hic valvulas subesse ponitur), quos si digito versus superiora compresseris, videbuntur cedere, sanguinemq; ascendere in superiorem venam, obseruabitur: si verò versus manum premantur, nil inde posse detrudi, cernetur. Accedat, quod, si specillus in radicem venæ ponatur, & versus ramos immittatur, non valde longe imponi potest: si verò in ramos inditus versus radices adigatur, facillimè penetrat.

Valvularum
vsum addu-
ctum proban-
tia experimē-
ta.

Nec deest finis dictæ circulationis optimus; Vt scilicet sanguis, qui in extremis venarum, arteriarumq; osculis reperitur, ab aere refrigeratus, longèq; à Corde in crudefcens, ad ipsum Cor redeundo, recalsiat, ac recoquatur; nè otiosus marcescat, vt aquæ stagnanti accidit non rarò, & sicuti in obstructis fieri, conuincitur; vt nutriendis partibus nouus semper sine illarum labore porrigatur sanguis; vtq; continuo illius motu eiusdem coagulatio impediatur, quæ alioqui in histeticis, apoplecticis, & venarum interceptionibus contingit aliquando.

Quarta ratio
à hoc.

Duas alias probationes, ex supradictis dependentes addit Gaspar Brauo *Resolut. Medic. Part. 5. resolut. 1.* quarum prior talis est: Omne Cor viuens debet habere necessariam causam, ob quam illi tribuatur aliqua portio sanguinis attrahendi in vnaquaque systole: Sed sola sanguinis circulatio est necessaria causa, ob quam potest sufficiens copia sanguinis præstari pro vnaquaque systole: Ergo sanguinis circulatio necessariò est admittenda; Et maiorem quidem, ac minorem inquit euidenter conuinci Authopsia, & sensibus ipsis: constat enim, vt dictum est, singulo ictu pulsus, sanguinis aliquid exire, & alia superius adducta experimenta circulationem ostendunt; Sicuti &, apprensæ vena Caua tenaculis, promptum est videre, eam citò versus Cor inaniri, Corq; inde emori, nisi, tenacula ablata, detur aditus nouo fluenti sanguini, vt Cor in pulsu perseueret.

Two proba-
tions ex Ga-
spare Brauo.

Altera huiusmodi est: Si non daretur sanguinis circulatio, maximè esset, quia omnis sanguis à iecore per venas sursum, & deorsum, & versus omnem differentiam corporis communicaretur; Sed ex dictis manifestè constat, quod potius sanguis non mouetur à iecore versus reliquas partes, sed ab omnibus partibus versus ipsum Iecur, & Cauam ascendentem ad Cor: Ergo necessariò sanguinis circulatio est admittenda. Minor autem, in qua stat difficultas, conuincitur authopsia, per quam

quam

quam obseruatur, venam sectam infra ligaturam sanguinem euacuare, supra verò ipsam nequaquam, vt videtur in vena inguinis in cane euidenter.

Hæ præcipuæ sunt rationes, quibus paucis abhinc annis cæpit tota distributionis, alitionis, motusq; sanguinis series contrario, quàm sentirent Veteres, modo concipi primùm, inde doceri, ac postmodum apud Exteros non solum, sed & nostrates quosdam ad rauium disputari, fortiterq; teneri; putantes, imò gloriantes, hoc inuento solo nodum soluisse Gordianum tot dubiorum, quæ de contrario chyli, ac sanguinis motu, de illius interceptione, quæ apoplexiam, subitasq; suffocationes, ac mortes minatur, & parit; deq; externorum venenorum, ac medicamentorum vi actiuata iam per tot sæcula in Medicina latitabant, agebantur.

Quis Auctores
ex Acriquis
iuxta mentē
Juniorum
circulationē
hanc admittant
feriat.

Et ne omnino noua, improbabilis, ac autoritatibus destituta videretur huiusmodi Opinio, non de fuere inter Harucij Sequaces, qui opinati sunt, eandem Hipocrati probatam fuisse, vel saltē non penitus ignotam; Vt qui non semel, præsertim *lib. de insomn.*, *de diata &c.* Circuli cuiusdam meminit. Item credidere, Platonem, brasistratum, ac Aristotelem saltē in nube illam annuisse, & similitudinariē monstrasse. Sicq; generosa fronte sustinere conantur nonnulli, bis ad minus in die sanguinem totum circulariter eo, quo diximus, modo moueri, & per Cor transire; Alij singula hora; Alij citius crebriusq; Alij verò prudentius nil tale determinant, sed iuxta ætatem, naturam, anni tempus, motus, labores, animi passiones, ac similia, modò celerius, modò tardius dictum circularem motum finiri, ac perfici, autumant.

CAPVT DVODECIMVM.

Prima Harveiana ratio dissoluitur.

Aliquid sanguinis quolibet pulsus actu exprimi, negatur.

AST ad contrarias hæc rationes promptum est, & per iam dicta, & per postea dicenda respondere: Nam ad primam, qua supponitur, à Corde aliquid semper, & quolibet istius exprimi sanguinis in arterias, id expressè negatur, & iure: nam arteriæ paucissimo sanguine indigent, & spiritu magis (ad alimoniam enim partibus deferendam, vt supra traditum est, sunt ineptæ) illumq; non à corde solum, sed à toto etiam venoso genere, cui per multiplicia oscula (anastomoses vocant) vbique conueniunt, excipiunt, attrahunt, vicissimq; reddunt; illud quidem in diastole, hoc verò in systole, prout in folliculis fieri videmus: Non impellitur autem à Corde in eas semper, tū quia simul, & semel cum ijs dilatatur, & constringitur Cor, ide oq; dicendum non est, quid ab eo in ipsas exprimi. sed potius vtraque tua naturali facultate, & dilatationis; compressionisq; vi, quod sibi opus est, trahere, quod lædit, grauatuē pellere; hæc verò vtraq; indefinenter adesse, ac semper in se nōtinu

sensitivo corpore prorsus irrationabile est; tùm etiam, quia, etsi quid vel exprimatur in eas, vel ab ipsis trahatur semper: putandum tamen non est, sanguinem esse semper; cum possit, & esse aer, vel spiritus, qui omnia corporis vacua replent, omnibusq; tùm compressionibus, tùm occlusionibus facillimè cedunt, & dilatationibus promptissimè auscultant; id quòd sanguini corpulentiori non similiter competit.

Multò autem minus credendum est, tantum sanguinis expimi, vel trahi, quantum arteriarum dilatata cavitas capit. Alioqui quomodo, cum arteriæ omnes semiduplò saltem fiant in dilatatione capaciores, poterit tantum sanguinis per Aortæ principium ingredi, aut à Corde suppeditari? & quomodo, aut quà statim in subsequente systole totus attractus, vel immisus poterit in totum corporis ambitum, & ad pedes vsque temporis momento eiaculari? simul enim, ac semel omnes in toto cum Corde pulsant arteriæ, nec aliqua tactu potest vnquam motuum consequentia, vt in peristalticis motibus, obseruari: Ergo, & hic rursus dicendum est, quod aer, spiritusq; potius sunt, qui, præter modicum suæ ipsorum subsistentiæ necessarium sanguinem, in diastole cavitatem impleant, ac in systole reponuntur. Et hinc iure Galenus cum cæterorum Medicinæ Procerum consensu putauit, pulsus finem non quidem sanguinis circulum, sed natiui caloris euentationem, ac moderationem esse (vt libello de vsu puls. legitur); quæ optimè per frigidi aeris attractionem, calidarumq; fuliginum expulsionem obtinentur.

Neque enim fundamentum illud Harueij, quo supponit, in arteriarum dilatatione Cor adstringi. & in earum systole dilatari, subsistens est: quia ei sensus primò aduersatur: vbi enim arteria ferit tactum, dilatari dicitur; ergo, & sic Cor: eodem autem tempore, quo in carpo, temporibus, ac pedibus sentitur arteriarum pulsus, eodem inquam, & Cor pectus percutit. Cui euentiæ nihil detrahit, quod nonnulli obijciunt, nempe non Cor esse, quod pulsat in sinistro latere, sed Aortam: siquidem hoc obiectum manifestè refellit magnitudo moti corporis, quæ præcipuè in adaucto calore exteriori tactu subtus ferire percipitur. Nec rursus aliquid detrahit, quod, Cordis aperto ventriculo, si digitus immittatur, sentitur perspicuè in illius pulsifico ietu adstringi: quia hoc est proprium cuiusque partis sensitiuæ, se ad rei præternaturalis contactum, vt illam tentet abigere, retrahere, contrahere, & comprimere; tùm &, si in longitudine Cor contrahitur, in latitudine extenditur, si in hac arctatur, in alia elongatur, vt non multa sit capacitatis immutatio. sed & huic assertioni nostræ assentitur, & vim addit ratio, quæ supra cap. 3. in sexta obiectione fuit allata. De hoc tamen adhuc clariùs, & fusiùs agetur cap. 18. vbi ex professo talis discutietur articulus: quæ enim vtilia, vel necessaria sunt, etiam decies repetita iuuant.

Verùm dato, minimè autem concessio, in arteriarum ampliacione Cor constringi, vel, si simul dilatentur, posse aliquid à Corde in arterias in communem adstrictione propelli, prout reuera potest, & forsan facit;

iam

Nec tantum
exprimitur,
quantum di-
latata cavitas
capit.

In arteriarum
dilatatione
Cor adstringi,
negatur
ex sensu con-
trario.

iam nec necessariò semper, & quolibet istu sanguinem impelli, credendum: nam vel arteriæ plenæ sunt, vel vacuæ. Si plenæ, quomodo admittent? & quomodo sic celeriter, vniuersaliter, ac liberè constringentur? si vacuæ, quomodo circulatio? aut cur præcessis istibus non admitterant? vel admissum cur subito eiecerant? si moderatæ, cur non replebuntur tandem? nec enim, nisi plenæ, se exonerabunt. Quod si dicant, se exonerare etiamsi non plenæ, videtur absurdum: nihil enim à se expellit, quod sibi molestum, aut graue non est; non autem molestatur, quod sibi à primordijs datum, vel congenitum est, nisi exuperet, aut à bonitate deficiat: Molestatur (dicent) arterias sanguis, quamuis non impleat, cum earum liberum impediat, motum adstrictionis at cur ergo iterum recipiunt? ex impulsu Cordis, dicent, sed quomodo impulsus ille, qui sit in principio Aortæ, tanget in vno istu oculi extremitates corporis omnes? & si minimè tangat, cur non replebuntur tandem arteriæ, nil amplius admissuræ? Attrahent, (dicetur) gradatim partes ipsæ: at non semper attrahent (respondeo), sed tunc solum, cum nutrimento, vel cavitatis idonea repletioni illis opus est; postea verò concoctioni, frui-tioni, excrementorumq; expulsionì vacabunt. Ergo non semper à Corde in arterias pelletur sanguis. Alias verò non inferiores rationes ad idem iam supra audisti cap. 1. adductas, quas non immeritò hic volo subnexas.

Primirofio-
pinio non
improbanda.

Dato tandem, non tamen admissio, singulo Cordis istu non nihil sanguinis simul cum spiritu in arterias propelli, illud sic exiguum erit, vt ferè insensibile sit, & quid halituosum. Propterea non omnino præter rem Primirofius in suo aduersus Harueium opere arbitrat, non plus quàm quartam grani partem sanguinis, quolibet pulsus istu in eas exprimi. Alij guttulam vnam, vel alteram metiuntur, inter quos Cartesius, Riolanus, Reichinerus &c. vt refert Bartholinus. Quæ quantitas an possit citra circulationem quotidie à cibis sumptis compensari, ac suggeri, nemo non nouit. Sed si mus generosiores nos, & concedamus grani dimidium, non ne ex pastu, in quo quatuor, quinque, & sex libre, cibi, potusq; assumuntur, ritè poterit subministrari? Dempto enim stercore, urinæq; crudioris modicoper emulgentes venas à renibus primum attracto, necnon bilis, atræquæ sæcis pauxillo à liene, & felle expurgatis, quæ omnia simul iuncta in sano homine vix ad assumptorum quartam, vt sensui patet ascendunt; reliquum tùm feri, tùm bilis vtriusque, ac pituitæ vnâ cum sanguine (: his enim omnibus massa sanguinea constat) venas peruadit, vsquequò refocillata fuerint omnia: expurgantur quippe postmodum tùm per venas, tùm per arterias serum, ab alijsq; partibus fordes, ichoræ, qui ab vltima coctione supersunt. Ponamus igitur, hominem mediocrem per cibum, potumq; quatuor succi libras accipere singulo pastu; dempta vna, tres remanent, quæ iteratè (bis enim plurimi cibantur) libræ sex erunt. Computatæ viginti quatuor horis pro die, iam tres vntiæ pro earum singula erunt, quæ

Siue quàm
grani dimi-
diū sanguinis
posse pro sin-
gulo pulsus
istu à iecore
suggeri

grana

grana pendunt 1728. Nunc in numero istuū vnus horæ, nec stemus Primirofio, qui, referente Conringio, septemcentum solos numerat, nec Conringio ipsi, qui ferè duobus millibus acquiescit, demusq; esse tres mille, & amplius; constat, magis, quàm dictum grani dimidium, pro quolibet istu posse suggeri. Et quid de his, qui ter, quaterq; in dies singulos cibantur? quid de ijs, qui quinque, sexuè succi libras singulo pastu ingurgitant, & qualibet hora largissimè epotant? nec nisi seculi in die, vel alternis diebus egerunt? Et quid si alternis tantum istibus expellat Cor, vt probabiliter supposuimus?

Neque hic mihi obijciant id, quod per nos singulæ partes per venas attrahunt: quia, si nobis stetur, sicuti nec totus sanguis in Cor abit, ita nec quolibet istu attrahit Cor, nec rursus quolibet educit; sed tunc solum, & id, quo sibi, & cæteris indigere videtur; Qui arbitramur, pulchrum motum non propriè ad sanguinem trahendum, ac reddendum sibi à Natura donatum (quippe naturali validissima facultate potitur), sed propriè ad aerem, spiritusq; tùm intrò ducendos, tùm cæteris communicandos; quamuis, vbi respiratione pectus priuatur, in anatomica pectoris confossione, cum ei non detur amplius per propria venalis arteriæ, & arterialis venæ oscula aerem inspirare, cogatur, & sanguinem in dilatatione suscipere, sic vacui natura ferente, & ipsummet reddere per Aortam, quousque ei cum vita talis conceditur motus; Cum verò gratis ponimus (minimè concedentes tamen) aliquid à Corde singulo istu propelli, subintelligimus cætera etiam Partis dogmata, nempe totum à iecore costum succum per Cauam ad Cor ascendere, indeq; per arterias toti corpori, & consequenter venis communicandum; quod fieri citra circulationis necessitatem posse, hic comonstrare tentauimus ad abundantem, & forsan peregrinum: Vnde secundum hæc valerent solummodo Aduersariæ rationes in præternaturam se habentibus, & his, qui non aluntur, vtpotè in quibus non suggeritur à iecore sufficiens sanguinis quantitas ad Cordis actioni inseruiendum, vel ob inspirationem ablatam aer illimet per propria oscula attrahendus ob aperitionem pectoris denegatur: minimè autem in sanis, & decenter cibatis, quibus Natura, cuncta ordinatè disponens, ea alimenta, potulentaq; appetere, capere, concoquereq; concedit, quæ ad corporis instaurandi, & viuificandi munus idonea, ac sufficientia esse, cognoscit; & ea inspiratione, expirationeq; vt disponit, quas ad pulsus manutationem, cordisq; euentationem aptas esse, non ignorat.

Sed hæc pro abundanti sint posita, & vt Neotericis pateat, etiam cum fuisset thesibus Circulationem sanguinis à sanis hominibus esse arcendam. Et hic lubens prætereo opinionem Parisani, existimantis, solos spiritus a Corde in arterias pelli, & e contra sanguinem ab Aorta in Cor pedecentim reponi; cuius fucinam in liene statuit: cum eam omnino inutilem, & rationi absonam arbitrer.

His prælatis, non vrgent argumenta adducta: Nam ad primum dicatur,

Obiectio sanguinis per venas in coepna euntia contra non nil operatur.

Parisiensi opinio scilicet.

Respondetur ad primum experimentum.

citur, illud nihil probare; primo, quia à diuersis non bene infertur: non valet ergo argumentum à vase vulnerato ad integrum: certum enim, si vulneretur arteria, semper aliquid sanguinis in locum vacuati successurum vsquequò in corpore aderit; sic ferente vi vacui, doloris præsentia, agonis molestia, & calidi, spirituosiq; succi natura sibi exitum per patefactum à pulsu vulnus affectante: At, si integra sit, sicuti nil vacuatur, nec consequenter aliud confluet. Secundò quia Cor sanum adeo moderatè mouetur, vt ne quidem aliquando tactu foris in carnoso habitu percipiatur: at, si lanietur, euellaturq; non pulsu solùm, sed etiam saltu, & cum tensione mouebitur, itaut à manu apprehendente vix detineri valeat, & forcipe aliquando sit opus, vel tenacula. Cumq; ideo violenter se contrahat, non mirum, si in arterias quoque singulo ictu impellat, quæ ipso debiliores, adde, & sauciæ, tum excipere tenentur, tum auidæ, vacui timore imò trahunt. Tertiò quia ob mortis horrorem totus ad Cor sanguis à partibus per venas demandatur; illud verò timore oppressum, ac se viribus concidere sentiens, latè excipit, ac in arterias, quæ sui veluti appendices sunt, quoad potest, fusè reponit; Et tandem, quia inspirati aeris commoditate sablata, tenetur Cor sanguinem necessariò in dilatatione excipere, & similiter in constrictione expellere; Quæ omnia cessant in sano, læto, integroq; homine, vt dictum est, & dicitur infra.

Respondetur ad secundum experimentum.

Ad secundum pariter dicitur, quod ligata Aorta in radice, cessat, ac interceptus pulsus non tantùm in vniuerso corpore, sed & puillò potest in Corde ipso, quod transpirare prohibitum, statim à copia re-
tenti spiritus suffocatur non secus, ac occlusa flamma, quæ aerem trahere, ac fuligines emittere vetita, subito interit: quare, si tunc feriatur iugularis arteria, statim quidem sanguis in ea existens vacuabitur, vt qui fluidus, calidus, & spirituosus, sibi aperto lancea foramine, spontè exit: à venis autem non educitur: quia ex his ab emoriente Corde nec trahitur, nec à se pellitur quicquam, sed confunduntur omnia; nec ab arteria ipsa, vt quæ per ligaturam motu priuata est, per anastomoses allicitur aliquid: Ergo non quia simpliciter cesset Cordis impulsio, ideo suffocatur; nec quia à venis in arterias per anastomoses aditus non adsit, idèò venæ plenæ remanent in similibus, vt malè opinatur Conringius: sed quia, & eidem spiritus libera transfluxio, vt strangulatis respiratio, & arterijs per motus ablationem attractio denegatur.

Respondetur ad tertium experimentum.

Tertium experimentum multò magis claudicat: quantum enim differat vas integrum, & occlusum, ac plenum ab eodem rupto, aperto, vel inani, neminem latet: sicuti namque integrum, occlusumq; quamuis vacuum, non nisi pedetentim, & ebulliendo, per solitatum foramen liquorem supra innatantem recipit, sic aere locum sibi, ac exitum quærente, vt in cadis vino implendis, si lateris foramen clauditur, quotidie practicitur; vbi si infra, vel alibi vas ruptum, vel cæsum sit, voraciter, & affatim recipit; sic etiam illud idem plenum, quamuis apertum, & affluenti

affluenti humori peruium extet, vel nil, vel id minimum, quod intus deest, recipit; vacuum verò introcunti succo optimè locum præbet. Tale quid in Corde puta. Si integrum sit, sanguinemq; sibi necessarium, vt in sano homine putandum, quantumuis aperiat osculum versus Cavam sanguinem plenam, vel nil, vel minimum recipiet; illud quidem, vbi vena arteriosa, occlusa a sygmoidibus, nil ob pulmonis in expiratione arctati compressionem a corde exceperit (quod saltè alternis pulsus ictibus, ob respirationis duplo saltè tardiores motum, & interquietem sic longiorem, contingit), hoc verò, si quod illa in sui dilatatione inspirationem consequente exceperit: resistit enim introituro succo, & sanguis, & spiritus, capacitatem occupantes, nihil dilatatione iuvante, ob aerem ab inspirante pectore præcurrentem: clauditur namque Cordi arterialis, non confestim, quò ingreditur aer (vt ait *Hipp. lib. de cord. num. 10.*) Si verò excisus cordis mucro sit, quotiès, quanta, & quam diuturna fiet osculi Cauæ dilatatio, totiès, & tantum sanguinis ingreditur, nihilo introitu prohibente, introgresso autè siue sanguine, siue spiritu foras immediatè labente.

Idem de Aorta pensita: in eam enim, si integra sit, cum iam sanguis, & spiritus pro sua capacitate adsint, sitq; illius os tricuspidibus membranæ communica, quantumuis à Corde pellatur sanguis, aut nil, aut modicum acceptabitur; illud scilicet, si plena ad salubritatem extet; hoc autem, si aliquid dissolutum, aut dissipatum, vel vtrò missum fuerit; Nil diastolis dilatatione releuante, ad quam, vti festinatissimam, & à subsequente constrictione subito occupatam plerunque spiritus, vel aer, vel quid subtilissimi succi volitat ab vndique positis poris, anastomosis, & hiantibus oscillis; nilq; systolis constrictione obstante, cum per arterialem venam possit introgressus aer in occlusionem retrogredi; Quæ omnia, præscissa arteria, cessant, vtpotè cum nec membranulæ, nec inclusus spiritus, nec sanguis, nec parietum adstrictio obstant, sed sanguis ex se ipso, statim ingressus, effundatur, & labatur improspere, & spiritus evanescat omnis.

Ad quartam verò, quò manifestam Cordis impulsione probare autumant, sic respondeo, quod ligata arteria longè a Corde, quantumvis tendatur, ac intumescat versus Cor, versus verò extrema dimittatur; non tamen id ordinarium sanguinis impulsus a Corde in illam argui; cum huiusmodi distensio a solis spiritibus adauctis ob interceptam, ac decurtatam solitam viam possit provenire; illa verò demissio ab ipsorum dissolutione. Quod autem a spiritibus tendantur, ac turgeant arteriosa vasa, nouum non est in viuente, in quo videmus penem, vterum, mammarum papillas a spiritu citissimè inflari, & spiritu dissoluto, vel abeunte, deijci actutum.

Posito verò, non autem admissio, quod à sanguine hoc esset, dico, arterias esse tamquàm Cordis germina, ac appendices quosdam, & ideo ad recipiendum omne, quod ipsum contristat, apertissimas: Ipsum verò

Respondetur ad quartum experimentum.

tunc molestat sanguis, qui à toto corpore ob mortis horrorem ad illud tamquam in vitæ Arcem præcipitose consilio per venas impellitur. Et hæc nunc causa erit, cur venæ versus Cor, Cor autem versus arterias sese tunc temporis indefinenter exonerent, quando opera Naturæ ob violentiam nimiam sibi illatam, vel silent, vel peruertuntur, vel præcitantur omnia; quæ de sanitatis tempore, ac constitutione arbitrari, omnino vetatur tum à Natura ipsa, ordinatè, ac suauiter cuncta disponente; tum à vasorum positu, capacitate, forma &c., secundum quæ id solum pellunt, & excipiunt, quod sibi congruit, prodest, intenditur, contenditur.

Respondetur ad quintum experimentum.

Quintum experimentum non magis cæteris fidum existet, si consideretur, Cor mortuum quantum à viuo differat, & in sua constitutione, & in actiuitate: nam quoad primam, nulli dubium, viuum Cor circumquaque ob calorem diffabile, vt ideo possit pro sui dilatatione vndique spiritus, aeruè, citrà succi necessitatem, intromitti, & in constrictione similiter educi; quod, mortuum, restringitur densatur, & distationi ob frigiditatem ineptum redditur. Quoad secundam quoque manifestum est, Cor viuum ab intelligentia sua naturali non errante ad intromittendum id solum, quod sibi expedit, pellendumq; similiter, quod molestat, duci: mortuum verò id omne recipere, quod capacitas sua fert, & educere id, quod constrictio allata importat: Ideo incongrua comparatio, incongruum experimentum. Verum cum his omnibus, supposito primùm, in viuo corde non plurimum sanguinis admitti, tum quia spirituum minera est: tum quia sic corporiæqualiter pulsanti competit; tum quia nec vlla alia corporis cauitas ad satietatem, & ad tensionem impletur, sed ad quandam mediocritatem, Naturæ benè visam, reliquo spiritibus, propriæq; libertati donato, vt videmus in venis, ventriculo, intestinis &c., æqualis, vel similis fiat experientia in Corde extincto, & inuenimus, non benè à capacitate ad contenti, & excreti quantitatem argui. Cor igitur sanguine, aut alio succo ad quandam mediocritatem impletum, ad quandam quoque turgorem diafoli analogum spiritu inflemus, inde modicùm constringatur, itaut systolem pro posse imitemur, & videbimus spiritum, vt volatiliorem exprimi, succo intus relicto. Sic Cordi vsu venire viuenti, ratio omnis dicat: non enim vtrius instar succo solo adeo oppletur, vt in leui sua constrictione conijciendum sit, sanguinem eiaculari semper, nedum in quantitate semenciæ ab Harueio, & alijs quibusdam prætensa.

Respondetur ad sextum experimentum.

Sextum autem experimentum minus adhuc efficax ad concludendum, vt aduersò supponunt, existimabitur à quolibet meditante comparationis inequalitatem: Sexta namque arteria sanguinem fundet primò, qui in se ipsa, sibi què continuis ramis iam continetur proculdubio; cum arteriæ simul omnes in cauitate concurrant, succumq; labilem non solum, sed spirituosum, & fugacem contineant. Secundò eum, quem à corde recipit non solum, sed imò ob vacui timorem validissimè trahit.

Tertio

CAPVT DVODECIMVM. 165

Tertiò quem simul à venarum anastomofibus, vbique simul conspirantibus, sineq; valuulis, vtrinque peruijs, attrahit; quæ in assumpto Conringiano probando cessant: integris enim arterijs, & Corde naturaliter pulsante, impossibile, nedum difficile est, tantum à Cordis impulsu sanguinem expelli.

Vltimi autem experimenti fallacitas iam supra ex responsione factâ eidem, per quod tentabant probare expulsiorem sanguinis ad quemlibet pulsus ictum, manifesta est: eadem enim ratio, quæ de numero inconcludens illud monstrabat, de quantitate quoque continua valet.

Videat nunc ergo Conringius improprietatem exemplorum, per quæ vallet deducere necessitatem, ac velocitatem Circulationis suæ, & quàm immeritò Primirofium arguat dicentem, cardiacæ pulsionis ad arterias quantitatem esse ex Anatome inuestigari impossibilem: tum & præcipuè spiritus à Corde propelli: ex supradictis enim intelligere poterit, quàm leuia sint, quæ ad retundendas illiusmodi propositiones, attulit propugnacula.

CAPVT DECIMVM TERTIVM.

Secunda ratio Harveiana dissoluitur.

Secunda aduersaria ratio quàm sit à veritate longinqua, ex ijs, quæ supra capitibus octauo, nonoq; dicta, & sufficienter probata fuere, patet; quicquid videantur contrarium annuere speciosa ex illius parte adducta experimenta, quæ si incudi tradantur, videbuntur inutilia. Et vt in genere aliquid ijs respondeatur, maximè animaduertendum est, valde labilem, ac ambiguum haberi fidem à signis tormentorum vi, & mortis imagine extortis: non secus enim, vt historiæ tradunt, & Leges sanciunt, inefficaces, ac debiles depositiones à testibus torturæ traditis habentur; vt propterea eas extra tormenta repeti, siuè ratificari, sit opus, quò indubia, & fidelis existimetur confessio. Eodem prorsus modo quæcunque de sanguinis, aliorumue naturalium succorum motu à viuentis corpore, sectionum, vellicationum lacerationum, torsionum, pressionum, necisq; spectaculorum medio experimentosa indicia defumuntur, vel nullam, vel omnino leuem fidem merentur. Natura siquidem irritata præcipitat, perterrita confunditur, dilaniata aberrat, cuius satiscit, cedit, turbatur, omniaq; præpostero modo sua ferè molimina monstrat.

Signa tormentorum, necisq; vi extortis infidelia sunt.

Ergo quid fidelitatis signi sperandum est ab animante, cui pectoris os confossum, crudeliq; cultro apertum sit; Cor à pulmonibus seiunctum, à pericardio diuulsum, forisq; manibus, aut tenaculis dirè tractatum; totum corpus diris ligaminibus vinctum; sublata interim gemitus quoque, & lamentantium vocum commoditate? An tunc naturaliter ipsum pulsare, trahere, pellere, agere, excipere, aut retinere putandum?

tandum? Peream ego, si putem, quid ordinatè, & secundum Naturæ leges circa sanguinis motum, ac pulsus in similibus succedere: Vt enim natura ordine gaudet, omniaque suauiter disponit; ita violenta, præternaturaliaque modo, naturalique ordine carent. Vt ideo non parùm admirer, doctissimos Viros adeo Autopsiæ in viuus animantibus cæsis adhibere confidere, vt omnia, quæ in sic dilaniatis victimis succorum, sanguinisque motuum signa conspiciuntur, pro tot demonstrationibus eorum, qui in sanis, hilaribusque fiunt, habeant, & fateantur.

Hoc responso omnibus fermè adductis; adducendisque experimentis satisfactum puto: Sed vt ad particularia descendam, primum experimentum ad secundam Harueianam rationem firmandam deductum, nihil probat: Nam, præterquàm quod in Galenica disciplina omnibus confessum est, Cauam venam à iecore ascendentem Cor versus, & ad omnia superiora membra (sicuti, & alteram ad inferiora) sanguinem deferre; ideoque mirandum non est, illam, tenaculis apprensam, versus Cor inaniri, & infra turgere, cum talis sit eius naturalis, & ordinarius motus, ac vsus; Dicitur etiam, tunc temporis venalem sanguinem præcipuè ad pectus, vbi per sectionem illi exeundi commoditas datur, conuolare tùm quia talis est natura fluentis succi, vt suam continuitatem seruet ad possibile, & ob id consecutione ad id, quod educitur, etiam in exterioribus per planum a manufactis tubis succus transfluit; tùm quia naturaliter pars parti compatitur, & ad succurrendum spiritus sanguinemque transmittit; tùm quia Cordi maxima inest attrahendi facultas, vt ait Gal. 6. de vñs part. cap. 15., & maior, quò magis indiget, vt in sanguinis, ac spirituum effusione, in Anatome fiente. Ea autem omnia vel cessant, vel sensim vigent salutis tempore, quò hec vulnus aperitur, nec pectus patitur, nec Cor præternaturam indiget. Ex illo ergo experimento non arguitur, sanitatis tempore Cauæ, ac venarum sanguinem in Cor tam breui, ac totum abire; nam præter iam dictam disparitatem occasionum tunc, & alias vigentium, hoc etiam considerandum; Cor videlicet sanum moderatè moueri, ac pulsare, & sic moderatè quoque attrahere, moderatèque pellere, & per consequens id solum, quod ex quotidiana refocillatione subministratur: laniatum, verò, ac impiè adactum, sicuti validius mouetur, ita & validius tùm trahere, tùm pellere, ita dilatactionis, constrictionisque pulsficæ natura operante: Vnde non sine causa ad illud venalis totus tunc confluit sanguis.

Hanc responsionem opprimere sibi videtur Conringius cap. 36., dum aduersus Pruniosum Iolis verbis negat, Cor in Anatome validius moueri, qui hac forsitan ratione fretus sic pronunciauit; nempe quia Inconsonum videtur, partem afflictam, ideoque ægram validius agere: Sed frustra hæc obijcit primò, quia in principio luctæ anatomicæ, dum vires validæ sunt (sana namque animalia, non ægra cultro subijciuntur) verissimè validius mouetur Cor, ad sibi illatam violentiam propulsandam non secus, ac homo iniuriatus, aggressusue, qui ferociùs, vehementiusque;

Ad primum
experimentum respon-
do prima.

Altera res-
ponso.

Tertia re-
ponso.

Contra hanc
Conringij ob-
iectio.

Dissoluitur.

mentiusq; imperit, quàm quietus, ac pacificus. Secundò quia ubi non validius, eo quod ex dissolutione spiritus, ac sanguinis ob dissectionem insequente vires facillimè fatiscunt: frequentius tamen, celerius, & magis Cor pulsatur, sic à spiritu, sanguinis, corporisq; varijs agitationibus, & animi commotionibus aucto calore poscente; exemplo febricitantium, in quibus, etsi ægris, sanoq; debilioribus, pulsus maiores, citiores, crebrioresq; observantur: hoc autem ad maiorem sanguinis attractionem ac pulsionem sufficit: quia si aduersarijs dogmatibus insistentum, sola maior, vel minor dilatio, & contractio, sicuti, & ictuum crebritas, non validitas pro pulsione, & attractione attenditur. Tertio quia, etiamsi verum esset, quod nec validius, nec magis moueretur Cor in laniatis; hoc tamen non efficit, nec vetat, quin cum eodem pulsu possit validius, & voracius in his trahere ob effusionem sanguinis, & auctum calorem: non enim sola vi motus, sed & naturali sua magnetica facultate, quam omnium membrorum validissimam possidet, Cor (sicuti, & arteriæ) trahit ex *Gal. lib. 3. de nat. facult. 14. & 15.* iam citatis; sicuti, & ob validissimam suam calorem, quem Conringius ipse cap. 42. inter circulationis causas adnumerat: à nullo autem alio naturalis facultas ad trahendum magis inducitur, quàm à penuria alimentitij succi; nec ab alio calor innatus acuitur magis, quàm à laboribus, & motu. Quartò & ubi quis mordicus teneat, Cor in similibus, vti afflictiſſimum, debilius esse, sicq; & debilibus moveri, & seignius trahere, prompta responsio est, ex hoc quoque non bene ad Cor sanum, ac validum argui, quia sicuti hoc, ut secundum vegetumq; toti corpori suas largè gratias impartitur; ita illud, vti oppressum, vel in se cuncta reuocat, vel saltem, quicquid grata membra omnia errabundè retribunt, & præcipitanter reddunt, recipere, & in sua æraria, quæ arteriæ sunt, insatiabiliter reponere cogitur non aliter, ac ventriculus in fame canina dicta, in siti inexhausta, in labentibus præ angore viribus nonnunquam peragere cernitur.

De Aorta autem, quod sanguinem, ac spiritus à Corde recipiat, ut dictum quoque est, non ambigitur: sed quod sic præcipiti modo, & singulo ictu, cum sanum, & lætum corpus est, recipiat, & deuehat, vti in conuulso, ac laniato accidit, id prorsus irrationabile duco, satq; in præcedenti capite oppositum digito monſtravi. Quinimò in indigentijſiſſimo ipſummet Cor attrahere sanguinem ad sui nutritionem, non à Cava tantum, sed & ab Aorta, non dubito: seruatur enim in similibus ea proportio, quam Galenus insinuat, ut scilicet validiora membra trahant à minus validis, vacua à plenis, vsquequò ad omnium imbecillima sit peruentum, non renuente caruncularum, sed membranularum epiphyſi, quæ non prohibet, sed solummodò remoratur ingressum.

Neque maioris momenti illud est experimentum de venis exutis, ac ligatis, quæ versus Cor videntur inaniri, versus verò membra intumesce, contra quàm conspiciatur in arterijs: Nam & hic idem respon-

Ad alterum
experimentum
respon-
sio.

sum

sum valet; nimirum alius motus spontaneus, ac naturalis, alius coactus, & violentus est: contraria namque hæc sunt, siue opposita, à quibus non bene inferitur, nisi ad oppositum. Huiusmodi verò motus violentos esse, patet ex causa, quæ violentiam naturæ insert, nempe ligatura.

Ligatura duplex, simplex & complicata.

Duplex quippè ligaturæ consideratio, sicuti, & administratio est, scilicet, vel simplex, & cum modico, vel nullo dolore; vel complicata, hoc est cum excorticatione, dolore, terrore, concussione &c. Vtraque autem quid præter naturam est; cum corpori per eam addatur compressio, & aliqualis molestia, quæ reuera naturalia non sunt: Differunt tamen inter se, quod quæ sine vilo, vel pusillo dolore est, pusillam quoque naturæ violentiam affert, itaut, illa ferè spreta, à suis ea motibus naturalibus non absterreatur, imò potius illi stimulus aliquando addatur, quo motus suos cum maiori energia, & efficacia perficiat. Quæ verò cum diuulsione, dolore ingenti, animiquè terrore complicata est, sicuti Naturæ nimiam violentiam insert, ac ferè deterret, ita & illius naturales motus adeo deprauat, vt vel in oppositum ferantur, vel præcipitanter, & inordinatè edantur. Simplici igitur ligatura brachio integro, crurivè adhibita, neque cis, neque vltra depletur vena. Quinimò, nisi arctè nimis adstringat, ex vtraque repletur parte; id quod in pedibus, vel manibus detentis in compediunt, & manicis ferreis, quæ vtrinque intumescunt, videre est. Causam verò, cur versus extrema concitet ligatura supra visa est cap. 8. At si, excorticato membro, venaq; euulsa, cum cespitiæ cultri, & necis apparatu, corporeq; ferociter ardato, aliqua vena ligetur, non mirum, tunc eam versus Cor inaniri, versus verò membra tumescere: duplex enim tunc causa insurgit, ex angore cordis oboricens; eiusdem scilicet ab omnibus partibus velox attractio sanguinis, & spirituum; tum & omnium membrorum ob compassionem ad idem, vt opem ferant, impulsio: compatiuntur siquidem Principi membra omnia, & suppetias mittere arbitranua, suo se fotu spoliunt, & ad illud proprias dirigunt merces. Hinc vltra turgor, illinc citra demissio oboritur.

Quid simplex ligatura efficiat.

Quid complicata fiat.

In arteriis oppositum, occurrunt tribus de causis.

At cur, inquiunt, in arteria non idem, sed contrarium experimur motum? Triplex huius adduci potest causa, quarum prima ea est, quam in capite antecedenti tetigimus; nimirum arterias esse propria Cordis germina, ac veluti appendices illius, ideoq; ad recipiendum omne id, quod Cor contristat, aptissimas: cum ergo tunc Cor ad angorem leuandum insatiabiliter sanguinem a venis recipiat, consequenter in illas sese exonerat; veluti, & ventriculus, indeficienter epotans, vel comedens, in intestina quoque indeficienter eructat. Altera est, quod non solum sunt aptissimæ ad recipiendum, quæ illud molestant, sed & veluti eiusdem æraria sunt, in quæ tempore sanitatis suas opes, spiritus nempe, ac sanguinem depositat: ergo nec mirum, tunc temporis, quando vniuersus sanguis per venas ad Cor, veluti ad arcem, confugit, in arterias, vt in proprias cauitates, reponi. Tertia est, quod arteriæ Cordi innata vasa,

vafa, illius paffiones citiffimè perfentiunt, vt cognofcitur in animi affectibus, per quos fubito alterari pulfum, fentimus; cum & eodem prorfus modo, quo Cor, mouentur: quare tamquam illi adftantes ancillæ, ad ipfius nutum non recipiunt folùm, fed & fimul fe dilatantes attrahunt, vt & illud imitentur, & fimul fubleuent. His verò, & quartam addamus caufam a Parte admiſſam, nimirum valvulas in principio Aortæ adnatas, quæ verſus Cor clauduntur, aperiunturq; in arteriam, contra quam fit in fine Cavæ, quæ in Cor aperitur, clauditur verò in venam: quare cum in Anatome viui animalis ob ſummam violentiam in motu ſint omnia, neceſſe eſt, vt exitus ab ijs quærat, prout loci natura, & neceſſitas ſimul ſuadent non è contra. Silent autem omnia hæc in Natura pacifica, quæ comiter omnia ducit, & per determinatos ductus ordinatè, quæ ſola moueri debent mouet, quæ quieſcere habent, retinet, quæ ſuperflua, vel moleſta ſunt, repellit, vel expellit: Male ergo ab his, motibus, qui luſtæ, & turbationis tempore conſpiciuntur, eos, qui ſanitatis tempore vigent, meſurant, arguunt, limitant, comparant. Neoterici: quantum enim belli, præliq; motus à pacis, & pacati regiminis motibus differunt, tantum lanienæ motus à ſalubris Naturæ motibus diſtant: Eſt quippe in Anatome pugna inter Naturam, & vim, inter Vitam ac necem; quæ ſalutari in diſpoſitione abeſt, totaq; in gaudia, ſuauitates, nutritiones mutatur, & deſinit.

Quarta ad
idem addi-
tur cauſa.

Tertij verò experimenti inutilitas ex ijs, quæ ſupra cap. 8. declarata, deſcripta, & concluda ſunt, ſat ſuperq; conſtat: Ab ijs enim, & huius declaratio promptè habetur; quod nempe in aſſæta ligatura, ſi vena ſecetur inferius non diu ſanguis fluit, quia intercepta ſic via eſt venis ſuperioribus, per quas, & a quibus fluere poſſit ſanguis: in moderata autem fluit cum impetu, quia liber ſimul, & cum citatione, a ligatura impellente, per eaſdem venas fluenti ſanguini datur aditus. Supra ligaturam verò ſi vena ſecetur, & parum, & ſine impetu exit; quia ligatura, non verſus truncos, ſed verſus germina, impetum facit, ideoq; vena concidit, niſi ſanguis iuſto calidior in corpore febrili ſit: tunc enim, & ſine ligatura, & ſupra ipſam vena incifa ſanguinem effundet.

Ad tertium
experimen-
tum reſpon-
ſo.

Quod autem ſupra ligaturam vena non inaniatur ſpontè, patet viſui, vt ſupra cap. 7. dictum fuit: nam ſi in ſumma manu, vel alibi vena aliqua exterior vngue, aut alia ſubtiliore prematur adco, vt occludatur, videbimus, eam ſupra prementem rem (adde, & infra) eandem manere, nec detumefcere, quod melius adhuc videbimus, ſi ſuperius alia ligatura addatur: ſic namq; ſtatim, ſi latus funiculus ſit, in ſpatio intermedio illam aliquantulum turgentem obſeruabimus; ſignum, ſanguinem in illa commorari, non aufugere. Sed &, ſi ſectæ ibidem (nempe ſuperius) vena ſanguinem fundit, vt omnes admittunt (etiſi modicus exeat, ac lente) an vacua vena dicenda ibi eſt?

Supra liga-
turam venam
ſpicere non
inani præ-
batur.

Minus facit id, quod additus pollex infra venæ vulnus ſtatim ſanguinem; fluentem ſiſtat, quaſi ſic ſanguis ab extremis veniens inhibeatur.

Ad quartum
experimen-
tum reſpon-
ſo.

hæc enim vera causa non est consistentiæ ; sed benè quia sic melius vniuntur vulneris parietes , & quia statim , simulq; ligatura tollitur . Et illud quidem patet : quia si benè pollice superius adaptato , vulnus vniatur , ligatura sublata cessabit exitus : ea verò non sublata siuè superius , siuè inferius , pollex adhibeatur , non sistetur fluxus , nisi vulnus ipsum aut pollice , aut fascia obturetur . Addunt ergo Chirurghi pollicem infra , non quia inhibeatur sic sanguinis impetus melius , quam supra adhibito ; sed verius , quia sic commodior illis , & ad manus , & ad oculos succedit vulneris adaptatio , medicatio , & alligatio , vt cuique consideranti , & experienti patebit .

Ad quintum
experimentum
respondio .

Vltimum experimentum inefficax quoque est : nam si strictè brachium ligetur , sentitur supra ligaturam quidam veluti sanguinis impulsus , seu nixus , & calor , non solum quia arteriæ , sed etiam quia venæ implentur , ob impulsum scilicet in partibus superioribus à dolore , & angustia ligatæ partis sibi naturaliter contiguæ , & ab illis dependentis concitatum : compatiuntur enim membra membris , seseq; mutuo spiritibus , & sanguine fouere contendunt . Laxato autem ligamine , sentitur sub digito sanguinis excursus non in arteria quidem , quæ profundior plerumque deridet sensum , sed in vena , quæ cuti proximior , non tactui soli , sed & visui ipsi in gracilibus sese præfert . Refrigerabatur equidem paulatim manus ex interceptis spiritibus , influenteq; calore præcipue , sed & secundario , quia , natius partis calor , arteriarum pulsu , illius moderatore priuatus , veluti suffocatus languescebat . Inluit autem ad partes calor à Corde , non solum per arterias , sed & per venas , vt sensatè monstrat *Gal. lib. de usu puls. cap. 3.* Proinde si sola arteria ligetur , non valdè illud membrum patitur , vt cap. 2. priùs dixerat . Ascendit inde , laxato vinculo aliquantum refrigeratio illa , non quidem ex ascensu refrigerati sanguinis per venas , sed à qualitate ipsa , à parte post partem communicata .

In summa quicquid à sensatis his experientiis conantur pro illius propositionis verificatione elicere , potius acutiem iudicii , & ingenij solertiam ostendit , quàm probatam veritatem : Quantumcunque enim omnia , vt ab ijs ponuntur esse , admittantur (licet de multis ambigi fas sit) ; nihilominus quid aliud probant , quàm presentem motum ? Is tamen à circulari quàm abest ! quàm à perenni ! quàm tandem à naturali , & salubri !

CAPVT DECIMVMQVARTVM.

Tertia Hærneiana ratio soluitur .

Nunc ponderanda veniunt , quæ pro tertia ratione afferebantur , vt certò cruetur , nùm pro circulatione concludat . Et quod adsint in quibusdam venis , præcipue artuum , quædam membranulæ nonnunquam

nonquam solitaria, nonnunquam binæ, & mitrales, vel seminulares, à quibus versus extrema claudatur cavitas, & aliquo modo impediatur sanguinis transitus ad ea versus; id conceditur: sic enim multi posuere Auctores, & de hoc patet sensui. Quibus membranæ propterea à suis adinuentoribus valvularum nomen inditum est, sumpto nomine à similitudine officij illis assignati, quam cum ostiorum, ac fenestrarum valvis ipsas possidere, tradunt, claudendi scilicet transeuntibus exituram.

Sed his concessis, quid tum sequetur? num propterea sanguini omnino negabitur transitus commodus, & competens pro necessitate alendarum partium? non quidem: huiusmodi enim offendicula formauit natura non quidem, ut sibi via tollatur omnino; quæ scit, & per carunculas, & per membranas, & per ossa ipsa, nedum per valvularum rimulas, transmittendo succo aditum parare; sed solummodò, ut à violentis moribus, & ab ea non intentis fluxibus illas saluet cavitates, utq; sibi lacescit sit aliquod frænum, non retenticulum; iuuamen, non impedimentum; angustia, non obturatio. Sic gutturi operculum, epiglottis dictum addit, quò res bibitas, & comestas inhiberet, aeriq; frigido ingredienti aliquo sanò modo occurreret, ne scilicet affatim ingrediens plus æquo refrigeraret: à quo tamen nec illas omnino, nec hic aliquatenus, ingredi verantur. Sic inter Cordis ventriculos septum fabricauit, ne libera præberetur via sanguini, sed ut per illud huius pars tenuior, & spirituosior tantum lentè pertransire, vel potius exugi, seu percolari cogeretur. Sic in iecore ipsius carnem inter venæ Cavae, & Portæ radículas (si Galeno, alijsq; permultis stetur) interiecit, ut moram transeunti, & sanguificando chylo, non transitus prohibitionem pararet. Sic in vasis spermaticis varios gyros molita est, ut lentitiem, non fluendi impotentiam gignendo semini exhiberet. Ergo adfunt quidem valvulae in venis; non ut impediatur tamen, sed ut modificetur sanguinis ad extiora fluxus.

Ad quid valvulas natura efformauerit.

Et sic esse, multa clarè indicant, & deducunt; Et primò quod illas frequentiores reperire est in brachijs, & cruribus, quam alibi; quod prouidenter admodum Natura patrauit: Nam tot moribus, & brachia, & crura dicata, fuisse, ut nisi huiusmodi adessent offendicula, dubium esset, ne totus ad ea rueret sanguis, sicq; vel priuata, vel eo indigente Caua, viscera, & Cor ipsum pateretur, vel extrema ob nimium sanguinis incursum inflammarentur sæpissimè. Secundò quod, ut ipsemet ait Haruecius; nonnullæ ipsarum valvularum viam omnino non obturant; id quod de ijs dicendum maximè est, quæ vnica membranula constant; cuius structura, qualiscunq; & quantacunq; sit, nunquam poterit magis claudere versus vnā, quam versus aliam partem, quin eadem à sanguine defluente defleatur. Sed & in alijs, quæ duabus mitralibus, vel semilunaribus membranæ constant, idem supponendum est; cum sic figurata corpora non possint adeo committi, quin aliqua ex parte conuoluant, prout de simili membranæ valvula, ori arteriæ venosæ ad-

Valentia adscriptum officium probatur.

stante, insinuat *Gal. 6. de vsu part. 16.*, quæ eam excrementis fuliginosis, quæ à Corde feruntur ad pulmonem, dare transitum oportebat; Qui imò tùm ibi, tùm cap. 21. etiam in alijs Cordis orificijs, quibus valvulæ tribus membranis constantes præfunt, testatur, fieri non posse, quin aliquid, siuè dum clauduntur, siuè etiam clausis illis, refluat per ipsas sanguinis. Tertio quod liber nihilominus sanguini transitus datur per multas, infinitasq; ramusculorum cum ramulis connexiones, & coniunctiones osculorum, per quas omnes ferè venæ sibi inuicem, veluti rete quoddam, varijs modis communicant, inferuntur, connectuntur internæ cum externis, superiores cum inferioribus, laterales cum lateribus, vt optimè de multis describit Faloppius in *suis Anatom. obseruat.* Et quarto, quod huiusmodi valvulæ non in omnibus venis reperiuntur; imò plures lingo venæ, in quibus non adsunt, quàm in quibus adsunt.

A valvulis non bene signis motus ad Cor arguitur.

Ex his ergo elicitur, non benè à valvularum existentia argui continuum motum ad Cor: sic enim frustra essent; cum nil differat, Portæ valvulas adesse semper patentes, & non adesse. Quinimò contrarium arguitur: Natura enim hæc non fabricasset obstacula, nisi cognouisset motum sanguinis ad illa esse, hunc verò, vel compescendum, si libeat, vel frænandum, si sit opus. Alioqui, vbi futurus opposito modo fuisset motus, iſq; continuus, ac irrefrangibilis, melius quidem erat (vt in arterijs), libera omnino cauitates esse, quàm ijs membranulis toties iter arctari; vel si necesse erat penitus inhibere sanguinis talem deſuxum, debuisset in omnibus eas constituiffe venis, non in quibusdam tantum.

Ad contraria experientia genericè respondent.

Nec verò ex aduerso allata experimenta quicquam hanc veritatem labefactant: Nam nusquam Ars assequetur fines Naturæ. Sumatur arbor viuens, certissimum est, ipsam è terra sursum rapere alimentum; & tamen, etiam si excidatur, & tentetur via per quam humor naturaliter ingreditur, nè folle, nec chlystere, nec catethere, aliouè impingente instrumento humorem, aut aerem intromitemus. Tentet quis in animali vrinam, vel alium humorem per renes vi in vreteres immittere, roridum succum in ossa insinuare, aquam per cutem trajicere, nec consequatur intentum: Naturæ tamen opera quotidiana sunt hæc. Vt exinde quisque videre possit, quàm inualida sit illa positio. Quod non potest vis, minus posse Naturam; cum vis, & Natura opposita sint, nec quid simul esse possit naturaliter, & violentè. Si igitur Naturæ opera multoties Ars non assequitur, quæ Naturæ tamen ybique æmula, & imitatrix dicitur, quid de violentia dicendum, quæ illi e diametro opposita est.

Item & aliud est viuum tractare animal, aliud cadauer; in eo enim propter spiritus, & natium calorem omnia dilatantur, omnia communicant, omnia à seipsis manent, & inuicem reguntur cuncta, nilq; alteri graue est, non caro ossibus, non ossa cuti, non pes cruri, non collo caput &c.: In cadauere autem ob frigiditatem omnia adstringuntur, omnia separantur, & inuicem torpent cuncta; muscoli, & caro comprimunt

CAPVT DECIMVMQVARTVM. 173

primunt venas, ossa arterias, membranæ, & glandulæ neruos: Non ergo bona consequentia ab ijs, quæ in mortuo phænomena habentur, ad ea, quæ in viuente natura contingunt, vnquam sequitur. Et hæc sunt quæ in genere ad experimenta, quæ contra allata fuerant, obijci, & responderi possunt.

Ijs igitur præmissis, mirum non est, quod per aptum instrumentum insufflando, vel manu tradendo, non possit à vena axillari propelli aer, vel alius succus versus brachiales venas, qui imò in Cauam retroeant: Nam si in cadauere hæc tententur, planum est, brachij venas non solum concidere, sed à musculis, & cutæ comprimi, simulq; in varios ramulos semper angustiores abire; cum è contra Caua, multò latior, crassiorq; difficilius concidat, à pectorisq; costis, & spina æstari, comprimiq; prohibeatur: Si verò in adhuc viuente eadem tententur, sanguis ipse ob Cordis angorem ad interiora repens, & aerem, & succum facile retropellent. Hinc experimenti fallacitas.

Primum experimentum inefficax.

Quod, ligato brachio, præsertim rusticorum, intumescendum venarum nodi, in quibus valvulas subesse, volunt, si premantur versus superiora, cedant, ac inaniantur, si verò versus extrema, nequaquam; id verò ex nimia extremarum venarum plenitudine accidit, quæ ideo alium difficilè admittit humorem, vt quæ per venarum capita seu fines, vbi semper in angustiora abitur, & itineri finis adscribitur, deponi nequit; Et è contra versus superiora, semper in latiora, & per longa curricula itur, & propterea adactus humor facillimè excipitur. Fit autem in similibus, & in phlebotomandi occasione prædicta versus extrema iam dicta plenitudo tum ob præcessos brachiorum labores, motus continuo, & ad inferna pensilitatem; tum ob frictionem, quæ à venæ tumore præmittitur; tum ob ligaturam, quæ præcipuè, vbi moderata sit, versus exteriora sanguinem exprimit ex causis cap. 8. adductis.

Secundum experimentum vera ratio adducitur.

Quod item specillus in venam immisus non possit versus extrema multum longè introduci, nil facit: nam primò, vt iam dictum est, alia naturæ, alia Artis, vel vis potentia est; secundo venæ semper ramificantur magis, & quo magis ad extrema pergitur, eo exiliores, & angustiores fiunt, Tertiò in diuicationibus quoquo pacto, vel interceptur, vel intorquetur cauitas. Quare mirari non debemus, stilum non sic facile ob diuicationes, & angustias versus membra impingi, quò succus facillimè fluit, vel (ni aliud) transudat, & præterlabitur.

Tertium experimentum invaliditas monstratur.

CAPVT DECIMVMQVINTVM.

Soluitur quarta ratio Harueiana.

Nunc sese præfert considerandus finis, qui pro dicta circulatione aduersò supponitur: nam si necessarius inueniatur, admittenda, & ipsa procul dubio est; sin minus, ad quid tot gyros naturali, corruptibilisq;

*Aeris frigiditati quæ Natura pro animalium commo-
modo opposuit.*

Quid in homine ad idem infirmitas sit.

*Probat sup-
posita in ho-
mine, & bru-
tis.*

Circulationis finem esse languis recissionem, ratio prima.

biliq; succo præscribere? & cur infatigabili rotæ labilem, alterabilemque humorem subijcere? Porro si consideretur Naturæ, summiq; Opificis sapientia, ac providentia summa, non nisi admiratione dignam, & in proprijs creaturarum rerum disponendis actionibus vndique suscipiendam inuenimus; Id quod si in cæteris optimè elucet rebus, in homine, qui ad Dei similitudinem plasmatus fuit, manifestissimè conspicitur. Qui igitur aeris frigiditati, quæ tantopere pro natui animalium caloris attemperacione expetebatur, si in aliquo corporis ambitu lædere poterat, cutem, ac cuticulam opposuit; hisq; dedit, vt in brutis indurescerent, vel squammas, vel pilos, vel pennas sibi in tegumentum comites asciscerent, & his rursus, vt iuxta indigentia rationem ferrentur, deponerentur, crescerent, innouarentur, vt in dies fieri videmus; Soli homini naturalia hæc tegumenta ob illius maiorem venustatem, ac pulchritudinem cum denegasset; eorum tamen defectui pro solita sua prudentia ritè prouidit, additis scilicet vestimentis, quæ Natura ipsa docet æstate deponere, autumno assumere, hyeme duplicare, prout vel calidus, vel tepidus, vel frigidus aer perferitur; Et vbi quis ob paupertatem nequeat se necessarijs operire vestibus, videmus, ei callescere cutem, crebrescere, augeri; pilos, vel à frigiditate, vbi magna sit, extremè pati, nisi alijs vijs sibi industrius homo à Natura edoctus prouideat. Cui quidem incommodo non sanguinis circulationem mederi, sed alia, nempe motum, ignem, restrictionem, frictiones, focusq; naturaliter subuenire, videmus. Signum verò manifestum est, adaucto sine, hæc naturaliter appeti, quæri, augeri; imminuto, imminui; ablato, tolli; Sicuti et contra contrario ob adauctum calorem sine insurgente, contraria quoque, ventilationem, quietem, aquas, ac alia refrigeria desiderari, & admoueri. Eodem prorsus modo bruta omnia suis cutaneis passionibus, naturali instinctu ducta, consulendo, hyeme in latibulis, speluncis, stabulisq; libenter degunt, æstate autem ad flumina, fontes, ventos, vmbrosos lucos, & locos conuolant.

Et quod sanguinis recollectio non sit circulationis finis, nonnulla demonstret; Et primò quia in omnibus naturalibus (vbi se habeant naturaliter) videmus, ablato sine, siue cessante finali causa, cessare, & effectum, sicuti, & illa vigente, hunc vigere, illaq; languente, & hunc languidum esse. Hoc assumptum ultra prædicta aptè probant tum respiratio, tum pulsus in animalibus: siquidem cum ea ad refrigerandum, siue euentandum natium calorem à Natura instituta, sint, manifestò videmus, si ex motu, cibo, aere, potu, medicamento, animi impetu, vel alia aliqua præternaturali causa adaugeatur in Corde, & corpore calor, protinus proportionabiliter, & respirationem, & pulsus augeri, crebrescere, accelerare, nisi instrumentorum obftet defectus, vel robur virtutis elangueat: Si verò è contra ab otio, cibo, potuq; refrigerantibus, animi pauore, aeris algore, medicamento, vel aliqua morbosa causa distulmet natius calor minuitur, ea quoque, respirationem scilicet, & pulsus,

pulsus, imminui, rarefcere, morari, vel aliter demitti iuxta maiorem, vel minorem tùm instrumentorum, tùm virium Naturæ cognitam dispositionem; sicuti, & deficiente calore, vt in vteri suffocatione, syncope, interitu, ea quoque statim deficere, comperimus. At in circulationis supposito fine non sic accidit, imò è contra: Ergo malè is assignatur. Patet antecedens: nam sicuti, refrigerato corporis ambitu, magis deberet augeri, crebescere, & accelerari circulatio, non refrigerato, vel potius calefacto, imminui, vel etiam cessare; ita è contra potius videmus, eo refrigerato imminui, calefacto, adaugeri: Ex pulsu siquidem circulationem metiuntur Harueiani: at hic sub Cane, & Orientalibus plagis non minor, non rarior, sed maior, & crebrior tangitur; hyeme autem, & Aquilonaribus in Prouincijs non maior, non frequentior, sed minor, & rarior.

Dicent fortasse, sanguinem non minus incrudescere à magno æstu ob spirituum dissipationem, quàm à frigore ob contrariam qualitatem: sicuti enim hic positiua, illic priuatiua inducitur frigiditas. Hoc detur: sed quòd si temperatus, & sanguini conferens Aer Vere sit? numquid tunc refrigerabitur? non quidem: atuerò nihilominus non minor, non cessans, sed maior, sed vehementior hoc anni tempore cernitur pulsus.

Secundò si talis esset periodi sanguineæ finis, ea in febribus synochis, ardentibus, ac alijs dari non deberet, vtpotè in quibus sanguis potius nimio calore vbique flagrat, vnde potius refrigerio illo aeris opus habet, ab eoq; si frigidus paretur, non modicum iuuatur; Et tamen, si in sanis ex pulsu ritè circulationem dimetiuntur, cum in talibus is maior, crebrior, ac citatior fiat, longè celeriozem quoque circulationem fieri, dicendum erit, quod fini contrariabitur. Eademmet ratio vigeret in externis erysipellaceis, phlegmonosis, & calidis affectibus: in ijs enim dubium non est, sanguinem in ambitu refrigerari, vt in quo potius calidior seruandus sit, quàm in centro: ast nec in ijs deficit pulsus, nec minuitur, sed è contra. Ergo vel ille non est circulationis finis, vel in similibus dicendum, est circulationem non fieri, nec pulsus esse circulationis auctorem, nec eius indicem.

Neque dicendum, in præternaturalibus affectibus corrumpi causarum essentiam, & per consequens etiam effectum: nam vbi affectus naturam minimè superet, neque quicquam corrumpitur agnitio finis, & sic neque effectus: videmus enim, salubriter febrientibus sitim, frigiditatemque respirationis appetitum inesse, calida verò tùm actu, tùm potentia renui; sicuti algentibus contrarios tùm appetitus, tùm renixus inesse; quæ sicuti in potentijs animalibus elucescunt, ita rationabiliter putandum est, in puris naturalibus vigere similiter, quemadmodum, & de pulsu supra tactum est, & in cæteris facile esset ostendere.

Tertiò nec talis finis circulationi necessarius assignari potest: quia non aded à Corde distant partes omnes, quin possit sine ipsius contactu, vel reditu ad ipsum, eiusdem calore, ac spiritibus quoquo per arterias,

Quædam
obiectio tollitur.

Ratio secunda ad idem

Quædam tollitur obiectio.

Ratio tertia ad idem.

ae venas dispersis, in venulis, arteriolisq; illarum calidus asseruari sanguis, accedentibus maximè tegumentis, natura, & arte cuti admotis. Sed quidquid tandem sit, hæc valeret causa, hicq; insurgeret finis solummodo in partibus remotissimis manuum, pedum, nasi, ac similibus, quæ frigoricaeteris sunt obnoxia magis; vel in externis tantum, & cute: non autem in propinquis, vt pectore, collo, abdomine; nec in profundis, ac vndique a cute, membranis, ossibus, musculisq; obiectis, vt iecore, liene, mesenterio, intestinis, ventriculo, diaphragmate &c. multoq; minus in Cordis ipsius, & pericardij circumferentia: At cur, si in his finis deest, pulsus tamen in ipsis quoque sit, & sanguinis idem, qui in cæteris per Anatomen venarum redditus motus obseruatur? vel quæ mens pulsui præsidet, vt in illis circulet sanguinem, in his nequaquam? Constat ergo inanem esse hunc finem ab Harueio, & sequacibus circulationi sanguinis assignatum.

Transfertur
sanguinem
à putredine
non esse citu-
lationis fi-
nem. Ratio
prima.

Secundus finis erat, ne sanguis deses putresceret: At nec hic est necessarius: nam, vt dicebatur superius cap. 3. vnumquodque in sua minera illæsum conseruatur: vnde, & aurum, & argentum pura in suis fodinis seruantur, quæ alibi terræ indita contrahunt situm. Idem de aqua dixeris, quæ pura in originarijs fontibus, lacubus, ac Mari sistitur, quicquid de paludibus sit. Est autem vena, sicuti, & arteria, proprius sanguinis locus tum generans quodammodo, tum conseruans.

In obstructa
parte nec ve-
na, nec san-
guis natura-
liter se ha-
beat.

Neque valet dicere, in obstructa parte, sicuti, & in artè ligata sanguinem putrescere, quod indicat, motus interdictionem putredinis causam esse: nam si de obstructa loquamur, respondeo, tunc nec venas illius, nec sanguinem naturaliter se habere. Non illas; quia earum cauitas libera non est, vt ideo nec possint cum cæteris communicare, nec à suo principio, quod lecur est, naturalem, ac sanguificam energiam recipere. Non hunc; quia is naturalis non est, sed pluribus excrementis, vel pituitosis, vel melancholicis (qualis esse solet is, qui venas obstruit) conspurcatus, itaut nec probè a natura regi possit, nec præter naturalibus causis obistere; tum & is sibi ipsi viam præcludit naturalium, vitaliumq; spirituum, adde, & animalium, qui omnes eius proprium, ac innatum calorem foueant: Non valet autem argumentum ab ægro ad sanum, neque exemplum a dissimili ad dissimile: In similibus enim dicendum est, sanguinem non quidem ex motus defectu, sed ex prohibita transpiratione putredinem nancisci, quam solam putredinis causam attulit Gal. lib. 11. meth. med. cap. 10. Si verò de ligata loquamur parte, vel artè, vel moderatè ea ligatur. Si artè, respondeo, tunc non sanguinem solum, sed & simul totam partem paulatim corrupti, idq; ex defectu: spirituum, & pabuli, quibus via à ligatura præcluditur; apparere autem priùs in sanguine, vt potè fluido, & faciliùs putrescibili, corruptionem: Si verò moderatè, neque sanguinem, neque partem corruptendam, nisi via præcludatur spiritibus, aut obstruantur venæ, quo casu eadem viget ratio, quæ de obstructa parte allata est.

Neque

In eo non ex
motus defe-
ctu, sed ex
prohibita
transpiratione
putredinem
nancisci.

Cur priùs in
sanguine cor-
ruptione appa-
reat.

Neque ergo ex motus defectu, sed alijs ex causis in huiusmodi putredo sanguini contingit.

Quinimò nec ob desidiam sanguis in sano homine putrescere posset, quandoquidem ipsum vndeque varijs, & per venas, & per arterias motibus moueri necessariò ob varios tum corporis, tum animi motus, manifestum est: sine horum namque aliquo corpus vigilans diù manere non potest. Et vbi quilibet alius motus negetur, nonnè per somnum sanguis in interiora abit, in vigilijs ad exteriora ruit? Hac sola ratione moti Doctores vnanimiter in principijs febrilium accessionum somnum damnant, vigilias imparant. Sed & quatenus omnis alius motus cessaret, ea sola omnium corporis partium attractio, qua sanguinem ad se pro quotidiana dissolutione reparanda alliciunt, sufficiens motus est ad desidiam, & torporem sanguinis arcessendum.

Hic autem dicit forsan aliquis, circularem motum, quamuis non simpliciter, esse tamen sanguini conseruando quodammodò, siuè ad bene esse, vt dicitur, necessarium: Verùm ille falsitur: quia ad præcauendam putrescentiam non circularis, in quo ad idem semper fit reditus, & omnia simul miscetur; sed quilibet alius potior, siuè aptior est motus; qui imò, quò multiplicior, eò efficacior: sic enim obseruamus, aerem, quò pluribus ventis exponitur, ac mouetur, eò puriorem, ac salubriorem manuteneri; sicuti, & aqua si recta confluit, vel omniquaque dispergitur, a corruptela preseruatur, quæ si in breuem gyrum solummodo agitur, facillimè corrumpitur.

Verum enimuèrò quid est, quod quilibet calidus, & euaporans succus non motu, sed oburatione indiget, vt in suo vigore conseruetur? imò motu euanescit, & corrumpitur facillimè? Considerentur vinum, & oleum, quæ obturata centenos seruantur in annos, motu verò vigorem omnem deponunt, & facillè obeunt. Sanguis etiam vix aeri exponitur, quod vim omnem, & naturalem consistentiam amittit. Nonne ergo, quò minus mouebitur, minus de illius vi dissipabitur, minusq; aeris iniurijs obuiam ibit? Adde, quod per motum sanguis facillimè accenditur: vnde ex ira, mærore, horrore, terrore, amore, ac similibus occasionibus sanguinem commouentibus in dies accendi febres, visitur: quare opportune inter causas caloris motum Galenus, & alij adnumerarunt; & inter febrium, ac inflammationum remedia, quæ sanguinis motum compescunt, ac illius quietem, & segnitatem parant, non immeritò reponuntur. Hæc verò obiter, & tamquam perfunctorie enunciata habeantur, & ad hoc solum, vt videant contra opinantes, quantum irrequieto motui pro supposito consequendo sine sit deferendum.

Tertius finiserat, vt nouus semper nutriendis partibus sine earum labore sanguis porrigatur: sciant verò omnes, vtilem, & eligibilem esse laborem, qui veram voluptatem, vitamq; ministrat; inuilem, ac odiosam quietem, quæ aliorum indiscretionibus subiacet, & labile nimis solatium parat. Melius itaque pro partibus nutriendis iure merito fuit, vt vnaquæque,

Ratio seruanda.

Circulatio nec ad bene esse est nec necessaria.

Ratio tollit.

Impugnatur tertius à parte supposito finis.

vnacquæque, quæ sibi suauiora videntur, & vt tiliora sunt, ad se traheret, quàm otiano expectare, vt ab alijs indifferenter, & sine propria electione, quæ imò illi onerosa sunt, ad se transmitterentur: Vnumquodque enim naturale pro se, quod sibi magis placet, & familiare est, eligit, & allicit; alijs verò, quæ sibi vel grauiora sunt, vel quoquo modo superflua, impartitur. De hoc autem, & quemadmodum trahatur facilius, quod quiescit, quàm pertransiens, potiusquæ à molli, raro, ac tenui vase, quàm à crasso, denso, ac duro, iam iupra capite nono differtum est.

Quartus quoque finis repellitur.

Quartus tandem finis erat, vt continuo motu sanguinis coagulatio impediatur: Sed nec hic necessarius: quod enim sanguis in venis, ac arterijs consistens, & circumquaque ab innato, & à Corde mutuo calore septus possit sine circulari motu congelascere in corpore, cuius propria energia in caliditate actuali fundatur adeo, vt ea cessante, cesset vita; id verò vilis timiditas est: cum nulla nos ratio credere cogat, ad huiusmodi præseruationem circulum, vel alium continuum requiri motum; qui videmus, ceram, ac sebum, quæ aeri exposita subito concresecunt, semel ab igne fusa, etsi non agitentur, solo calore liquida seruari: Quid ergo de sanguine, qui non sic subito ab aere concresecit? quique in obstructa parte conclusus non coagulum, sed putrescentiam, & calorem contrahit? Quod si in apoplexia, vel aliquo alio affectu visus vnquam fuit concretus sanguis; vel extra vasa, vel corpore extincto, nunquam in adhuc viuo intra vasa repertus fuit. Dato etiam, continuum motum ad hoc postulari, huic egregiè alij satisfaciens motus, ad alia necessarius, absque quod circularis, in multis superfluous, eligeretur.

Concludamus ergo, nullum ex suppositis finibus legitimum, ac necessarium esse; sed sanguinem quidem sic in venis præcipuè, & in arterijs contineri, foueri; vt cuilibet, vel minimæ, corporis parti pro salutari nutrimento inferuiat, vtq; quòcunque opus sit, & clamitet necessitas statim conuolet, tam supra ascendendo, quàm infra petendo, tam extra erumpendo, quàm intrò se condendo; vel attractus, vel impulsus, vel vtroque modo à partibus adactus; prout reuerà hoc hominem, à Deo in omnibus liberum creatum, decebat.

CAPVT DECIMVMSEXTVM.

Alia dua probationes diluuntur, & ad oppositas auctoritates respondetur.

Prima impugnatur probatio.

SVcedunt nunc examinandæ aliæ duæ probationes ex D. Gaspare Brauo eodem cap. 11. adductæ. Ad quarum verò primam prompta responsio est, negando ambas præmissas: siquidem nihil est, quod urgeat, dari necessariam causam, ob quam Cordi suggeratur sanguis in syngula eius systole (melius diastole dixisset) attrahendus; Et primò quia dicta attractio simpliciter necessaria non est, neque vt efficiens, neque

que vt consequens. Non vt efficiens: nam sine sanguinis attractione Cordi pulsus inest propria illius virtute, vt in Corde è corpore euulso conspicitur, quod sine sanguinis vlla, nec minima successione per aliquod tempus pulsat. Non vt consequens: quia sufficit aer, vel spiritus ad dilatatam cavitatem implendam. Secundò quia vbi necessaria ad bene esse sit, non solum circulatio causa necessaria non est, sed imò superflua, eum sine illa optimè Cauæ possit sanguinis quantitas à Iecore quotidianas cibationes concoquente subministrari, quæ sani, lætiq; Cordis pulsationi satisfaciât.

Ad illarum autem probationem adducta Autopsia non concludit: vt cunque enim, sauciata arteria, vel Corde ipso dissecto, sanguis singulo pulsus ictu profiliat, non arguit necessitatem aduenientis sanguinis in integris ipsidem: quia ex vulnere, seu reclusionè ipsa, singulo pulsus ictu dilatata, causa exitus provenit; quæ ideo in integro minimè aderit: signum verò est, in Corde euulso, cui ad dilatationem sanguis non succedit, neque ad singulum ictum sanguinem profilire.

Experimenta pro ea adducta declarantur.

Aliud verò experimentum insufficiens, & ipsum ad probandum intentum declarabit, quicumque pensitauerit, tunc ex tenaculæ adhibitione, si Canæ probè Cor fiat, non sanguinis solum, sed cuiuscunque etiam spiritosi aerisq; corporis, venis ipsis minimè denegati, vt præclare statuit Gal. 6. de vsu part. 16. (horum autem alterutrum pro dilatatione supplenda sat est) attractionem denegari, & sic sequi suffocationem ipsius, vt in cohibita respiratione, in arteriosæ venæ, & venosæ arteriæ obturatione, seu deligatione contingit. Si verò aliquantum infra Cor ligatura fiat, non sic citò pulsandi munus desistere, sed quoad vires valeant, subsistere, cernimus: ablata autem ligatura, aliquid pulsus resurgere, non ex fluentis sanguinis corporeitate euenit primò, sed ab illius vitalitate, per quam vires paululùm reficiuntur.

Ad alteram verò probationem, ab eodem Brauo deductam, apte respondetur, negando minorem: quia, vt supra capite nono probauimus, per venas sanguinem ad membra omnia naturaliter, sicuti, & ad Cor, ire, verissimum est. Neque Autopsia contra adducta fidem facit de homine integro, ac sano, cuius status ab anatomizati statu, sicuti lux à tenebris, distat. Quemadmodum etiam, quid valeat argumentum à ligatura dolorosa, ac horrida, sicuti, & à phlebotomia desumptum, iam ibidem. & capite decimotertio visum est.

Secundum impugnat pro batio.

Reliquum ergo tandem fuerit, vt authoritates, quas pro circulatione facere, à quibuidam prædicatur, conciliare, vel e contra, si licet, retorqueere conemur. Et vt ab Hippocrate incipiam, si de nomine, vel alio quodam accidentario velamine loquamur, fateor, ipsum multoties circuli, circuitusue meminisse: At si de essentialibus, nempe de Haueiana sanguinis circulatione; nil tale vnquam ab ipso scriptum, vel conceptum, confirmo: longè enim aliud pro circulo in citatis libris de infomni, & de diæta intelligi debere, quàm qui nunc vellet institui, facile

Hipp. circula-
tioni con-
trarius osten-
ditur.

quius le&or illorum accuratus perspiciet. Sed imo, quantum is ab in-
trodu&ta circulatione alienus fuerit, demonstrat is idem *lib. de cord. num.*
8., & 9. vbi mentem in sinistro Cordis ventriculo constituit, statuens,
eam nutrirî pura, & illustri substantia ex sanguinis discretione nata hoc
modo, nempe radios suos in proximam sanguinis cisternam (scilicet dex-
trum Cordis ventriculum) immittendo, & illam depascendo; qui prop-
tereâ etiam autumabit, viam ex Aorta Cordi à pelliculis occludi, ne à
fluctuatione sanguinis, qui in ipsa est, obrueretur: magnam enim arte-
riam ventrem depasci, ac intestina, ibidem literis comendauit. Is etiam
num. 2., quamadmodum, & *lib. de hom. struct.* sanguinem à Corde non
solum per arterias, sed & per venas in totum corpus promanare, con-
scripsit; ibidemq; in dextro Cordis ventriculo sanguinis, in sinistro spi-
ritus locum collocauit. Quæ cuncta quantum à fundamentis, pro cir-
culatione positâ, aliena sint, facîle quius conijciat.

Hic Plato,
nec Aristote-
les circula-
ti fœuent.

De Platone, & Aristotele idem statuendum est; circulationem scilicet
in homine prætensam Eos non admisisse vnquam. Imò, vntrunque
autumasse, sanguinem similiter à Corde in venas, sicuti, & in arterias
progredi, latè probauit Conringius *lib. cit. de sang. gener., & motu cap. 31.*
Et Plato prætereâ venis generationem sanguinis adscripsit: quomodo
autem posset talis ab ipsis generari succus, si continuè moueretur? ad
co&tionem siquidem quies requiritur. Hic si circulationis meminit, non
aliam, nisi eam, quæ in inspiratione, & expiratione aeris contingit, cir-
cumuolutionem memorauit, vt in *Timæi tex. 19., & 20.* legitur, sic
Galeno interpretante in libris de *Hip., & Plat. decretis*. Illa autem de-
picta vaporum, ac pluuiæ circularis transmigratio, quam ex Arist. affe-
runt Harueiani, minimè omnium circuitiioni sanguinis competit, eamq;
potius, quæ fit in capite vaporum concrescentia, & ex qua somnus, &
oris irroratio producitur, sub exemplari ænigmate præfigurat.

Quod si circa hos aliquid dubitari contingat, illud nos debet è dubio
dimouere, quod Galenus, vbique Hippocratis, & Platonis commenda-
tor, Aristotelis autem insectator egregius, nunquam illorum sensum, &
opinionem descripsit; quod neutiquam Vir perspicacissimus, ac soler-
tissimus illorum Interpretes, huiusq; Aduersarius, omisisset.

Erastistratus
circulationi
non obsecrante.

De Erasistrato quid dicendum? Porro si quis alius, omnium maxi-
ls hanc circulationem ignorauit, & vt melius dicam, impu-
gnauit: cum in arterijs solum spiritum naturaliter detineri, &
per illas ferri, asseruerit, itaut Galenus coactus fuerit, vt
alibi diximus, aduersus Eum libellum conscribere, in
quo probauit certis experimentis, in arterijs ipsis
non spiritum solum, sed & sanguinem
contineri, ac morari.



CAPVT DECIMVMSEPTIMVM.

Quod non sola contractio, sed & distensio in pulsu sit Cordis, & arteriarum actio probatur.

Quoniam verò non sufficit, argumenta ipsa, & rationes contrarias confutare, sed necesse est, fundamenta quoque illarum euertere, vt sic omnis replicationi locus adimatur: Ideo pedetentim nonnullas ex Harueianis suppositionibus ponderare, & ad nihilum, si possibile est, reducere opus erit. Eam igitur antiquissimam Harueius innouans de Cordis pulsatione opinionem, quam Herophilo attribuit *Gal. lib. 4. de diff. puls. cap. 10.* statuit, solam systolem esse Cordis propriam actionem, diastolem verò, vel esse quandam ipsius concidentiam, & ab opere cessationem, vel reditum ad naturalem statum; Eamque sequuntur plurimi circulationis amatores, & in specie Deusingius, Plempius &c. Hoc probant primo.

Quia motus cordis motui musculorum respondet (cor enim ex Hippocrate *lib. de cord. num. 4.* musculus quidam fortis non neruo, sed carnis densitate est): Sed horum actio contractio quædam est, cum laxatio sit potius ab actione cessatio; Ergo eadem de cordis motu supponenda sententia est.

Secundò: Per systolem vi exprimitur à Corde sanguis in arterias, quæ ideo actio quædam propriè dici meretur: per diastolem autem potius sanguinem in se aliunde confluentem Cor recipit; quæ idcirco verius passioni cuidam respondet.

Tertiò: Contractio ope fibrarum perficitur, virtute ipsarum intrinseca agente: quare, & actio est: dilatatio autem accidit, vbi in pristinum suum statum fibræ redeunt, quod citra actionem euenit, & sponte Ergo &c.

Quartò: Si causam ponamus, qua Cor ad sanguinem impellendum insurgit, quæ ex Deusingio est quædam sanguinis effruescencia, ac surgencia, vt ait *lib. de motu cord. & sang. sect. 1. num. 11.*, & alibi sæpius; idem dicemus: nam hæc, expultricem solam mouet facultatem, quæ contractione vtitur, non atter&ricem, quæ illi contraria contrariam arguit causam; Si ergo sine facultatis motu dilatatio succedit, cum eo verò contractio sit, non illa, sed hæc sola, actio dicenda est.

Atuerò huic opinioni in primis altera è diametro aduersatur, per quam statuitur, solam dilatationem esse, & cordis, & arteriarum actionem; contractionem verò ex spontina caui corporis concidentia citra aliam virtutem prouenire, Cuius Author fuit Asclepiades, sic loco citato referente Galeno. Pro qua opinione nec suæ desunt rationes satis verisimiles. Harum prior est, quod,

Magis proprium actionis opus est, cum aliquid seipsum maius efficit; quam

Harueiana opinio ex Herophilo, quod sola systole sit Cordis actio.

Ratio prima.

Ratio secunda.

Ratio tertia.

Ratio quarta.

Opinio contraria ex Asclepiade.

Pro hac opi-
nione ratio
prima.

Ratio secun-
da.

Ratio tertia.

Ratio quarta.

Ratio quinta.

Ratio sexta.

Potiores
videntur ra-
tiones pro di-
latione, quā
pro constrictio-
ne.

quā cum minus : Sed dilatatio est quædam sui adaugtio, saltē in espa-
titate ; systole verò imminutio : Ergo potius propria actioni est dilata-
tio, quā constrictio. Maior probatur : quia dilatari, & augeri semper
agentem claram supponit causam ; constringi autē, & minui non semper :
concidunt enim in se ipsa multa sine aliqua moriua facultate, vt
venis accidit ; tabescunt alia non ex actione, sed defectu.

Insuper : Si motus Cordis, seu arteriarum illorum actio dici debet,
ille tulis potius existimandus est, quimeliūs, vt talis, sub sensum cadit :
Huiusmodi verò est dilatatio, non constrictio : Ergo &c. Maior de se
patet : quia quod sensu percipitur, alia probatione non indiget. Minor
probatur, quod, cum motus sit sensibile commune, siue tactum, siue au-
ditum, siue visum species, magis natura apta sentiri est dilatatio, quā
restrictio ; Vtpote sub hos omnes sensus cadit facilius maior acquisita
moles, quā minor ; vt exinde iuxta Galeni dicta lib. 1. digno, puls. 3.
Agathinus cum Erasistratijs multis diceret, pulsus contractionem mi-
nimē sentiri posse, & Galenus ipse capitibus seqq. confiteatur, non
cuiusuis pulsus posse contractionem sentiri ; nec quorū possit, proinde
omnium esse claram. Cuius causam reddit, quod faciliē sentimus
affectus corporis nostri, & deinde, quæ hos induxerunt, obiecta mente
percipimus ; & ideo, pressionem carnis nostræ, ab arteria pulsante fa-
ctam, faciliē percipimus, ipsam verò recedentem non semper, nec in
omnibus, & non nisi mentis magna attentione adhibita cognoscimus :
Cur ergo negare actionem in manifestis, admittere in oculis ? Si nullum
in pulsu sentitur mouens, sed tantum motus ipse ; & hic in diastole, quid
aliud arguere, quā propriam in ea se mouendi virtutem ?

Item : Neque quid se mouet localiter, quin spatium aliud ab eo, quod
actu obtinet, occupetur : Sed hoc in dilatatione accidit, non in adstric-
tione : per eam enim amplior occupatur spatiositas, per hanc minor,
quæ in maiori actu continetur, cum minus in eadem re sit pars maioris :
Ergo dilatatio veriūs motus est, & in ea impetus actionis elucet magis ;
constrictio autē potius cessatio ab actione est censenda, quā secus.

Tandem : In cæteris cauis corporibus sola dilatatio veluti actio con-
spicitur ; constrictio autem sine vlla actione cognoscitur : Ergo sic, &
in Corde. Cognoscitur antecedentis veritas in ore, in œsophago, in
vesicæ collo, in vtero &c. ; in his enim videmus ex seipsis, ac sine vlla
vi dictas partes dilatatas constringi, dilatationem verò cum manifesta
actione, quæ in voluntate quodammodo consistit, perfici, & exerceri.

Et equidem, vbi statuendum esset, alterum horum motuum esse quāsi
cessationem ab actu, vel, si sit motus vterque, esse vnum eorum reditum
quendam spontaneum ad statum naturalem, vt volebant Veteres, vel
coactum a re instante, vt in arterijs velle videntur Neoterici ; mea sen-
tentia potiores sunt rationes, quæ pro dilatatione, quā quæ pro con-
strictione videntur adductæ : Siquidam, vt dilatetur, & pulset arteria,
virtus requiritur, vt constringatur, quælibet est languidissima, sufficiens

vis, & ubi valida sit virtus, valde dilatatur, si debilis, parum; constrictionis autem terminus idem semper est, dilatationi. tamen necessario respondens.

Neque hic obijciant mihi, aliam esse dilatationem arteriæ, aliam Cordis: quia eandem esse, procul dubio patet tactui, & in sequentibus probabitur: Sed & quatenus eadem numero non esset, eadem tamen specie erit verissimè, & sic valebit ratio.

Atuerò hanc opinionem vñ cum priori manifestè oppugnat *Gal. lib.*

„ 4. de diff. puls. cap. 2., ubi ponit, Pulsus esse peculiare actionem præ-
 „ cipuè Cordis, deinde arteriarum, quæ distentione, & contractione
 „ mouentur à facultate vitali, quo caloris natiui mediocritas retineatur,
 „ generetur autem in cerebro spiritus animalis] Est quippe vnaquæ-
 „ que pulsus partium actio propria Cordis, secundariò autem, & per com-
 „ municationem arteriarum, quæ tùm frigidus trahitur ær, tùm spiritus
 „ cum sanguine ad omnia truditur membra, & si quæ fulgines adsint;
 „ foras pelluntur. Cuius quidem opinionis potiores rationes sunt huius-
 „ modi; Et primò,

Quod siuè dilatetur, siuè constingatur Cor, in vtroque sit motus; cum in vno maior cavitatis, in altero minor sensibilibiter efficiatur: Horum autem motuum, vel vterque spontaneus est, ac à propria facultate moti corporis peractus, vel alter horum naturalis, alter coactus. Si primum, vterque motus actio erit procul dubio. Si secundum, necesse est, in vno eorum (nempe naturali) actionem elucescere, in coacto passionem: Sed hæc incompatibilia sunt: Ergo primum. Et probatur hæc minor: quia aliter actio, & passio in eodem subiecto, & eadem illius causa esset, quod non dari, notum; cum idem, vt idem, & secundum idem non possit simul agere, & pati. Et tamen sic in pulsu daretur, quod esset absurdum. Forsitan quis dicet, non simul, sed alternatim in pulsu vigere actionem, ac passionem, nimirum Cor in systole agere, in diastole pati, vel è contra, & sic iterum ac iterum, donec à nece dissoluatur munus hic agendi, & patiendi periodus: Verum enim verò impossibilia hæc sunt: quia si dilatatio cordis à sanguine impulsio sit, cur inde sanguis ipse à corde ardeatur, ac pellitur? Et si hic ardeatur, cur postmodum iterum insurgit, Cor euincit, & ampliat? Adde quod, & ad hoc necesse esset, vt aliud daretur membrum corde validius, & similiter quidem, sed contrario tempore pulsans, vt de corde respectu arteriarum censet Harueius. Sed & hic iterum aliud requireretur illo validiore validius, contrariòq; motu motum, à quo, & illud moueri posset, & sic processus in infinitum. Si verò dicatur, vtrunque quidem motum spontaneum esse, sed in vno tantum actionem esse, velut in systole secundum Harueium, vel secundum Aesclepiadem in diastole; in altero autem nec actionem nec passionem adesse; error est: quia vel motus ille est, vel quies; si is, nullus motus sine mouente sit vel intrinseco, vel extrinseco, & sic actio, vel passio necessario erit; si quies, non ergo, erit motus, quod falsum.

Pulsus de-
 scriptio Gal.

Vtriusque pul-
 sus partem
 actione esse,
 ratio prima.

Altera ad
idem ratio.

Eodem ex-
plicatur ra-
tio.

ad q. 1. q. 2.
p. 1. q. 2.
p. 2. q. 2.
p. 3. q. 2.
p. 4. q. 2.
p. 5. q. 2.
p. 6. q. 2.
p. 7. q. 2.
p. 8. q. 2.
p. 9. q. 2.
p. 10. q. 2.
p. 11. q. 2.
p. 12. q. 2.
p. 13. q. 2.
p. 14. q. 2.
p. 15. q. 2.
p. 16. q. 2.
p. 17. q. 2.
p. 18. q. 2.
p. 19. q. 2.
p. 20. q. 2.
p. 21. q. 2.
p. 22. q. 2.
p. 23. q. 2.
p. 24. q. 2.
p. 25. q. 2.
p. 26. q. 2.
p. 27. q. 2.
p. 28. q. 2.
p. 29. q. 2.
p. 30. q. 2.
p. 31. q. 2.
p. 32. q. 2.
p. 33. q. 2.
p. 34. q. 2.
p. 35. q. 2.
p. 36. q. 2.
p. 37. q. 2.
p. 38. q. 2.
p. 39. q. 2.
p. 40. q. 2.
p. 41. q. 2.
p. 42. q. 2.
p. 43. q. 2.
p. 44. q. 2.
p. 45. q. 2.
p. 46. q. 2.
p. 47. q. 2.
p. 48. q. 2.
p. 49. q. 2.
p. 50. q. 2.
p. 51. q. 2.
p. 52. q. 2.
p. 53. q. 2.
p. 54. q. 2.
p. 55. q. 2.
p. 56. q. 2.
p. 57. q. 2.
p. 58. q. 2.
p. 59. q. 2.
p. 60. q. 2.
p. 61. q. 2.
p. 62. q. 2.
p. 63. q. 2.
p. 64. q. 2.
p. 65. q. 2.
p. 66. q. 2.
p. 67. q. 2.
p. 68. q. 2.
p. 69. q. 2.
p. 70. q. 2.
p. 71. q. 2.
p. 72. q. 2.
p. 73. q. 2.
p. 74. q. 2.
p. 75. q. 2.
p. 76. q. 2.
p. 77. q. 2.
p. 78. q. 2.
p. 79. q. 2.
p. 80. q. 2.
p. 81. q. 2.
p. 82. q. 2.
p. 83. q. 2.
p. 84. q. 2.
p. 85. q. 2.
p. 86. q. 2.
p. 87. q. 2.
p. 88. q. 2.
p. 89. q. 2.
p. 90. q. 2.
p. 91. q. 2.
p. 92. q. 2.
p. 93. q. 2.
p. 94. q. 2.
p. 95. q. 2.
p. 96. q. 2.
p. 97. q. 2.
p. 98. q. 2.
p. 99. q. 2.
p. 100. q. 2.

Quarta ratio
ad idem.

Alia ratio est, quod vterque est eiusdem partis motus, alter alteri mu-
tuo succedens ordinatè, æqualiter, eodem tem-
poris (spatio) peractus, mu-
tuaq; ab inuicem quiete distinctus; quorum nihil esset, si vnus à facul-
tate, alter à casu; vnus ab intrinseco, alter ab extrinseco; vnus ex se,
alter ab alio esset: Nam non semper eodem modo quid ab alio affici-
tur; nec actio in alterum sic ordinata cadit, quin multoties tùm inten-
sione, tùm tempore varietur, prout modo maior, modò minor agentis
potentia, vel patientis resistentia inuenitur: At in pulsu sanorum con-
spicitur, dilatationi respondere constrictionem, tùm magnitudine, tùm
frequentia, tùm celeritate. Et vt ratio declararetur ad cuiusvis intelli-
gentiam, ponamus, Cor validissimum esse; tunc si sola constructio cor-
dis actio est, manifestum, quod validè quidem, & vehementer constrin-
getur, parùm verò dilatabitur, vt potè validè aliorum impressioni ob-
stans: si verò sola dilatatio actio eiusdem sit, validè quidem dilatabi-
tur, molliter autem constringetur, vti decidentia (quæ quandam redo-
let imbecillitatem) repugnans. Contrarium dic, si Cor fuerit imbecil-
lum nam in actione eneruatum, in passione, vel decidentia promptam
obseruabitur; Sicq; nullus rythmus, nulla proportio inter diastolem,
ac systolem, nullaq; inter priorem, & posteriorem quietem seruabitur:
cui tamen oppositum cognoscitur omne.

Adde his, quod constructio, & dilatatio contrarij sunt motus: Ergo à
contraria causa sunt: At si contraria causa est, ergo sub eodem genere
posita systole secundum Herophilum, & Harueianos, à cordis facul-
tate procedit, secundum Asclepiadem dilatatio. Igitur vtraque à facul-
tate fiat, quæ essentialiter quidem, genereq; eadem est, nempe motiua;
virtute autem, ac potestate contraria, nempe motus oppositos generans;
& sic vterque horum motuum actio erit. Eandem autem genere esse
facultatem, quæ oppositos motus in viuentem edat, patet; quia eisdem
vritur instrumentis, id est musculis, ac nervis in voluntarijs motibus,
fibris autem in naturalibus: quæ tamen iisdem inter se oppositis vel figu-
ra, vel positu, rectis scilicet, obliquis, ac trauersis; superioribus, inferiori-
bus; dextris, sinistris; anterioribus, & posterioribus videntur, oppositos
quoque motus edere nouit: Idem namque, & in cæteris motibus, sicuti
& in sensibus esse videmus: eadem enim parte inspiramus; & expira-
mus; acutam, & grauem; altam, & submissam edimus vocem; claudi-
mus, & aperimus os, oculos, anum; vesicam; deglutimus, euomimus.
Eodem sensorio calidum, & frigidum; humidum, & liccum percipimus,
vti, & in cæteris sensibus apparet. Sed, & hoc in naturalibus actioni-
bus fieri concludit Gal. lib. 3. de nat. facul. cap. 13. Potissimum quia op-
positio, quæ in similibus est motibus, ac perceptionibus, non intrinsecè;
& per se, sed extrinsecè, & per accidens est, scilicet loco, seu latione,
obiecto, & accidentali alio modo opposita; ita ut dictamet abusiue vo-
centur contraria, nec incongruat ab eadem virtute dicto modo oppo-
sitas exerceri actiones. Quid igitur de corde dicemus? nùm hoc solum

vaicam

unicam ex se tantum habebit actionem? Et, cum omnium nobilissimū sit, ad minora, quā cætera, valebit?

Amplius: Qui motus magis, & minus, intensius, & remissius sunt, vel à propria, vel ab aliena virtute, procedunt, secundum cuius tenorem variatur, & disponuntur: Sed huiusmodi in pulsus tū diastole, tū systole fiunt: Ergo, vel à propria, vel ab aliena virtute promanant: Atqui non ab aliena; ergo à propria. Prior probatur: quia quæ, vel pura naturalia, vel concidunt, vel eleuantur, semper eodem tenore iuxta propriam grauitatem, vel leuitatem mouentur, nec vllō tempore (nisi ab externo, vel detineantur, vel incitentur) segnius, aut celerius: sic ergo, & in animalibus existimandum, cum Natura in omnibus eadem, & eodem modo se gerat. Minor tū in Corde, tū in arterijs manifesta est: experimur enim quotidie ob varios animi affectus, aut corporis dispositiones diuersas diuersè quoque tū in systole, tū in diastole circa temporis, ac intensiōis modum fieri motum.

Hoc nunc consito, quod Cordis pulsus in genere non fiat ab aliena virtute, probatur ex eo, quod, cum Cor omnium membrorum sit validissimum, verisimile non est, vllam partem, aut aliam rem ipsum mouere, & euincere posse. Item quia exutum Cor, & a corpore euulsū, adhuc multoties vtroque motu mouetur per aliquod tempus, vt in superioribus quoque diximus; ex quo arguitur, non à sanguine ingrediente, non à necuo, non ab alio in summa, sed à sua ingenita vi moueri, vt optimè aduertit Galenus lib. 7. de anatam. administrat. cap. 8., & adnotat Galtrucchius in sua Physica partie. disputat. 2. cap. 5.

In specie autem probatur de dilatatione primū, quod ab aliena actione non proveniat, nec ab alio. Non à sanguine ingrediente, vt quidam vellent; primò quia Cordis dilatatio natura præcedit dictum introitum; ergo huius illa est causa, non è contra: causa enim præcedit, non consequitur effectum. Secundò quia ingressui obstant valvulae, quæ in systole clauduntur, & ni Cor sponte dilatetur, non aperiuntur, à sanguine autem motu dilatari non possunt, si Cor contra agat. Tertio quia si à sanguinis impetu dilatatio fieret, esset quid coactum; rerum naturalitati indecens; & inordinatum iuxta maiorem, vel minorem ipsius impetum, & maiorem, vel minorem alterius resistentiam. Quarto quia sanguinis mollities, & fluxibilitas non videtur posse corpus durum cogere ad dilatationem. Tandem quia ex se non mouetur sanguis.

Non à Caua impellente; quippe sic asserendum esset, Cauam Corde esse validiorem, quod nemo forsan dicet, Tum etiam, vel necesse erit, eam facere interpolatos impulsus, vel continuos: si interpolatus; ergo deberet, & ipsa, vt Cor, pulsare; sed contrariò modo, nempe constringi, quando Cor dilatatur; quod à nemine vsque adhuc notatum. Si continuos, nec Cor se poterit constringere, & ab impulsu præcauere; quia illi obstant valvulae, quæ aperiuntur in ipsum; & quid maius videtur

Quarta ad idem ratio.

Pulsus non ab aliena sed propria sit virtute.

Non ab aliena, si fieri probatur duabus rationibus.

Probat de dilatatione, quæ à sanguine fieri, non potest.

Nec à Cava, vt impulerit.

Causa venit
motus propè
Cor non pro-
prius, sed cō-
secutaneus.

dilatari, quàm dilatatum, teneri. Sed & hæc adesse falsum: Ergo nec à Caua continuè impellitur. Neque obijciant, Cauam propè Cor moueri: motus enim ille non pulsificus, non impulsivus, sed tremulus est; nec ipsi proprius, aut insitus, sed consecutaneus, & cordis motum sequens ob contactum: sic enim ex pectoris dilatatione, & constrictione mouentur in respiratione abdomen, collum, ac reliqua adiacentia membra, & à Cordis pulsu mouetur mammilla sinistra; & ab arteriæ percussione cutis. Itaque cum proprius non sit, nec propriam arguit virtutem; multò minus validiorem suo Auctore.

Nec dilata-
tio ob concu-
dentiam fit.

Nec verò dicendum, quod ex concidentia, vt prætendunt nonnulli, illa proveniat dilatio: implicat enim contradictionem, quid dilatari, & concidere: concidere namque dicuntur, quæ dilatata se constringunt, non quæ se iungunt magis: conceditur autem ab Hartuicio, & omnibus, cordis ventriculos in diastole fieri latiores. Præterea cordis pulsus arteriarum pulsui respondet ex omnium voto: at hæc in diastole non dicuntur concidere, sed eleuari: ergo & sic Cor.

Nec in ea sit
reditus ad
statum natu-
ralem.

Item nec dicendum, Cor in diastole ad naturalem statum ex seipso redire, vt musculus accidit, vbi à constrictione laxantur: quia si sic esset, non daretur maior, vel minor dilatio, sed semper eadem, vt de arterijs arguit Gal. lib. de usu puls. cap. 6., quod experientiæ, & euidentiæ repugnat: nam si status naturalis is est, qui motu cessante, & mortuo animali videtur, in viuorum diastole maior Cordis, arteriarumquæ sit dilatio, & adhuc longè maior, si vel ex febre, vel ex alio corporis aut animi affectu calor augeatur, & finis urgeat.

Constrictio-
nem nequie-
ti à virtute al-
terius, proba-
bitur.

Nunc de constrictione, quod nec ipsa ab alieno mouente, seu agente fiat, probatur ex eo, quod, si sic esset, nil verisimilius Cor adstringeret, quàm adiacentia corpora: huiusmodi autem pulmo in primis est, quo nil in corpore, præter pulsifica instrumenta mobilis cernitur: Sed hunc posse Cor adstringere, somnium est: illius enim spongiositas, mollitiesque Cordis autem stabilitas, ac durities huic repugnant credulitati. Dato autem, quod posset, id fieret in sui constrictione, quæ expirando accidit. Sed si sic esset, deberet expirationi systoles, inspirationi diastoles respondere, quod non fit; cum vni expirationi duæ saltem pulsus systoles, vni inspirationi duæ ad minus diastoles respondeant, & consequantur, vt quivis in seipso carpi tactu potest experiri. Quid verò de arterijs dicemus? à quonam comprimuntur? à circumpositis partibus? nil mouet immotum? ex percussione forsitan? Carnis, cutisque mollities repercutere nequit.

Randò neq;
fieri ex con-
cidentia, nec
reditus ad sta-
tum natu-
ralem.

Nec item dicendum cum Asclepiade, constrictionem siuè Cordis, siuè arteriarum esse, vel ex spontanea parietum concidentia, vel reditu ad naturalem statum; tùm quia nec Cor, nec arteriæ, mortuo animali, in se concidunt adeo, vt altior infimum cauitatis parietem contingat; cum tamen, validè pulsando, se contingant non raro; tum quia semper eodem modo se constringerent, quod sensui repugnat, cum sentiamus,
à maiore

à maiore vi magis Cor constringi, à minore minus.

Tandem eadem est ratio pulsus, ac respirationis: vtrorunque enim idem finis (vt proprio dicetur capite), & idem mouendi modus per reciprocam dilatationem, & constrictionem: Sed in hac tam inspiratio, quam expiratio à facultate sunt: Ergo, & in pulsu. Minor constat, cum eadem in vtraque respirationis parte (ni quid impediat, aut alio distrahatur mens, & voluntas) temporis, intermissionis, & vehementiæ feruetur qualitas, quantitas, intensio.

His itaque visis, rationibusq; euidentibus probatis, reliquum nunc est, vt ad contrarias, tum primæ, tum secundæ opinionis rationes respondeamus. Ad primam igitur pro Harueio adductam rationem respondeo cum *Gal. 7. de anat. administrat. 8. & 9.* Cor verè musculum non esse; cum non à voluntate eius regatur motus, vt ex eodem habetur *lib. 2. de motu muscul. cap. 5.* sed illi, vt dictum est, sit connaturalis, & ingenuus (à corpore enim auulsum adhuc pulsât); item quia musculis alijs longè durior, compactiorq; cernitur eius substantia; ventriculos intus continet, ossibus non alligatur, tot nervosis propaginibus non exornatur, fibris verò omnigenis, contra ac plerique musculi, imbuatur, vt idem ait *Gal. 6. de vsu part. 8.* Ideo non valet similitudo motus huius cum illorum motibus, qui insuper non ordinati, ac perennes (vt insunt Cordi); sed voluntarij, & interrupti: non dilatantes, ac reciprocè adstringentes, sed contrahentes, & elongantes; exceptis, orbiculatis quibusdam, vt œsophagi, ani &c., quos constringi, ac dilatari, conspiciamus, prout voluntas exigit, vel irritata insurgit. Ad Hippocratem autem, vbi Cor musculum vocauit, dicimus, illum id similitudinem pronunciaſſe, vt ex dictione illa (quidam) colligitur: differentiam verò annuiſſe, dum dixit, non neruo quidem, sed carnis duritie musculum fortem esse; Et vbi musculus dicendum esset, illi peculiarem esse motum ingenuum, independentem, perennem, ab aliorumq; musculorum motibus dissidentem, Hippocrati non repugnat, qui nullibi contrarium affirmavit.

Ad alteram dicitur, quod, dato etiam, per systolem sanguinem, vel spiritum à Corde in arterias expelli, tantum tamen per diastolem ab eodem attrahi, dicendum est, siuè id ratione vacui euitandi, siuè ratione naturalis igneitis, quæ, vt lychnus oleum, nutrimentosum succum allicit; siuè ratione familiaritatis substantiæ, quæ à nutrienda parte appetitur, euenire, credatur: omnibus enim hisce modis, vel aliquo istorum Cor validissimè omnium trahere potest. Cum ergo non minus actio dicenda sit attractio, quam pulsio, iure vtrunque pulsus motum actionem nominabimus: monstratum enim est, non ingressui sanguinis Cordis dilatationem, sed huius dilatationi illius ingressum esse adscribendum. Quare non possum non mirari, peritissimum Deusingium, qui pluriès confirmauerat à Corde sanguinem ex toto corpore, Anthiq; inſitar, allici, in huiusmodi descendisse sententiam, vt dilatationi (quæ attractio

Vtrunque
pulsus partē
esse actionē,
ratio quinte

Responde-
tur ad primā
Harueianam
rationem.

Respondeo
ad secundā.

causa est) actionis nomen denegarit.

Respondetur
ad tertiam.

Ad tertiam dicitur, si constrictio ope fibrarum euenit, dilatationem ipsarum quoque ope perfici, vt apertissime commonstrat *Gal. 6. de vsu part. 8.* vbi, quod rectis fibris, seu quæ secundum longitudinem disperguntur, tensis, cæteris verò otiantibus, dilatatio Cordis oriatur, e contra verò, his relaxatis, & quæ secundum latitudinem sunt, seu transuersis se contrahentibus, restrictio fiat, clarè ostendit.

Respondetur
ad quartam.

Ad quartam respondeo, si Cor, vt opinatur Deus singius inducitur à turgescencia, & effruescencia sanguinis ad se coustringendum, & expellendum, eidem superuenientem defectum illud ad se dilatandum, vt nouum attrahat succum, inducere. Et sic si in vno motu agit, in alio nō otiaur, si in hoc adest causa, in altero non deest. Veruntamen (sit autem obiter dictum) potius contraria, vel alia causa tū dilatationis, tū constrictiois ponenda est: si enim hi sunt motus præcipuè, vt innatum calidum ventiletur, moderetur, roboreturq; vt Galenus euidentissimè *lib. de vsu puls.* concludit, manifestum est, ab effruescencia potius ad dilatationem Cor induci, vt aere sic attracto, refrigeretur; ad constrictioem verò à frigore inducto, quò calor continetur. Id quod etiam ab effectibus caloris, cuius proprium videtur rarefacere, ac dilatate, sicuti frigoris densare, constringereq; potest rationabiliter suaderi. Et hoc idem apertè docuit *Aristot. lib. de respirat.* Resiliio (inquit) est facta obuiatio ad frigidi compulsionem: Pulsatio autem humidi calefacti inflatio. J Vtunque sit, planum est, non deesse causam dilatationis, nec casu illam fieri, itaut Cordis actio dici non mereatur.

Respondetur
ad primam
pro Asclepiade
de rationem.

Veniens modò ad alias rationes, quæ solam dilatationem actionis nomine dignabantur, non minus promptum est ad eas respondere: quandoquidem, Si prima consideretur, facilis cadet responsio, si dixerimus, contractionem, & distensionem esse motus merè oppositos, quorum neutrum sine actione vel propria, vel aliena fieri, rationale est: nec enim quid à contrario in contrarium sine mouente mouetur, quicquid sit de moribus, qui ab extremo ad medium, vel ab alieno ad proprium locū spontè etiam in inanimatis fiunt (quos à natura tamen fieri, docet *Aristot.*) Patet autem, in pulsu vicissitudinarium fieri Cordis motum ab opposito ad oppositum: ergo non sine actione id fieri continget, quæ cū aliena esse non possit, vt monstratum est, remanet, vt propria statuatur. De reliquo non verum, quod magis actionis proprium sit dilatate, quam constringere: nam si multa sine facultate motiua constringuntur, non minus multa si dilatantur. Imò si de inanimatis loquamur, videbimus multa in seipsa pressa, aut per vim contracta, quæ sine alterius ope facillimè ampliantur.

Respondetur
ad secundam.

Si verò secunda, dicendum est, propositionem primam esse falsam, qui à rei aliquiue existentia siuè sensu, siuè ratione, siuè vtroque probetur, per hoc nec magis, nec minus acquirit, nec secundum hoc præeminentiam, vel humilitatem adipiscitur ullam. Pateat ergo Cordis con-

strictio

CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 187

Actio solis Anatomicis, solisq; pulsuum obseruatoribus egregijs, non minus ob id actionis nomen merebitur aliàs nec coctio, nec nutritio, nec aliæ id genus naturales operationes sensui incognitæ actiones dicendæ essent; quæ tamen excretionibus, quamuis sensatis vel hoc ipse, quia solo rationis lumine discernuntur, nobiliores censentur.

Si autem tertia, dicere possumus, corpus cauum, siuè dilatetur, siuè arctetur, spatium aliud à priori occupare, cum reuera aliud spatium sit illud cavitatis internum, in constrictione obtentum, aliud externum à dilatata superficie occupatum; & ideo in vtraque motione elucescere diuersæ spatiofitatis occupationem. Nec dicendum, minus spatium in maiori virtualiter contineri, cum vnū ab altero possit realiter distingui.

Respondetur ad tertium.

Tandem ad quartam respondetur, quamuis constrictione illarum partium videatur sine vlla actione esse; reuera tamen, & veriolem, quam in dilatatione actionem musculorum in ea fieri, vt docet *Gal. 2. de motu muscul.* 8. vbi propriam illorum actionem constrictionem, & retentionem nominat; dilatationem verò, & excretionem non nisi secundum accidens, quatenus scilicet ab actione otiantur. Et huius indicium manifestum hoc est, quod ijs resolutis, excrementa inuoluntariè, & intempestiue profluunt. Quod si in egestionem, & mictionem videtur conatus, & vis actionis adesse, non illorum annularium musculorum opus huiusmodi est, sed aliorum epigastrij, ac abdominis, qui, cum diaphragmate contra præmentes, illos dilatari, & ab actione desistere cogunt, vt ibidem legitur.

Respondetur ad quartam.

CAPVT DECIMVM OCTAVVM.

Quod eodem prorsus modo, ac tempore pulsant arteriæ, quo Cor.

Simili autem modo, eodemq; prorsus tempore, quo Cor, moueri arterias, simulquè cum eo dilatari, sicuti, & constringi, quicquid Herastratæ, & Harueiani contradicant, certo certius est; idq; probant tum sensus, tum ratio. Et sensus quidem, quia, si tactu Cordis regio, & carpus simul tangantur, percipimus, vnicum, vniucumq; esse amborum ictum, prout & quivis in seipso, vel sano, vel febricitante potest experiri. Hucusque consentiunt Neoterici, sed vterius progrediendo dissentiunt, contententes, dum Cor pectus ferit, illius hunc esse systolem. Et hoc visu in primis innitentes probant: Cor enim viui animalis dissecti exuunt, aspiciuntq; vel aspicere imaginantur, Cor, quando eleuatur, constringi, ac quodammodo elongari, itaut cuspis aliquantis per sursum retracta costas percutiat; sic ait Harueius, nec longè abest Deusingius. Tactu etiam idem patefaciant: nam Cor ipsum scindentes, digitumq; imponentes, sentiunt tunc temporis digitum premi, & flaccescente corde, laxari.

Cor, & arterias eodem modo sensu probatur.

Neotericorum obiectio.

Sed verò, his non obstantibus, priori assertioni insistendum: quia, si,

Refelluntur.

dum arteria eleuatur, percutitq; tangentem digitum dilatasi eam; cum retrogreditur, demittiturq; , constringi, apud omnes in confesso est, cur non idem de Corde dicendum? Quod siue in ictu illo elongetur, vt Harueius putat, siue vndiquaque per latera dilatetur, vt nos cum *Cal.*, & pluribus autumamus, id nil facit, cum sufficiat, cavitatem tunc temporis capaciore, vtcunque sit, fieri. Manifestum item, ad motus differentiam agnoscendam plus valere tactum, quam visum, qui facile ob obiecti distantiam, medijs fugacitatem, & sensorij mobilitatem in subit, ac minimis decipitur, multoq; magis, cum circa diuersa inter se comparanda, versatur obiecta, vt in casu nostro; dum enim oculus Cor aspici, arterias non videt, cum has intruetur, Cor subterfugit, dum vtrunque, neutri acies, neutri mens adhibetur; Quod de tactu minimè dicendum: per hunc enim, qui per vniuersum corpus dispergitur, & obiectu suo beneplacito apprehendit, promptius est vel identitatem, vel diuersitatem motus agnoscere. Hinc à tot Sapientissimis Viris nunc, & antea visa pulsatio Cordis, diuersimodè iudicata fuit, & iudicatur alijs scilicet cum Herophilo, Galeno, Vallesio, Vesallio &c. eodem prorsus modo, ac tempore vtraque corpora pulsare; alijs autem cum Erasistrato, Auicena, Harueio &c. diuerso pronunciantibus.

Neque primis obijciat quis, eos oculariter non obseruasse: nam (vt de cæteris reticeam) id omnium minimè est asserendum de Galeno, qui Cordis denudationem, viuò animali, exerceri docuit *lib. 7. de anatom. admin. cap. 12.*, quiq; speciatim eodem *lib. cap. 14.* dictam denudationem sine penetratione exercitam conducere perhibet, aderuendum, „ an quando Cor attolitur, thoracem feriat, pectoris ossis regionem accedens, an quo tẽpore demittitur; Et an quando Cor attolitur, arteria „ submittatur, & quando Cor demittitur, ipsa attollatur; an ambo eodem tempore, & submittantur, & eleuentur.] Vt propterea de illo verendum non sit, quin oculariter, & sedulò plurius obseruauerit; optimè sciens, hanc, quæ etiam tunc temporis inter Erasistratos, & Herophilanos agitabatur, controuersiam in Medicina agitari.

Quid ergo est, quod tam gloriabundi Neoterici, Autopsiam sibi fauere prædicant, aliosq; Autopsiæ expertes nominant? Suus cuique sensus, sua cuique mens, quæ multoties à vero, passionibus hallucinata, aberrat; & quod peius est, qui viciosius sentiunt, in cæteris acerbis inuehuntur. Sed, & sani hominis contactus ex alio capite visui, tactuiq; in dissecto corde adhibito præcellit, quod in illo naturaliter, in hoc omnino præter naturam, & per consequens vt plurimum inordinatè, confusè, conuulsuè, palpitante, saltuosè mouetur; itaut difficillimum sit, in similibus, quid certi animaduertere.

Proinde quiuis iudicet, an illa digiti immissio in Cor dissectum sit in talibus ambagibus æquus Iudex: cuique enim constat, sensibile corpus rem præter naturæ ordinem in se immisam vndique premere, quo à se illam expellat, vt scilè lignis quoque ipsis succedit, vbi adhuc viridia se-

Ad motus differ-
rentiam agnoscendam
plus tactus
quam visus
valet,

Sani hominis
obiectus Auto-
psia anato-
mica præ-
cellit.

Digitus in Cor
immissio ne
æquus Iu-
dex.

caritur,

cantur, vel perforantur. Quid igitur de corde omnium sensibiliſſimo arbitrandum? præter quod ſi in latitudine reſtringitur, in longitudine elongatur, vel ſi in hac decurtatur, in illa dilatatur.

Nec minus fallax ab huiusmodi anatomicis incisionibus ſumitur indicium circa ipſuſmet Cordis ſolius motum in ſeipſo conſideratum; an ſcilicet peſtus feriat, quando elongatur quodammodo, an verò quando decurtatur; ruruſq; an elongatio ſit cum cavitatis reſtrictione, & decurtatio cum ampliacione, an verò è contra. Et huius quidem ambiguitatis cauſa eſt, quod Cor ob mortis terrorem, aut quod aliud animi, & corporis vehemens pathema, non pulſu ſolum, ſed & ſaltu ſimul non raro moueatur; itaut tunc duplici motus combinatione Cor moueri, vna videlicet ex diaſtole, & ſyſtole conſtante, altera ex ſaltu, & concidencia, iuſtè poſſit exiſtimari. Et de ſaltu quidem annuit *Gal. lib. 7. de anatom. adminiſtr. cap. 14.* quando dixit, ni forcipe excipiat Cor, è digitis quandoque exilire. Adde, & præter hos alios illi obuiſe motus, nempe tremulum, & vndofum, vt adnotat *Thom. Barthol. lib. 2. anatom. reſorm. cap. 6.* & palpitacionem, vt Alij. Quæ omnia arguunt, & merito ſequuntur ſummam Naturæ conſuſionem ex accelerato, & impetuoso interitu, in quo ſtatu quicquam ordinatè, ac paciſicè fieri, incredibile eſt, vt pluriès inculcauimus. Præterea, cum os peſtoris anterioriſſimum auferatur, nec videre licet in quo motus modo Cor illud feriat.

Hinc eſt, quod varias, imò contrarias circa hunc articulum apud Auctores reperire eſt atteſtationes. Eraſiſtratus, quem in hoc ſequuntur Mercatus, Harueius, Deuſingius &c. (hic tamen non omnimodè), & Alij, tradit, Cor tunc peſtus petere, cum elongatur, & circumquaque reſtringitur; Galenus è contra, quando ad baſim retrahitur quidem, ſed ampliatur vndique, vt & confirmat *Veſall. lib. 6. de hum. corp. fabr. cap. 15.* Inter recentiores *Comring. lib. de ſang. gen., & mot. cap. 36.*, quamuis in verbis viſus fuerit cum Harueio ſentire in antecedenti capite, re tamen abiſpo, & à Gal. diſcedit: totus enim ibi eſt in oſtendendo Cordis tunc iſtum fieri cum eius mucro verſus baſim retrahitur, & conſtringitur vndique; præmiſſis hiſ verbis, quæ non iniuria tranſcriptiſ. „ Nil dubitandum itaque eſt (inquit), expelli ſanguinem in Aortam, „ quo tempore Cor ſurſum attollitur, adeoq; hæcenus benè vulgo doceri. Non verum tamen illud (vt inde vulgo, & ab Ariſtoteliſ quidem æquo creditum), Cordis ſinum tunc ampliari, ac diſtendi: Veriſſimum enim eſt, quod primus Columbus docuit, ſed poſt ipſum luculentiùs expoſuit Harueius, vndique tùm Cor contrahi, ſinuſq; reddi anguſtiores. Ac contrahi quidem cordis mucronem ad baſim, vel baſim ad mucronem, plerique agnoſcunt: ſed interim dilatari ſinuſ, conſent, breuius enim reddi Cor, ſed latius diſtentis ventriculiſ.

Eiuſmodi ſerè ſenſus eſt doctiſſima, omniq; vera laude digniſſima Bartholomei Torrini Lectoriſ Taurinenſiſ Excellentiſſimi Epiſtola ad me familiariter tranſmiſſa, in qua ſic me de experimentiſ ſuiſ com-

Fallax anatomicus Cordis motus.

Contraria Authoriſ de illo atteſtationes.

„ monefecit : Non hic moror (ait) Harueum opinantem, Cor in syſto-
 „ le prolongari, & prolongatione ferire . Oculis hoc totum concedo
 „ meis . Aperto canis peſtore, & ſpogliato Corde, ſollicitè eius Anti-
 „ ſtrophem meditator . In ſyſtole duo obſeruo, arctari Cor penitus ſecun-
 „ dum omnes diſenſiones, & ſubſultare totum eius corpus adeo, vt in
 „ ſaltu reflexa cuſpis peſtus offendant . In diaſtole reponitur in ſuo ſitu
 „ conquieſcens, & ſecundum omnes diſenſiones ſenſibiliter amplia-
 „ tum . Apud Deuſingium ex aduerſo videre eſt quendam enunciaſſe,
 „ Cor tunc temporis decurtari, extrinſecusq; ampliari ſecundum latitudi-
 „ nem; at ex illa ampliacione parietum etiam intro facta ſinus arctari;
 „ Cuius farinæ, & illa Bartholini aſſertio eſt, qua loco citato palam de-
 „ ſcribit, imò & apta figura delineat, Cordis ictum tunc fieri, quando Cor
 „ ad baſim retrahitur, dilataturq; & tubereſcit in latitudine; quo tempore
 „ Cor intrinſecus arctari, & ſic ſyſtolem fieri autumat; in hoc Galeno,
 „ & in omnibus cæteris Auctoribus repugnans . Et ſic in eiufdem Cordis
 „ elongatione ventriculos intrinſecus dilatari, ſanguinem recipere, &
 „ diaſtole perfici, comprobatur . Sentias igitur circa hoc quicquid velis, &
 „ omni ex parte Aſſertorum publicum inuenies, & ſua quæque Autopſia
 „ nitentem .

Contra
 Neotericorū
 vocem Autopſiam de-
 ſignatio.

Et hæc illa Autopſia eſt, & ſenſata fides, cui tantopere quidam Ana-
 tomici confidentes, plurima à Veteribus compaginata dogmata inter-
 uoluere affectant : ex qua tamen nil certi, vt oſtenſum eſt, circa Cordis
 motum, qui a quibuſdam non incongruè . Buripi motui æquiparatur,
 haberi poteſt, ſiue varij perlegantur Authores, ſiue oculariter omnia
 inſpiciantur .

Quid igitur vetat, qui putant alios deceptos, decipi ipſos ? Ne ergo
 piaculum tam grande quis exiſtimet, ſi ab Harueiano ſenſu recedentes,
 ad aliorum ſenſum, qui rationi inhæreat magis, properamus, Galenoq;
 & Veſallio credentes, arbitramur, Cor, cum peſtus percutit, ampliari,
 non extra tantum, ſed & intus, & diaſtolem eſſe : cum pro dilatatione
 exteriori tot etiam Neotericos atteſtantes habeamus, pro interiori non
 ſenſum ſolum, & Harueium ipſum, qui libenter admittit, cum Cor de-
 curtatur, diaſtolem fieri (ſolummodo falſus in eo, quod tunc peſtus
 attingi ſcripſerit, cum elongatur); ſed & rationem, quæ ab exteriori
 dilatatione interiorem arguit; & per quam cuique ſuaderi poteſt, Cor
 peſtoris oſſi acciſurum magis, ſi citum, & præcipuè verſus anteriora
 dilatetur, nil decurtatione obſtante, quæ ab infra rectum arguit; &
 e contra ab eo reſeſſurum, ſi anguſteſcit, nil elongatione iuuante, quæ
 non exterius, ſed inferius videretur acceſſum paritura .

Cor, & ante-
 rias eodem
 moueri mo-
 do authori-
 tas proba-
 tur.

Quo conſiſto, conſtat quoque ſenſibiliter, Cor tunc dilatari, cum ar-
 teriæ dilatantur, arctari, cum arctantur; In qua aſſertione non ſolum
 Authores habemus Herophilum, Galenumq; cum cæteris Græcis homi-
 num Aſcleis, ſed & inter Poſteriores Valleſium lib. 3. contr. Med. cap.
 3. Lud. Mercatum lib. 1. de pulſ. traſſ. 2. (licet hic opinetur, non Cor, ſed

Aortam

Aortam exterius pulsantem sentiri), Andream Laurentium lib. 9. quæst. 10. Vulcherum Coiterum *observat. anatom. pag. 124.*, quos ambos citat *Coming. cap. 35.*

Et equidem ratio sensui prædicto ita comes: siquidem Quod ab eodē facultatis actu procedit, idem, & omnino simile esse debet; Sed arteriarum motus ab eodem actu facultatis, quo Cordis motus procedit: Ergo, & idem, & omnino similis esse debet. Major de se patet: Eadem enim facultas non potest contrarios actus simul, & eodem tempore exercere; quod esset, si quo tempore Cor constringitur, eo dilatarentur arteriæ, & e contra. Minor probatur; quia motus Cordis, & arteriarum simultaneus est per totum corpus, & tum in magnitudine, tum in crebritate, tum in celeritate, ni quid præter naturam obstat, omnino idem: idcirco, & ab eadem omnino causa provenire necesse est: idem namque effectus eandem causam arguit.

Cor. & arterias eodem modo pulsare, ratio perma.

Alterā ratio à Mercato adducitur hoc modo: Si arterias non vi propria, sed a Corde distributa dilatari, atque constringi, verum est, & revera existit, nequit profectò intellectus capere, quia ratione Cor se dilatans possit influere virtutem constringentem, sequi constringens dilatantem. A corde autem in arterias influere facultatem, constat, quia ligata arteria, versus Cor pulsat, versus extrema oritur.

Ratio secundæ.

Sed fortius: Idem utriusque Cordis ventriculi motus. Hoc stante, si cavitates ventriculorum in diastole dilatantur, quomodo simul non dilatabuntur oscula in ipsis implantata? Si verò oscula, cur non vasa ipsas continuata? Idem de systole dic: si enim Cor constringitur, quomodo non simul constringuntur ipsius foramina? Si verò hæc arctantur, quomodo dilatabuntur ipsorum continuati ductus? Ei quidem in dilatatione cavitatis debere oscula in ipsam penetrantia quoque dilatari, & ex adverso in illius adstrictione eadem constringi, omnis lex necessitatis suadet, nisi forsitan quis imaginetur, crumenarijs plicis Cordis ventriculos gaudere, itaut tum dilatari, tum constringi citra osculorum contactum possint.

Ratio tertiæ.

Probatur idem exemplo ab alijs externis motibus sumpto: Nam eodem modo, quo mobile, movetur, & quo movens, movetur, & mobile, siue sursum, siue deorsum, siue dextrorsum, siue sinistrorsum, siue ante, siue retro quid moveatur (Intellige autem id de motu à movente intento: nam si de eo, qui per accidens succedit, loquamur, fieri potest, ut quid moveatur contrario modo ei, quo aliud movet; ut si arcum quis tendat, ac retrahat, ex qua retractione ei aculatio proutnit; si quis iaciat sursum lapidem, qui deorsum postea cadat.) Cor autem arterias movere sicuti verissimum est, ita non movere per accidens indicat æqualitas utriusque motus, quæ in accidentarijs moribus non servatur. Idem, & in Politicis accidit: quales enim Principes, tales solent esse Ciues, & ut alius dixit, Regis Ad exemplum totius componitur Orbis. Quænam verò deformitas, si cum Rex antiprimum, reipsum Proceres,

Idem exemplo probatur.

cum is retro, hi graderentur ante ?

Obijetur
contra sen-
sum addu-
ctam fallacia

Obiect onl
prima respō-
sio.

Responso
secunda.

Responso
tertia.

Obijetur
contra ratio-
nes.

Tollitur ob-
iectio.

Hiscæ autem rationibus obuiam eunt Neoterici. Et primò quoad sensum contra illud dictum, quod in dissecis animalibus Cor præter naturam pulsatur, opponunt Galenum, qui 7. de anatom. administrat. 12. item cit. ait, Corde denudato, ipsius functiones posse seruari incolumes, Respondetur, primò, nil ijs hanc prodesse authoritatem, qui ipsi Authori nil in rei essentia deferunt. Testis autem ab aliquo proditus, si contra producentem definiat, irrevocabiliter concludit. Stetur ergo Ei, Cordis actiones seruari incolumes, cum hoc per Eundem Cor simul cum arterijs dilatabitur, & constriquetur; Alioqui si in hoc per Eos non benè dixit, nec in altero pro ijs credendum: non enim authoritas vnus dimidianda. Respondetur secundò, ex eodem Gal. ibi, & cap. 14. non in omni Cordis denudatione eius seruari functiones, sed in ea tantum, quæ sit citra pectoris penetrationem, cum alioqui, si pectus penetretur, & introspicientis membrana diuellantur, voce; ac respiratione priuatum animal suffocetur, & in alia symptomata incidat; inter quæ optimè enarrata concurrere, cuilibet consideranti, & experienti notum erit. Additur tertio, incolumes seruari functiones sic intelligendum esse, ac si diceret non emori, non deficere statim. Alioqui tum Cor, vt sanum, pulsare commodè, ordinatè, æqualiter, dicat, quicquid illic velit Galenus, minime sic nudè intelligendus est; cum in lypothimias, synopes, furores, inflammationes aliaque animi, & corporis pathemata incidant huiusmodi laniata corpora, à quibus quantum pulsus immutentur, ab eodem traditur libris de caus. puls. & alibi.

Quoad rationes opponunt, non ab eadem facultate arterias, qua Cor, moueri, neque à mutata, sed solummodò quia à pulsante Corde sanguinè, ac spiritu replentur, eas dilatari, & inde concidere. Verumtamen ist hæc nihil obnubilant primò, quia causa adducta inutilis est, vt monstrabitur cap. sequenti. Secundò quia etiam si ea daretur, nihilominus simul constringi Cor, & arterias esset necesse; cum dilatationem præcedere debeat introitus replentis corporis, hunc pulsio impellentis, hanc eiusdem constrictio; quæ ideo simul cum arteriarum constrictione cadet. Quod si quis dicat, hæc opera sola ratione, non re separari, hoc falsum; & ubi in breui cauitate sensu non distinguantur, sic non est in longa, & multiformi, vt est omnium arteriarum processus: eo enim tempore, quo ab impulso corpore dilatantur arteriæ, iam Cor vacuum alium succum attrahit, vt iterum subito impellat; & sic nihilominus dilatantur simul. Et hic quidem conceptus libenter Galenò. refertur, cuius elocutio 4. de diff. puls. 2. talis est: Simul, itaque fieri vtraque; est necesse, distentionem, & repletionem earum, verum alteram antecedere alteri, rationem causæ obtinentem, in corde distentionem, repletionem in arterijs, vt cernitur, & in externis rebus. Polles fabricorum, quia distenduntur, proinde replentur; Sacci, culei, vtres, quòd impleantur, idcirco distenduntur. 7. tertio quia dilatationem

CAPVT DECIMVM OCTAVVM. 199

dilatationem sequens constrictio vel provenit ex arteriarum actione, vel ex simplici coincidentia; non ex hac, quia, si irruens sanguis potuit eas dilatare iacentes, multò magis dilatatas in dilatatione, retinebit: si verò ex actione, iam intentum obinetur: quia non ex propria, ut omnes constitentur: ergo ex mutuata; & sic ratio persistit, Cor se dilatans alijs constrictionem, & se constringens dilatationem non posse impartiri.

Similiter ad exemplum facilissima illorum obiectio est exceptio eidemmet per Nos addita: Cor enim dicunt non intentionaliter, siue per se arterias dilatare, sed hoc per accidens sequi ex impulso spiritu, ac sanguine: Sed verò ex iisdem adductis hæc quoque eliditur obiectio; & cum hoc maxime, quod dilatio in toto arterioso genere simultanea, equalis, & ordinata est, ex quo non accidentarium opus vnquam constituitur; nec violentum, quæ inordinationem, & inæqualitatem quandam semper includunt.

Sed verò non sine aliqua ratione adducti Neoterici sunt in huiusmodi Erasistrati sententiâ. Et præcipua quidem, à Vallesio, & Mercato citatis locis Partis vice adducta, illa est, desumpta ab usu pulsus, qui est, ut viuificos spiritus, ac sanguinem à Corde in arterias depulsos ad membra deuehat: Ratio ergo huiusmodi est: Cor (inquiunt), & arteriæ ex Galeni, & Affectarum sententia, dilatatione trahunt, constrictione expellunt: Sed non possunt simul ambo trahere: quia, Corde ab arterijs trahente, & arterijs à Corde, mutua tractione impediuntur: Hanc verò friuolam ibidem dissensimè vterque docet Auctor: Primus enim clarè ostendit, neque Cor arterijs, neque arterias Cordi impedimento esse, quin aerem, ac spiritum per foraminula quæque conuolantes, & à coniugibus venis, & per capita arteriarum, sicuti, & per fibras sanguinem pro sui indigentia trahant; maximè cum omnia simul consentiant, & ab omnibus recipere, & ad omnia demandare possint. Addit his Mercatus ex Gal., dum cor dilatatur, membranalus Aortæ osculo ad natus claudi, dum verò constringitur, eas conuiuere, ut ideo facilius sit, arterias à Corde trahere, quàm Cor ab ipsis; tùm & in constrictione Cor in ipsas aliquòd impellere: nihil enim vetat, eas, se constringendo, expellere ad oscula, & quid impulsu excipere; cum sua quædam non desit arterijs naturalis cauitas, quæ etiam in cadaueribus conspicitur.

Alias quoque pro iisdem adiungit rationes Mercatus; quas tamen lucidissimè dissoluit, ut mihi opus non sit plura cumulare.

Obiecitur ad exemplum, sed in casu sum.

Pro opinione opposita ratio.

Eiusdem dissolatio ex Vallesio, & Mercato.

CAPVT DECIMVM NONVM.

Quod non ob sanguinis à Corde factam propulsionem arteria pulantes dilatentur.

Istè nimis conqueritur Franciscus Vallesius de Scriptoribus ijs, qui iam diu à Galeno agitata, & gloriosè euictas controuersias, frustra

Artis studiosos defatigantes, innouant, varijsq; argutijs pacatas interturbant. Sic ille *lib. 3. controu. Med. cap. 3.* Inter huiusmodi Scriptores meritò reponendum cenfeo doctissimum: alioqui Virum Harucium Archiatrum Anglum, qui inter cæteras veterum dissensiones has de pulsuum essentia, vsu, & causis in pristinum reuocauit. Is igitur (vt de presentis loquar articulo) cum animaduertisset, post Hippocratis tempora duas circa concordiam pulsus Cordis, & arteriarum controuersias non incelebres infurrexisse, vnā scilicet circa modum, tempusq; pulsationis, alteram verò circa ipsius causam; in quarum prima contra Hippocratis, ac Herophili dogmata (vt refert *Gal. lib. de vsu puls. 4.*, & *4. de diff. puls. 6.*) Erasistratus statuebat, quo tempore Cor constringitur, arterias dilatari &c. vt dictum est capite antecedenti: in altera verò contra Herophilianos ipsos, (quibus cum in hoc sensit Galenus) credidit, & docuit, hoc ideo dilatari arterias, quia à Corde spiritus in eas subito iruens distendit cavitatem, quæ postmodum ex propria concidentia, aut virtute constringitur; Huic fatiscenti, & veluti sepultæ opinioni sese patrocinantem addidit, & rationi iungens Autopsiam, in plurimis Galeni gloriam obscurare festinauit; solummodò ab Erasistrato dissidens, quod non spiritum irruentem, sed sanguinem implentem arterias attollere, sensit, & erudiuit. Sicq; per hos non quia arteriæ dilatentur, ideo attrahunt, & opplenitur, sed quia oppleniuntur, ideo dilatantur; prorsus contra Galeni sententiam, qua decernitur, attolli arterias, virtute ipsi à Corde præstita. Quod ergo non à replente sanguine, spiriuiuè illæ dilatentur, probatur primò ex supra probatis in duobus proximis capitibus.

Prima ratio
ab essentia
pulsus.

Nam, si verum est, vtrāque pulsus partem esse actionem tūm Cordis, tūm arteriarum, non erit verum, quod à replente corpore dilatentur: sic enim non actio, sed passio esset diastole.

Secunda ratio
à pulsus
modo.

Probatur secundò, quod non succedaneus, vel vndosus, sed vnicus, siuè simultaneus est omnium arteriarum motus ad pedes vsque: eodem namque momento, quo in temporibus, in carpo, in pectore, & pedibus pulsatur, vt ambabus manibus binas tangenti partes innotescit. Et hoc esse non posset, si à replente corpore fieret eleuatio: qui enim posset replens succus sic subito à corde ad pedes, ad manus, ad verticem per tot tubulorum ambages conuolare, quin interim, dum Aorta attollitur, adhuc cætere iaceant adstrictæ, & dum hæ dilatantur, illa non concidat, aut vi constringatur? nullum spatium in natura pertransitur sine tempore.

Tertia ratio
à quantitate
requiritur
quædam.

Sed demus hoc posse fieri, addita arteriarum ipsarum cooperatione, vt ait VValleus; hoc tamen redarguit præter superandi spatij distantiam, quantitas corporis, quæ requireretur: Etenim, si vel tactus, vel visus adhibeatur; iudex, clarum est, arterias cavitatem suam saltem tertia parte capaciores in dilatatione fieri, quàm antea in constrictione essent: Demus ergo, in ijs omnibus constrictis (nec enim adeo naturaliter constringuntur,

stringuntur, quin etiam post constrictionem naturalis aliqua cavitatis remaneat, vt docet *Valles. cit. lib. 3. cap. 2. ex doctrina Gal. lib. an sang. in art. sit cap. 3., & de usu puls. cap. 6.*) libram vnā sanguinis retineri, si à sanguine dilatandæ sunt, semilibra ipsius requiretur. At quomodo quantitas hæc per Aortam à Corde istu vno euolabit? & quomodo, & si tota Cordis cavitatis exainaniatur (quod non sit), sufficere ad tantam arteriarum omnium auctam cavitatem implendam? Et hæc contra Harueium. Contra Erasistratum idem valet argumentum: Nam qui potest tanta spirituum copia à cordis sinistro ventriculo paululum constricte (vel etiam prorsus inanito) ex sufflari, quæ valeat omnes inflare arterias? Res clarior est, quàm possit, ac debeat in dubium euocari. Non ergo à replente corpore dilatantur; sed quidem dilatantur, per attractionem sanguines, spirituum replentur, non à Cordis sinu solo, sed à toto ambitu, cavitatibus, venisq; per earum oscula, & crebras anastomoses, attracto. Illa verò insuper arteriarum cooperatio (nam non admittitur), vel propria arteriarum virtus est, vel à Corde influit. non primum: quia ligata arteria, statim trans ligaturam pulsare desinit. non secundum: quia Cor se constringens (vt Hi supponunt) non potest dilatationem imprimere, vt dictum est.

Facit etiam illud Galeni experimentum, quo *lib. an sang. in art. sit cap. 8.* probat, non ex influxu spirituum (multo ergo minus sanguinis) per arteriarum cavitatem, cordis impulsu, pulsus fieri; sed ex virtute à Corde ipso (sicuti à cerebro per neruos in musculos contingit) per illarum tunicas influente, Illustratione quadam, prout doctissime concludit *Valles. cit. cap. 2. ad finem*. Scindit autem ille per longum arteriam, & inde calamum immittit, vel æneam fistulam sic adaptatam, vt vulnus obturetur, & sanguinis profluuium inhibeatur; quamdiū autem ita se habere arteriam, conspicies, tamdiū totā pulsantem intuebere: vbi verò circumducto laqueo, arteriæ tunicam circa calamum astrinxeris, tum, licet sanguis, & spiritus per calami cavitatem ad fines arteriæ similiter comportatur, non tamen arteriam ultra laqueum pulsare videbis. Quod si ob eam causam pulsarent arteriæ, certè earum partes, quæ ultra laqueum sunt ad extremum vsque pulsarent.]

Facit quoque sensibile aliud experimentum in Corde ipso, cui, à pe-
Aliud experimentum.
 ctore euulso, Aorta; seiuncto, per aliquod tempus durat pulsatio, quod non esset; si ad hanc necessariò sanguis requiretetur. Pro arterijs autē ligetur venā arterialis, per quam volunt, in sinistram Cordis ventriculum sanguinem deriuari, & nihilominus, dum Cor pulsauerit, & Aortæ propagines pulsabunt: non ergo sanguinem pulsus earum efficere, sed virtutem à Corde manantem, iure asserendum venit.

Addantur his incongruentia similis violentiæ in naturalibus, animatis, viucentibusq; corporibus, quæ se vndique mouent, aluntur; tum frustranea, quæ hinc esset, tot fibrarum textura; tum superfluitas similis sanguinis influxus, ex quo cogatur Cor, vt sufficiat, spontè datum re-
Quinta ratio ab incongruentia.
 petere

petere, & partes ferè nauseabundæ prodiga manu ad se demandata remittere.

Sexta ratio à rhythmo. Nec parum in idem contribuit rhythmus ille, siuè proportio, quæ inter diastolem, systolem, & perisystolem obseruatur, quæq; non adesset, si ob sanguinis replentis imperum arteriæ dilatarentur: citius enim, ac vehementius diastoles fieret, vt quæ à violentia esset, quàm systoles, quæ à natura; vel e contra, vt cap. 17. fuit ostensum.

Contra primam rationem obijciunt. Verùm contra has rationes insurgunt Contrarij, vel quis pro ijs poterit obijcere, siuè respondere; Et ad primam, adhuc non constare, dilatationem arteriarum illarum esse actionem, cum argumenta proposita de Corde concludant, non de arterijs, quæ non propria, sed Cordis virtute mouentur, vt ideo passio potius dicenda sit. Redicunt autem, quod, quamuis rationes propositæ principaliter de Corde concludant, consequenter tamen, & de arterijs, quas ab eadem virtute, eodemq; prorsus modo, ac rhythmo moueri, monstratum est: Neque enim Cor ad arteriarum pulsus efficienter concurrat, sed sola participatione, & influxu virtutis: siuè autem quid ingenua, siuè sibi impartita inoueat, meritò motus ille illius actio dicitur; vt de musculis patet, quorum motus, quamuis à cerebro sibi per neruos exporrigatur illius facultas, non immeritò eorum actio dicitur. Et sic in definitione pulsus benè Galenus se gessit, dum illum actionem primò cordis, & deinde arteriarum dicit, prout in superiori capite tetigimus.

Remouetur obiectio. Contra secundam dicunt, huiusmodi simultaneum à cordis impulsu arteriarum motum non esse impossibilem, cum similis videatur in alijs exterioribus. Itaque adducebant exemplum trabis, quæ in vno capite tacta, in altero statim respondet. Si quis etiam chyrotecam inflat, videbimus, eodem tempore omnes digitos inflari, eodem submitti. Idem de sclopi idu, qui scopum statim attingit. Assumit etiam quistubum aliquem, qui in mille alios sit deuaticatus, & supponatur, adaptari in eius osculo vas aliquod, ex quo, vt in clysteri, intrudatur in illum succus, & videbimus, ad vnicum capitis impulsus ex omnium sinibus eodem

Ad secundam rationem obiectio. prorsus tempore proflire, prout in aquæ varijs lufibus experiri quis potest. Sed nimis euident ad hæc omnia parat responsio. Et sic ad primam duo iam per Deusingium, & alios satisfactum, cum videatur tempus inter capitis, & extremitatis idum manifestè ad osculum intercedere. Et quamquam ex repentina sclopi idu multoties fallatur sensus, non tamen lyncea fallitur ratio, in interstitio admittendo? vnde clara est venatorum quotidiana obseruatio, qua si euntis animalis caput ferire auent, vltra conspiciunt; si pedes, caput oculis proponunt; quod multò magis in nostro casu valet, in quo per tot gyros, mæandros, & reditus arteriarum peruadere idus debet. Exemplum verò tubuli à Deusingio, & Plemio propositum minus cæteris habet consistentiæ: Etenim quamuis detur (quod non potest tamen ob infinitas propemodum arteriarum germinationes conuelli) vnico Aortæ premittu omnia arte-

Ad eam respondetur. riarum

riarum capita simul succum effundere, id intelligeretur primum, si plenæ omnes remanerent tubi ramificationes, quia sic factus tubi in principio fini illius simul respondet: At si tubus ubique concidat, vt arteriæ, & Aorta simul in systole faciunt, quomodo concipiemus, ex propulsu vnus oris ad fines omnes vnico contextu peruenire citra cuiusdam successus inundationis speciem? intelligeretur secundò de simplici succi per extremitates profusione, non de eleuatione, & subsidentia tubulorum, quæ in Pulsu requiruntur, & corpus implens ideo exigunt: contrarium verò constat in ludicris aquæ proflitionibus, quibus ductus præseunt stabiles, & immoti, non, vt pulsus, molles, ac subsidentes.

Ad tertiam dicunt, sanguinem rarefieri, & in spiritum abeuntem, valde dilatari: Sed hoc contra Harucium est, qui spirituum existentiam, vel omnino negat, vel omnino à sanguine inseparabilem supponit. Sed & impossibilis similis in spirituosam ampullositatem abitio: nam vel sanguis abit in spiritum in ipso Cordis ventriculo, & sic non maior ab ipso poterit impleri cavitatis, quàm sit ipse ventriculus cuius cavitatis recessus omnium arteriarum cavitatis minima est; vel in ipsis arterijs, & sic illæ calidiores Corde ipso supponentur, quod non est. Nec sic subita substantiæ immutatio in naturalibus datur, vt ex sanguine spiritus, ex spiritu iterum sanguis oculi istu fiat, & sic non sanguis, sed spiritus ad membra ferentur, quod contra circulationem est.

Ad experimentum Galeni opponunt, illud practicum vel impossibile, vel difficillimum saltè. Addunt, citra ligaturam quòque, si gossipio obturetur, itaut sanguis, ac spiritus transire non possint, ultra ipsam obturationem pulsum cessare: At uero ad primam obiectionem dicimus, ob actionis, & experimenti difficultatem non tolli illius veritatem, ac vim, quas tot alij Anatomici iuste admiserunt, & admittunt. non ideo enim quia vnus nequeat, vel nesciat, de omnibus, & cæteris idem dicendum. Ad secundam dicimus, improporcionatum esse experimentum hoc ad primum: nam in illo Galeni, arteriæ parietes à naturali suo situ per calami intromissionem non dimouentur, & ideo non ligata, in suo pulsu durat, non ligata desinit: At si intrudatur gossipium, si modò debet sanguini, ac spiritui via omnino intercepti debent quoque parietes violentè dilatari, & extendi, quæ tunicarum expressio, & extensio idem, quod ligatura, operatur; vt nervis accidit, qui non à ligatura sola, sed & à tumore, vel ossæ compressione, vel extensione, sua illustratione priuantur. Non ergo vnum alteri æquipollet experimentum.

Ad rationem verò quintam dicunt, incongrua multa nobis videri, quæ Natura non curat; & sunt ab ea multa, quorum ratio nobis ignota est. Sed inutilis hæc responsio, vbi de quæstione an sit differitur, & disputatur. Constat enim, aliquid à Natura fieri, congruentia omnis Naturæ voluntati, & potentiae remittenda, & vbi capax iudicium hominis sit, facile illam propria ex causa congruentem inueniet. At vbi de Naturæ actu ambigitur, semper de eo perfectius, & congruentius præsumendum, sic

Obiectio e-
tra tertiam
tollitur.

Obiectio ad
Gal. experi-
mentum.
Altera obie-
ctio.

Tollitur
prior.

Tollitur se-
cunda.

Obiectio e-
tra quintam
rationem tol-
litur.

Obiectio ad
sexam tolli-
tur.

Harueio
ratio adduc-
tur, & solui-
tur.

sic illius sui; primi Auctoris summa sapientia, & providentia diſtante.
Ad sextam tandem dicit *Plempius munit. fund. sect. 6. cap. 5.* rhytmum
illum non perſentiri in pulſu: Sed ad hoc redicere ſufficit, quod, ſi ille,
vel quis alius ſe cum Galeno exercuerit induſtrioſè circa pulluum co-
gnitionem, illum percipiet, ſicuti & Valleſius, & Mercatus, & Maſſaria,
& alij præclari Viri iam percipere, & etiam nunc percipiunt.

Contra hæc autem omnia videtur eſſe ille ſanguinis exitus cum ſal-
tu, qui ſingulo ictu à vulnerata arteria, & ſic in diaſtole prodiſt, qui ma-
niſeſtum Cordis impulſum arguit, qui; non videretur fieri poſſe, ſi dila-
tando attraherent. Huic tamen obiectioni iam alias ſatiſfactum eſt;
Sed & hic iuvat repetere primò, non ſatis conſtare, an in diaſtole, an
verò in ſyſtole huiusmodi fiat ſanguinis eiſculatio: quia tam paucum
temporis ſpatium inter duos hos motus intercedit, vt diſſicillimè à ſenſu
poſſit diſtingui, an in vno, an in altero fiat; & ſi rationi ſtandum eſſet,
potius quidem in ſyſtole, deberet illa ſanguinis eruſtatio fieri, ſi verum
eſt, quod partes, ſe conſtringendo, impellant, & dilatando recipient
(quamquam nec deſuere, qui cum Archigene opinabantur, arterias ſe
conſtringendo repleri, & dilatando euacuari; exemplo oris, & narium,
quæ dum ſpiritum attrahunt, videntur conſtringi; ſed hoc perperam, vt
oſtendit *Gal. lib. de uſu pulſ. cap. 4.*) vt in vulnerato peſtore accidit, iuxta
eiſdem Galeni placitum lib. 8. de anatom. adminiſtr. 3. ſecundò dicitur, ſi
illud verum ſit, vt aduerſò ſupponitur, arteriam, cum integra ſit, trahere,
quidem in ſe ex ſuis naturalibus oſculis, & ſic ſe dilatando: at non à lace-
ra parte, quæ contento, & ob ſpiritum ſalienti ſanguini, aditum, inuita,
remittit. Cum ergo in diaſtole vulnus quoque dilatetur, ſit, vt tunc ſpi-
rituſo, fugaci; ſanguini exitus pateat, ſicuti in ſyſtole illud conſtringi-
tur, & hic retinetur.

CAPVT VIGESIMVM.

*Quod idem ſit tum pulſus, tum reſpirationis uſus, & is non ad ſanguinem
circulariter vehendum.*

Superfluum videretur, huiusmodi diſputationis primò agitare mem-
brum, ſi ad vnguem ea, quæ de eodem argumento apud Galenum
lucidiffimè paſſim, ſed præcipuè lib. de vtilit. reſpirat., & de pulſ. uſu
exarata inueniuntur, quis legeret; & præterea Valleſium, qui doctiſſimè
idem diſcuſſit lib. 3. controu. med. cap. 2. Verum quoniam Harueio, &
ſequacibus placuit nouiter hanc cribrare arenam, non inconueniens fue-
rit de illo quo que nonnulla dicere; prout præſentis tempeſtatis occaſio
poſtulat, prætermiſſis ijs, quæ repetitione, diſcuſſioneq; non egent.

Idem uſus ab
iſſidem vtriuſ
que mutatio-
nibus proba-
tur.

Eundem igitur, & pulſus, & reſpirationis eſſe uſum, ac vtilitatem;
maniſeſtè oſtendunt mutationes in ipſiſtum naturaliter, tum præter
naturam euenientes, quæ vel eadem proriſus, vel proportionales, & ſup-
pletoriæ

pletoriæ ad inuicem considerantur: eædem, quidem, vbi omnia secundum naturam cuiusque (siuè instrumenta spectes, siuè facultatem) libera sint, nec ab aliquo impedita: proportionales autem, & suppletoriæ, vbi eorum aliquod vel deficiat, vel à cursu libero impediatur: Sic si animal ob cursum, laborem, iram, aliamuè calorificam causam considerabiliter incalescat, itaut pulsus in magnitudine, frequentia, ac celeritate augeatur, proportionaliter respirationem quoque augeri, obseruamus. Si ob aeris frigiditatem, timorem, aquam, aut aliquam aliam refrigerantem causam immoluitur, rarefcitq; pulsus, etiam respirationem in his cernimus immutari.

Nec sine sale eam nos adieciisse particulam Vbi omnia libera sint, nec ab aliquo impedita quis putet: ea enim omnes tum exceptiones, tum obiectiones, quas possint, ac soleant Nouatores prædictis opponere, promptè soluit, & ad nihilum conuertit: Etenim, si dixerint, multoties mutari pulsum in frequentia, aut magnitudine, spiratione in ijs non mutata; sicuti, & respirationem nonnunquam alterari, pulsu in iisdem non alterato; promptum his respondere, indigitareq; erit, tunc vel alterutram facultatem impedire, vel alterutrius instrumenta læsa, & præter naturam affecta esse; in his enim duobus has euariare actiones, citati meminere Auctores, dum pulsus à vitali facultate, Corde, ac arterijs; spiratio autem ab animali potentia, pectoreq; ac cæteris ad eam dicatis organis exercetur: non eò tamen rem peruenire, quin suppletoria in cæteris mutatio fiat. Vt si pulsus ver. gr. magnus fiat, respiratio autem ob pectoris, vel diaphragmatis aliquem dolorem, vel alium affectum, qui promptè, & multum dilatari impediatur, talis esse non possit, tunc magnitudinis defectum celeritas, & frequentia compensabit. Sicuti &, si ob locutionem, vel mentis alienationem quis rarius spiret (cum frequentior sit pulsus), tunc maior multò, & celerior inspiratio, & expiratio fiet: habent enim tria hæc magnitudo, frequentia, ac celeritas tum in pulsu, tum in respiratione eam inter se colligantiam, & affinitatem, vt sese mutuò adiuuent, suppleatq; earum vna alterius defectum. Eadem possunt, & in pulsibus impedimenta euenire, vt si duræ nimis ob senectam, vel tabescentiam arteriæ fuerint, accidat autem, magnum accendi in Corde calorem, ex quo maior respiratio contingat, tunc pulsus non quidem magnitudine ob dilatandi difficultatem, sed eius loco frequentia, celeritateq; immutabitur. Hoc vnum in summa habeatur infallibile, vtrunque horum motuum sibi mutuò respondere, sicq; ad vnus mutationem immutari, & alterum, si generica intercedat causa. Ergo ad eundem finem tendere vtrunq; vniue vsui ambos inferuire motus, pro verissimo, & iam pluriès definitò tenendum.

Nec illud remoratur argumentum, quod, si sic esset, deberent sibi quoque in singulis ictibus respondere: nam ad id dicitur, hoc minime necesse esse; cum non incongruat duobus, homini, & puero, ad eundem terminum eodem tempore peruenire, si primus magnis passibus rari-

Non obstat
mutationis
varietas ali-
quando in
alterutro vsu.

Suppletoria
mutationis
exemplo.

Non obstat
istud verum
si varietas.

tem, alter crurum breuitati passuum frequentiam, ac celeritatem addat. Porro idem de pulsu, & respiratione dicendum: hæc siquidem tantam vno afflatu aeris copiam trahens, reddensq; quantam duobus, tribusue ictibus Cordis excipi, ac restitui posse, putamus, magnitudini raritatem, dum alter paruitati duplicatam saltem frequentiam adnectit sic, vt ambo simul eundem terminum attingant, eundem explent vsum. Quæ tamen diuersitas non casu à Naturæ Conditore, sed prouidenter imposita est; vt scilicet voci commoditas, & verbis melos optatus adsit. Sic eximie suo more docet *Gal. lib. 6. de vsu part. cap. 2.*

Non obstat
facultatis, &
instrumento-
rum varietas

Neque item illud aliud officit, Sicuti à varia facultate, & per diuersa instrumenta illi duo peraguntur motus, ita varium quoque vtriusque argui finem: nam respondetur, Naturam sic in cæteris actionibus multis prouidisse, & hoc, vt à plantis animalia, & ab his homo dignitate distingueretur; addendo attractionibus, & excretionibus multis, quæ à commoda possent impedire vita, animalia instrumenta, quæ simul cum naturalibus ad eundem tenderent finem, eidemq; incumberent actioni, vt videre est in cibi, potusq; deglutatione, cui & muscoli, & fibræ, voluntaria, & naturalis facultas cooperantur; in sæcume, lotiq; deiectione, pro qua intestinorum, vesicæq; transversalibus villis tot abdominis, & illorum orum muscoli additi sunt adiutores, & quasi magistri. Idq; ne à suis opportunis negotijs, & ciuilibus ludis interim homo inuitus plerumque retraheretur. Sibi autem inuicem inservire, seq; mutuo adiuuare in omnibus naturalibus, & voluntarijs motibus facultates, certissime conspicitur. Et hinc est, quod illarum vna pereunte, necesse est, reliquas quoque vnâ perire.

Pulsus, & res-
pirationis v-
sus ex Marce-
llo.

Constito autem de identitate finis vtriusq; horum motuum, quærendum est, quis hic sit. Respondent Neoterici hi, pulsus vsum esse, vt nouus semper sanguis ad partes nutriendas feratur; (& in hoc circulationis necessitas elucet) respirationis autem, vt per dilatatos pulmonis porosus sanguis aere aspersus ab arteriali vena ad venosam arteriam, hincq; in sinistram Cordis ventriculum facilius, & volatilius commigret. Sed vtrunque falsum esse, probabitur. Et primum quidem, quia, vt proximo annuimus capite, sanguinis ille continuus transitus pulsus liberè, vniuersim, simultaneè, & æqualiter dilatari, constringiq; vetaret: cum enim per sola arteriarum ora, & per earum anastomoses in venas apertas sanguis in dilatatione exceptus posset educi, in earum reliquo plenitudo remanebit; vnde nec illa pulsus concinnitas, æqualitas, ac rhythmus obseruaretur; Partes etiam à continuo noui sanguinis affluxu in sui nutritione impedirentur non secus, ac si ventriculum continuè nouis alimentis quis oneraret; ex eo enim praua iusurgeret concoctio. Secundò cessante, vt ibidem dictum, sanguinis fluxu, cessaret, & motus: sed ligata Cava, aut Corde ipso euulso, adhuc pulsus perseverat. Item puncta aliqua arteria, & velociter per puncturam sanguinem exeunte, ita ut non solum is, qui à Corde illi suggeritur, sed & qui ab alijs arterijs,

& venis, exeat liberaliter, nedum in suas inferiores propagines elaboratur: pulsus tamen, & in ea, & in his etiam perseverat, quoad vsque Cordis perseverat cum vita pulsus, nisi illa vinciatur. Tertiò si per arterias tantum sanguis ad nutrienda membra deferretur, illis alligatis, vel cæsis, necessariò cessaret partium, ad quas deferunt, nutritio; cum per venas eò deportari non quidem, sed imò per eas sanguinem à membris ad Cor alliciã Junioribus supponatur: Id tamen minimè observatur, cum videamus, parùm, vel nil illa membra pati, solum quid modicum frige-
 „ scere, vt habetur ex *Gal. lib. de usu puls. cap. 1.* Quod si spatio tempo-
 „ ris (inquit) non torpent modò, frigentq; ac pallida redduntur, sed
 „ etiam ali desinunt, per communicatem, consensumq; magis hæc,
 „ quàm ex pulsuum impedimento fortasse contingat. } Ergo per eas
 solummodò nutrimentum deferri, non est asserendum. Si verò dixerint, idem nobis obijci posse de venis, non eodem nos ferient modo, qui admittimus, per arterias quoque ad membra sanguinem arteriacum, & spiritusum pervenire, à quo promptum illis est alitionem sibi in egestate parare, quamvis non sic permanentem. Quartò Natura sicuti in necessarijs non deficit, ita nec abundat in superfluis: Ideo benè notat
 „ *Galruccius Phys. partic. disput. 3. cap. 3. circa finem.* Non plus attra-
 „ hi, exugiq; alimenti à singulis partibus, regulariter loquendo, quàm
 „ ipsis necessarium sit, hicq; servari perfectissimè iusticiam distributi-
 „ uam: quamobrem eadem ferè semper servatur proportio inter mem-
 „ bra corporis, eademq; ferè vultus lineamenta. } Quantum verò su-
 perfluum foret illud continuatum per arterias suppositum sanguinis im-
 partes affluuium quis neget? cum exinde cogantur venæ (vt Harueiani dicunt) superfluum reassumere, & ad Cor, vt noviter coquatur, & calefiat, reducere? Confer huc, benignissime Lector, quæ cap. 3. 9., & proximè antecedenti de hoc diximus, & validam efficies probationem.

Respirationis autem adhuc minus videtur esse finis à Circulantibus assignatus, tum quia, si sic esset, deberet pulmonis dilatatio cum arteriarum dilatatione congruere ad hoc, vt confluent in huius elevatione sanguis per dilatatos poros liberè transire, & aeris spiritositate imbui posset; cui alioqui, si quo tempore dilatatur arteria, pulmo constringitur, manifestum futurum sit impedimentum: Ea verò motuum coincidentia non accidit; quia rarior saltem duplo est thoracis motus, quàm Cordis pulsus, sicuti, & illius, quàm huius, perisystole longior. Tum quia difficilè traheretur aer, si pori pulmonis vndique repleverentur, imbuerenturq; sanguine. Tum quia inspiratio potius sanguinem removeretur, cum aer frigidus attrahatur, frigidum autem cogat, constringat, retineat, obstruat. Tum quia, si acri permisceretur sanguis, vel huic aer, deberet in expiratione aer sanguinis tinctura inflectus exire, quod in speculo afflato dignosceretur facillimè: hoc autem non aspiciunt. Tum quia pituioso, crassoq; existente sanguine, libera impediretur respiratio, acri à crassitie aditu pernegato; acri verò, & bilioso existente

Vnus respiratio-
 nioni assigna-
 tus rejicitur.

tuffis moleftiffima effugi minimè poffet; quorum neutrum in huiusmodi cacochimijs, per phlebotomiam conſpicuis, obſeruatur non rarò. Tum quia inſpirationi non reſponderet expiration: aeris enim inſpirati pars ſanguini mixta, & ad Cor delata, expirari minimè poffet: atvero æqualitatem quilibet in ſeipſo obſeruare valet. His adde, quæ de tali per pulmones ſanguinis tranſitu ſupra aliquando taſta, infra verò cap. 22. melius diſcuſſa inuenies, & ni fallor, ſat firma reddetur ratio *noſtra*.

Vtriuſque vſus ex Gal. Valles, & Mercatus.

Igitur cum Galeno dicendum, vſum vtriuſque motus eſſe moderatione natiui caloris, quæ inducitur tum aeris attractione, per diaſtolem, & inſpirationem, tum fuliginum, ſi quæ ſunt, excretionem per ſyſtolem, & expirationem inſequentem, tum eiufdem caloris per vtrunque motum ventilationem; Et animalis ſpiritus inſtaurationem. Ad quod demonſtrandum clariſſimis, & ipſe *lib. de vtil. reſpir.*, & *de vſu pulſ.*, & *Valleſius lib. controu.*, & in parte Mercatus, rationibus, quæ apud ipſos legi poſſunt, vſi ſunt, vt ideo eas hic referre ſuperfluum ſit.

Alius vſus pulſus, alius eſſentiarum.

Sciendum verò eſt, vt prudenter notat Mercatus, aliud eſſe conſiderare vſum arteriarum, aliud vſum motus ipſarum: Multas enim poſſe ab vno, & eodem instrumento operationes exire, certiffimum eſt. Quare mirari deſinat Harueius, à Galeno arterijs plures vſus assignari, pulſum ſcilicet; ſanguinis, ac viuifici ſpiritus ad omnia membra deductionem; caloris natiui euentationem &c.; quorum quædam à facultate mouente, quædam in vim vacui, quædam conſecutiue ad ipſum motum adimpleantur. Quicquid ſit, pulſui eundem vſum eſſe ad commodum Cordis, & omnium corporis partium, quem reſpirationi Cordi præſtat, certum eſt.

Quædam ob æctio tollitur.

Enim verò, quamuis videamus, reſpiratione ſublata, animal citiſſimè commori; aliquà verò arteriarum, etiam carotidum, alligatà, ex qua in arterijs omnibus ab illo ramo deductis pulſus tollatur, non valde membra illis irrigata lædi nec in calore, nec in motu, ſenſuue, propterea quod à Corde non per arterias ſolum, ſed & per venas (quamuis minùs) calor inſluit: non ideo tamen ex hoc inducitur, quin idem amborum vſus ſit, vt diximus; cum aliud ſit pulſum in genere, ſine quo nec momento quidem viuatur, & aliud alicuius tantùm partis conſiderare. Cuius diuerſitatis ratio eſt, quod ſimile non eſt principium ipſum inſiti caloris, pati, aut aliquod eorum, quæ ab illo calorem accipiunt. Quippè id ſemper præcalidum eſſe oportet, vt quod ipſum tum cæteris pulſandi motum præſtat, tum ipſa calfaciat; his ſatis ad ſalutem eſt, ſi vel exigui compotes ſint caloris: præterea, principium ipſum ſi naturali calore priues, non ipſum modò refrigeres, ſed etiam vniuerſa, quæ ab eo prius calorem capiebant. Duplici igitur commoditate partium, cula quæque Cor ipſum ſuperat, quominus noxam ex caloris inopia celeriter contrahat: Siquidem cum illi plurimo ſit opus, cæteris exiguo; cumque illi à nullo calor inſluat, ſed alijs ab illo, vtrique illud celeriter à naturali ſtatu recedit, hæc minimè. *¶ Hæc Galenus lib. de vſu pulſ. cap. 2.*

CAPVT.

Impugnatur Galtruchij de Circulatione sententia, & ad omnes eius rationes respondetur.

NON solum autem Medicis huiuscè temporis Scriptoribus non paucis placuit hancce Harueianam de motu sanguinis adinventionem acceptare, ampliare, decorare: quod & eadem quibudam Philosophis adeo arrisit, vt eam pluribus vallare argumentis non destiterint. Inter hos præcipuum, vt opinor, locum tenet Reuerendus Galtruchius è Societate Iesu, Vir celeberrimus, qui in sua Physica particulari illam plurimum opinionem cuexit, auxit, ditauit. Hic quidem egregius Auditor, cum prius *disputat. 3. cap. 3. prope finem*, vt superiori capite citauimus, dixerit, à partibus non magis alimenti attrahi, quàm necessarium sit, non æquè bene postmodum sequenti capite quarto sanguinis circulationem admisit; vtpotè seperfluâ, & sine qua facillimè ob continuum spirituum effluxum non per arterias solum, sed & per venas calor partium insitus seruatur; partes autem, alliciendo, quod sibi necessarium est, à spirabilibus venis, optimè nutriuntur sanguine eo, qui, etsi in venis moretur, ab arterijs tamen ipsis per communes confluxus, ac anastomoses, spiritu vitali, & calorifico talis ferè efficitur, quales partes viuenter existunt, vt optimè aduertit *Mercatus lib. 1. de puls. tract. 2. cap. 2.*, vbi docet eandem gratiam venas arterijs tribuere, quam Caua tribuit Cordi pimirum sanguinis refudationem in ipsas, quo ex eo, & aere spiritus viuificus instauretur, & inde vicissim ab arterijs venis retribuatur.

Illius verò superfluitatem quis inficiabitur? ex ea siquidem, sic arguente Harueio, & cæteris, plus sanguinis ad partes defertur continuè, quàm ab ijs possit, ac debeat absumi, vt ob id teneantur venæ illum perpetuò retrahere ad Cor: Quantumcunque enim daretur (quod non conceditur) per arterias ipsas nutrimentum corpori offerri, ad quid magis per eas vehi, impelli, quàm sit necessarium? Si verò quod necessarium tantum, sufficit autem resolutioni instaurationem, & agglutinationi materiam idoneam suppeditari, cur non sufficiet, ferri id solummodo, quod à quotidiano usui possit refundi? Nonnè ad id implantatum tum naturalem, tum animale in homine appetitum scimus, vt necessaria alimenta, & irrorantes potiones in ventrem, qui terræ vice fungitur, & radicibus præparat alimenta, deglutire valeat? Et vnde sic crebrò insurgit hic, nisi quia partibus exhibitum refocillamentum iam consumptum est, & ideo noua quærentur, noua appetuntur? Sed si partibus semper superfluit, quid est, quod illarum nouat appetentiam? An Cor forsan illud est, quod membrorum præuidens egestatem, violentius à ventris venis exugit? Si sic est, cur simul à partibus iam præparatum, & portectum per

Circulationis superfluitas probatur.

venas

venas surripit? an non, & hæc à Corde sugentur? Quod si non Cor, æ partes illæ sunt, quæ violentius tunc trahant? Si verò sic est, cur attractum venis remittunt? Sed & si in corpore sanguinis illa quantitas est, quæ scitur, & partibus continuè porrigitur per circulum nonne sufficere per plures dies, abiq; quod nouus toties appetatur cibus? Quod cum non fiat, constanter asserendum, neque sanguinem partibus subtrahi, neque superficier in ipsas trudi, sed omnia ordinatè fieri; partes nempe, quod sibi necesse est trahere, eoq; consumpto, iterum ad attrahendum insurgere, vsquequò à parte post partem sudio ad ventrem pertingat; idq; toties fieri, quoties nouo alimento indigent citra iacturam eius sanguineæ portionis, quæ ad venarum cauitatem mediocriter implendam, & vitalem calorem fouendum requiritur.

Auctoritas
Salomonis à
Galtruchio
adducta cō-
uiliatus,

Ad eam verò circulationem admittendam, si à Rota, de qua Ecclesiastes cap. 12. meminit, inductus fuit Vir acutissimus, imbecillum illud argumentum est pro circulo supposito ponendo: Nam Rota, cum organum quoddam sit, manifestum est, à Sapientissimo non ad motum ipsum, seu sanguinis circulationem eam metaphoricè adaptatam esse, sed bene ad aliquod membrum; quòd continuè prohauriendo è cisterna, super, vel propè quam possum sit, coaceruato in ea liquore, imbueatur. Verba Salomonis sunt hæc: Antequam rumpatur funiculus argenteus, & recurrat vita aurea, & conteratur hydria super fontem, & confringatur rota super cisternam. Ponatur ergo pro rota Cor, Caua verò cisterna sit, e qua illud, se mouendo sanguinem hauriat continuè, & similitudo attendatur: Rota enim, super cisternam posita, haurit quidem aquam, vt per canale in hortulum spargatur, & ea irrorentur omnia: at non reuertitur in cisternam aqua: quare ab hoc non describitur circulatio.

Nec forsan Hippocratem latuit ea Salomonis dictatio; qui proinde lib. de Cord. num. 8. cisternam sanguinis vocat dextrum Cordis ventriculum, à quo Mens hominis, quæ in sinistro per ipsum ventriculo sita est, sanguinem adsument. Mens hominis (ipquit) in sinistro ventriculo sita est, & reliquæ animæ imperat. Nutritur autem neque cibus, neque potibus, sed pura, & illustri substantia, ex sanguinis diuersione nata. Adsument autem alimentum ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittens, & depascent &c. Qui etiam lib. 4. de morb. 2. Cor fontem sanguinis appellauit. Et sic per ipsum hydria intelligeretur arterialis vena, quæ ab ipso sanguinem recipit: quamuis in hoc verisimilior est Galtruchij opinio, nomen fontis attribuens lecori, quod sanguinis officinam ritè, & prudenter statuit, hydriam ad Cauam venam, quæ sanguinem ab illo haurit, adaptans. Vt ergo ad rem redeam, quantuncunque, vel Cor à Caua, vt Nos interpretati sumus, vel sinister Cordis ventriculus à cisterna, quæ per Hippocratem dexter ventriculus est, sanguinem motu suo allicit, & in arterias diffundit; non ob id necesse est, illum ad Cor per venas redire: sed à partibus in aliuonem pro-

priam absumetur, & dissoluetur continuè, sicq; non totus per Cor sanguis, sed pro membrorum foku necessarius itabit.

Si verò aliæ ab eo positæ rationes, quæ ad hanc, illum inducere sententiam, considerentur, facillè illas soluisse poterat, si alteri Vir eximius fuisset Veterum opinioni addictus. Nam quod primò ait, singulo Cordis pulsu aliquid à Caua-exugi, iam supra cap. 12. confutatum est: Sed etiam si concedatur (quod non); id tamen adeo parum esse potest, vt solum ad pulmones, nunquam immotos, alendos, & ad sanguinis arteriaci, ac spiritosi fabricam, seu reparationem sit satis: nec enim Cordis dilatatio tam valida est, vt quid consideratione dignum trahatur intus, nec systole adeo restringens, vt sanguinem valde expellat: semper enim in Cordis ventriculo dextro sanguis asseruatur, qui alteri ingressuro obicem ponit; Vt propterea debillimum sit illud Harueij argumentum à capacitate ventriculorum sumptum, vt quantitatem sanguinis singulo ictu eiaculati metiatur: hi enim in sano homine modicissimè tum dilatantur, tum adstringuntur. Ideo à quotidiano hepatis subsidio facillè, quod ad hoc necesse est, refunditur: & hinc fames, hinc sitis pro indigentia modo excitantur, quibusdam magis, quibusdam minus, & his crebrius, illis rarius, prout laboribus, vel otio incumbitur, prout; calor natiuus, vel vehementior, vel debilior, vel vorax, vel segnis, magis, vel minus quærit, attrahit, absumit, absque quod circuitione sit opus.

Vbi secundo ait, partes non quolibet sanguine nutriri, sed calidiore, spiritoso, & subtiliori, vt intra poros facilius subeat; id quidem verum, si de parte subtili, spongiosa, spiritosaq; qualis pulmo est, deq; vitali, & calorisque partium foku agatur: minime verò, si de alijs compactioribus, crassioribusq; partibus, est caro, os, neruus, cartilago &c., siue de vera alitione, quæ alimenti in aliti substantiam conuersio est, agitur: huiusmodi enim crassiori indigent sanguine, si modò facilius assimilari, agglutinariq; debet; alioqui, & difficilius vnietur, & facilius dissipabitur. Hinc est, quod nutritio ex vino facilis quidem est, & cernitur ex robore spiritosis partibus addito; at non durabilis, cum citò relabuntur vires, & vinosi corpus ferè contremiscat. Ideo venosus sanguis ad id aptior censetur, vt qui crassior, & sufficienter calidus tum ex se, tum ex communicato per arterias halituoso spiritu existit; Qui sanguis, & ad extrema facillimè penetrat, tum attritus, tum à continuis motibus animi, & corporis impulsus; non obstantibus valvulis, quas in omnibus non esse venis, & vbi sunt, paulatinam transmigrationem non impedire, sed subitam tantummodò coercere, ex supradictis constat. Neque tantus per arterias, sanguinis proventus sit ad partes, qui ab ipsis debeat dissidiri, & in venas remigrare, cum ob pulsus per tot anastomoses latè ab Harueianis admissas, intra venas sibi comites possit vel singula systole, vt Galenicis placet, vel in diastole, vt Alijs, refundi, & similiter acceptari, itaut paucissimus pro partibus ipsis remaneat, absq; quod resorberi à venis sit necesse.

Prima Cal-
truchil ra-
tio dissolu-
tur.

Secunda ra-
tio etiam
soluitur.

Quod

Tertia ratio
dissoluitur.

Quod tertio dicit, vitali caloris influxu partibus omnibus opus esse, conceditur: Sed cum hoc optimè huic caloris transfusioni locus est citra sanguinis continuum occursum; cum & per spiritus, & per sanguineos vapores continuè à Corde impulsos, ab arterijsq; attractos, tum per arterias à venis, & in has ab illis mutatos, & redditos, partes facillimè foueantur. Quinimò, & per venas quoque calorem à Corde (licet minùs) partibus communicari, per experimentum proprium docet Gal. lib. de vsu puls. cap. 3.

Quarta sol-
uitur ratio.

Quod quartò supponit, per huiusmodi circulationem multa explicari difficilia, quæ aliàs laterent; Cuique singula percurrenti patebit, ea non minus sine illa sciri, & explicari: Corde enim illæso, facillè aliarum partium corrigi intemperies, ipso vitiato, totum interire animal, quis non videt, ex purissimi arteriaci sanguinis adhæsu, spiritus viuifici continua ab illo translatione, calorifq; natiui communicantia, tractu, pulsusq; per eadem arteriaca vasa hoc enasci? Præcipuam enim inibi esse animæ sedem, regiumq; thronum, à quo bona cuncta procedunt, non autem impartitas gratias ad ipsum pro repastinatione reponendas esse, hæc eadem suadet ratio. Curenim sanguis ineptus reddetur, si continuè à spiritibus fouetur, diffatur, iuxtaq; animæ imperium nunc intrò se recipit, nunc foras volitat; nunc currit, nunc cernit receptui? Hinc alternæ vicissitudines somni, & vigiliæ; motus, & quietis; coctionis, excretionis; alimonie, dissolutionis, milleq; aliorum, ex quibus humanæ vitæ insignia panduntur, quæ cum circulatione vix subsisterent, sed perpetuis agitationibus corpus exponeretur. Secundò quem in finè sit instituta respiratio, supra dictum est; & visum non esse ob sanguinis circulati progressum, sed ob natiui, vegetiq; caloris moderationem. Tertio cur in sætu vterino adsit illud ouale foramen à vena Caua non ad sinistrum Cordis ventriculum, sed ad venosam arteriam, nil aliud est: quàm congrua pulmonum enutritio per illam arteriam, quæ vnica constat tunica, à qua facillimè sanguis, immotis pulmonibus, suppeditetur; cum in nato infante à motis pulmonibus facillè per arterialem venam ob dilatationes, constrictionesq; mutuas eliciatur. Alioqui, & in fœtibus, tum arteriæ, tum Cor pulsât, & sanguis arteriacus à matris arterijs suppeditatur, & ab ipso fœtus corde seruatùr, gignitur, & corpori communicatur. Quartò cur Cor pulset vsque ad mortem, nec sine eo viuât animal, clarum est, esse, ex vitalis flammulæ natura, quæ, vt ignis, ventilatione eget, & pabuli rarefactione, vnde & spirituum, & caloris impartitio sequitur: minimè verò esse ob sanguinis motum, tum quia sine illo, in exempto Corde adhuc durat pulsus; tum quia sine actuali partium motu, fibrarum ope, humorum, ciborum, & excrementorum in corpore reliquo motus sunt. Quintò cur in extincto animali tam parum sanguinis in arterijs sit, ad quid aliud referendum, quàm ad sanguinis spiritositatem, tenuitatem, & paucitatem? idq; vt sine impedimento ad partium euentationem dilatarentur,

tur, comprimerenturq; . Alioqui si circulatio adesset, continuus quodque in ijs sanguinis affluxus esse deberet: quousque enim Cor mouetur, tantum pelleret, quantum traheret, & è contra . Sexto Cur in strangulatis caro liuescat, & venæ turgeant, etiam sine circulatione patet: vbi enim flamma extinguitur, nigrities remanet, & sanguis ad locum dolentem, ac ligatam confluit. Quinimò ex hoc patet, quantum pulsui incommodet sanguinis concursus, qui non, vt aer, constrictioni dat locum, & ideo aeris euentatione cessante, cessat, & pulsus. Septimo Cur in phlebotomia non fiat stricta ligatura, iam ratio in superioribus capitibus fuit exposita, & clarè liquet esse, vt sanguis liberè possit à venis superioribus, & maioribus ad dolentem, & ferè ob ligaturam tensam venam confluere. Aliter, si ab arterijs venire deberet, stricta conueniret eò vsque, quò vena omninò clauderetur, dummodò arteria profundior, duriorq; in suo seruaretur pulsandi modo, indicium, nec suas premi tunicas, nec cavitatem impediri: quo tamen casu vix exit sanguis, sicuti laxato ligamine, fluit. Octauo mutatio coloris sanguinis, in phlebotomia fluentis, non est, vt ipse asserit, progrediendo ad laudabiliorem semper: quia non minus frequenter e contra euenit, nempe vt in principio laudabilis, inde deterior, & postmodum deterrimus etiam in adhuc sanis egrediatur. Ex quo imò præcipuè indicium desumitur, à venis sanguinem exire: quia si aliter esset, quomodo vires cum tali sanguine, in arterijs existente, & sanitas constarent? qui spiritus ex eo fierent, & qui vapores ad Cor eleuarentur? Nono Cur non continenter, sed saluòse sanguis à vena exiliat, facilis responsio est, quod tunc à pollicis interpolatis moribus, à comitis nerui, ac arteriæ vibratione, à fibrarum, quæ circum circa sunt artificiosis conatibus sanguis à vena exprimitur: id enim in ijs præcipuè obseruatur, quibus propè sanè degentibus sanguis probus est, nec superabundans. De reliquo, si prauus, ebulliens, vel superabundans in venis subsit, & continenter fluit, & impetuòse adeò, vt alio non sit opus motionis artificio. Tunc ergo quamam anastomosin, tam magna in arteria comite imaginatione concipitur, vt sic redundas, & magnum sanguinis effluuium, quod nec ab ipsamet arteria capitur, suggerat, & affluenter per temporis spatium, pulsu non mutato, fluxu non alternante, in vnicam sectam venam demandet? Si omnes brachij arteriolæ in vnum caudicem versus digitos degenerarēt, & hic in venam sectam insinuaretur, facile intellectu esset, sic profusum in eam posse eijci sanguinem: sed si semper magis ramificantur, & disperguntur, & anastomoses inter comitem tantum arteriam, ac venam reperiuntur, nescio, quomodo, per solas anastomoses maior sanguinis quantitas eructetur, quam ipsa arteriæ cavitates ferre possit. Decimò quomodo Cor à cerebro refrigeretur, vt Aristotelis sententia est (si modo vera) facile respondebitur, sine circulationis adiutorio id fieri à continua irroratione aquosæ humiditatis per tonos, & cavitates multas ab eo in subiectas partes descendens; cuius significationem præ-

bet non inepta pluuiæ generationis analogia capiti, cerebroq; ex vaporibus congruens, vt ibidem idem annuit Aristoteles.

Cætera, quæ ibi Galtruchius per circulationem explicari tradit, eiusdem ponderis sunt omnia, vt non videatur opus longius tempus conterere.

CAPVT VIGESIMVMSECVNDVM.

Quadam sibi met ab eodem Galtruchio facta, & inde solutæ obiectiones refirmantur.

SED quoniam huc incidimus, non parum incrementi capiet assertio nostra, si quædam alia, quæ de hoc subiecto sequenti capite quinto discutit egregius hic Auctor, ordinatè percurramus; Qui, vt firmius huiusmodi statuminet Harueij opinionem, nonnullas ei opponit, adducitq; obiectiones, ac instantias, quas inde ordine eodem dissoluit: quam tamen irreparabiliter, nunc, potiores percurrendo, & ponderando, videbitur.

Obiectio prima.

Obijcit igitur primò. Dum vena Caua supra ascendens Cordi committitur, & in ventriculum Cordis dextrum aperto foramine, superius recta progreditur, deberet quidem sanguis ab inferioribus ascendere, à superioribus infra progredi, vt in Cor possit introire (& hæc obiectio à

Solutio Galtruchij.

, nobis etiam facta erat supra cap. 4.) Respondet, Ea parte, qua vena Caua ascendendo committitur Cordi, obseruari aliquid intus prominens, quod impedit motum vltiorem sanguinis, illumq; potius, deflectat ad Cordis ventriculum. Verum in principio libri, præloquio ad Lectorem, hoc suum dictum corrigit, dicens, se sic ibi dixisse, quia iam id audierat, à quodam Medico; postea verò à Guiffarto melius intellexisse, dictam non adesse prominentiam, sed quandam valvulam, quæ huic officio incumbit: Sed leuis est hæc ex Guiffarto reparatio: Nam præterquam quod sola illa sygmoidum valvula, quæ intra Cordis dextrum sinum aperitur, nulla alia in Cauæ Cavitatem propè Cor valvula reperitur, obiectum non tollit; Vbi etiam adsit, nec apparens inde aliquid rationis elicitur, qua asueratur inconuenientis emergens: vel enim aperitur ad superiora, vel ad inferiora. Vt cumq; sit, manifestum, quod ab vna parte admitteretur, ab altera inhiaberetur potius, quam ad Cor vtrunque dirigeretur; id quod etiam de prominentia illa dicendum, quæ vel vtrunq; impediret, vel potius neutrum.

Infirmatque solutio.

Instat inde, saltè sanguinem illum, qui in mesaraicis venis est, à Corde non prodire, neque ad Cor reuera; cum nulla via pateat à Porta ad Cauam; Et respondet, à Corde per arterias prodire, & à venis redire, per securum transeundo ad Cauam, & consequenter ad Cor per anastomoses illas, quæ inter Cauæ, & Portæ ramulos in iecore à Laurentio, & alijs admittuntur: Huic verò responsioni contrariatur plurimum

Iecoris

Galtruchij instantia, & ad eam responsio.

CAPVT VIGESIMVMSEC VNDVM. 211

Iecoris venarum viduitas: per hoc enim Viscus nulla arteria pertran-
sit, sed vna tantum illius concavæ parti inhærens, vt notat *Vesall. lib.*
5. cap. 7. Quare cum, & illa ob tunicarum crassitiem venis capacitate
cedat, non videtur quomodo tanta sanguinis quantitas, quantam tot
venarum surculi continent, ab arteria illa feratur. Verior ergo fuerit
assertio, sanguinem ibidem à lecore ex chylo generari (prout, & idem
alibi opinatur Auctor) & in Cavam reponi.

Instat in super, sanguinem, vbi computruit, si per Cordis sinus transi-
ret, labefacturum Cordis vigorem cum vitæ periculo; Et respondet,
quamvis egrè, sanguini tamen putrido transeunti Cor assuescere, prout
refert Laurentius, in Empyicis pus in thorace collectum non solum tussi
reijci, sed & à cavitate pectoris in pulmonem absorptum, ac inde in
Cordis sinistram ventriculum instillatum, per arterias ad vrinam trans-
mitti, saluo ægro: Cuius tamen instantiæ tantam agnosco vim, &
efficaciam, vt ob hunc præcipuè respectum circulationi repugnem, ob
hancq; solam causam putem, à Natura adeo crassum, validumq; septum
inter Cordis ventriculos constitutum fuisse; quò scilicet per illius incon-
spicuos porulos, tamquam per lapidem colatorium subtilior solum, &
prætiorsior sanguinis pars à dextro in sinistram ventriculum transco-
letur, inde paulatim in arterias ad totius corporis vitalem forum trans-
mittenda. Et hæc eadem potior animæ armatura est, qua morbos
etiam acutissimos, & cōdione, & crisi vincit, fugat, nihilat. Alioqui,
si sanguinis vitium idem in toto corporis centro moraretur, per omnia
vasa ferretur, & animæ conspectius domicilium occuparet, vnde ægro
salus, vnde ægro vita? Quæ Arx saluabitur, si in quoscunque, etiam
visceraneos, cuniculos hostes excipiantur, nullo tuto ostiolo, nullo vallo
iuuante? Si igitur sanguis ille, qui nonnunquam putridus, chlorus, viri-
dis, teter per venam sectam bis, ter, & quater emittitur, ab arterijs exi-
tet, quis pulsus, quæ nutritio, quis color, quæ quies? Et verò si arteria
tundatur, vt in scarificatis cucurbitulis obseruare licet, non similis, sed
sanguis floridus, etiam in cacochimo corpore, vt plurimum exit. Sin-
gnum, non illam aden euidentem, vt aduersò statuitur; fieri sanguinis
translationem à dextro in sinistram Cordis sinum, sed per septi porulos,
& incurrentes alias anastomoses arterialis venæ (si placet) & venalis
arteriæ, tenuiorem, & saniozem eius portionem, tum dilationis, &
constrictionis vi, tum substantiæ familiaritate, tum caloris energia
(his namque modis omnibus Cor trahendo vti posse, docet *Gal. 6. de*
vsu part. 15.) pro spiritu, & arterioso sanguinis reparatione allici, ac
veluti transcolari. Cui & attestatur paucitas sanguinis, qui in sinistro
Cordis ventriculo, & arterijs extincti animalis inuenitur; nisi forsan
aliter in strangulatis vsuueniat ob respirationis defectum: tunc enim
cum Cordè aer contendatur, & arteriali venæ, necessariò in dilatione
sanguinem vndique (ne detur vacuum) attrahunt, quem nequeunt,
se constringendo, pellere, suffocantur. Et hoc est, quod Harueio, Con-

Modem re-
sponso re-
pellitur.

Instantia al-
tera ex eodẽ
deteritur.

Eadem gra-
matur in qua
tia.

ringio, & alijs imposuit, ex hoc consiſcientibus, copioſum inde pro circulatione ſua ſanguinem fluere. Aliud autem apud me eſt, poſſe, & aliud actu fieri: multa enim ex neceſſitate, quæ non ſpontè multa per vim, quæ non ſunt naturaliter. Sed ad rem. Ea igitur Galtruchij reſponſio inſufficiens: nam aliud eſt ſanguinem corruptum continenter per Cor tranſire, & maximè per eius ſiniſtrum ventriculum, in quo propriè caloris natiui viget fons; aliud verò vnica vice tantum, & criticè, hoc eſt cum prauis ſymptomatibus: Accidit enim aliquando Naturæ, quod in extremis periculis homini contingit exterius, in quibus Vna ſalus victis nullam ſperare ſalutem; & illud Thucididis conſilium Galeno approbatum Agentes aliquid, vel periclitari. Rarò trutem tales ſunt à pulmonibus ad vrinam, vel aluum tranſmigrationes, & mihi adhuc ſemel tantum in pleurítico, per aluum expurgato, videre contigit; cui tamen nec ſic benè ceſſit res, ſed imperfèctè admodum per annum poſt vixit. Rarò enim iuuat temeritas, & Qui amat periculum, peribit in illo. Ab vnico ergo criſis exemplo viam ordinariam ad aluum, vel vrinam arguere non licet, quæ quotidiana experientia per tracheam arteriam, & Empyicis, & pleuriticis, & peripneumonicis, aſthmaticisq; à Natura conſtrata fuit.

Altera Gal-
truchij ob-
iectio.

Altera quam ſibi offert, obiectio eſt: Sanguini à dextro Cordis ventriculo ad ſiniſtrum monſtratus tranſitus per pulmones occluſus, ſaluo animali, eſſe poteſt; ſicuti reſert Riolanus, aliquos diù vixiſſe, quibus tubercula in trunco venalis arteriæ, & arterialis, venæ poſt obitum inuenta fuere. Ergo nec eſt neceſſarius. Reſpondet, tunc mortuos illos fuiſſe, vbi tubercula illa ſanguinis tranſitum impedire potuerunt; & ratio eſt, quod ſaltem illa vaſa eò vſque aperta fuiſſe opus fuit, quò alerentur pulmones; & ſic potuiſſent reliquo ſanguini. Sed manca ratio: nam quid pauculo liquori præbet aditum, quod non multo; aliud autem eſt tranſire paucam illam quantitatem ſanguinis, quæ pulmonis alitioni erat opus, aliud verò totam corporis maſſam ſanguineam, & breui tempore.

Eiuſdem ſo-
lutio.

Invalide ta-
men mon-
ſtratur.

Inſtat ibidem, alios vixiſſe, quibus omnino conſumpti fuerant pulmones, & ideo non potuerat illis patere via per ipſos. Reſpondet, vixiſſe, quoad aliquid pulmonis ſuperfuerat, ſicuti, & vaſorum, per quæ ſufficiens ad qualemcunque ſanguinis tranſitum via pateret: Atuerò, & hæc reſponſio mutila: nam aliud, quàm vaſorum exigua, & corrupta pars requiritur ad totum ſanguinem deuehendum. Præterea ſicuti per corruptos canales tranſiens aqua labem contrahit, quomodo ab hac expers ſanguis, per morbidos pulmones tranſiens, abibit? Et qua via ergo ad integram vſque pulmonum corruptionem vita perduraſſet? Cor namque à ſanguinis tetra tranſitu læſum antea fuiſſet, & ex materia ſætente ſpiritus non vitales, ſed lethales produxiſſet.

Alia Galtruc-
chij inſtan-
tia, ſuaq; reſ-
ponſio.

Improbatur
hæc.

Nonne eiuſ-
dem inſtan-
tia, & reſpō-
ſio.

Inſtat denudè, Sic graui premendos fore ſarcina pulmones, ne poſſent continuo, quo agitari ſolent, motui idonei eſſe. Reſpondet, illis talem ſarcinam

CAPVT VIGESIMVMSEC VNDVM . 213

farcinam grauem minimè fore, cum sit eis connaturalis: Sed non bene instantia tollitur: quia, vtunque sit naturalis, debetur ad obeundas actiones ea dispositio, & facilitas, quæ ab ipsa actionis natura, & efficacia desideratur; alias, si illæ non adsint, nec erit actio, nec eius concinnitas. Quare velocibus animantibus corporis leuitas, crurum agilitas, & longitudo data sunt, vt citò motus perfici possit; Et sic quibus hæc insunt, motus etiam velocitas inest; quibus autem contraria, corporis grauitas, crurum magnitudo, & breuitas inest, in motu quoque tarda esse, conspicimus; Valet autem ab extrinsecis, & notis argumentum ad intrinseca, & ignota; Ergo, & in casu valebit argumentum ad oppositum sit: Pulmones continuo motui respirationis apti agnoscuntur: Ergo continuo sanguinis transitui locum minimè dabunt: Si enim pori sanguine impleantur, quomodo pro expiratione stringentur? Et quomodo aereui pro inspiratione admittent? Si verò vacui inspirationi locum dederint, quo tempore aere turgent, quomodo sanguinem circumuentem excipient? Si verò exceperint, aere à sanguine pulso, quomodo eodem tempore inspiratio, & æqualitas inde in utroque motu quieteq; seruabitur? Nihil graue sibi natura parauit: propterea leuissimos, porosissimosq; pulmones construxit, vt & motui, & aeris tum susceptioni, tum remissioni agiles essent: cur ergo sanguinis farcinam, viarum obices, & transeuntis fluctuationem succi superadderet? Inconcinna hæc sunt, & à Natura aliena.

Et sic, præter naturam, ac per vim extorqueri hæc, & similia, in viuis dissectis videri visa *Conringio lib. de sang. gener. & motu natur. cap. 32.* per ligaturam arteriæ venali addactam, respondere promptum est: Eo enim casu nec fit respiratio; & Natura angitur; & sanguis ad vulnera currit; & Cor adhuc pulsans, cum pro aere sanguinem trahere cogatur, sanguinis tali motui festinato dat actum: integro autem animali contraria insunt, respiratio nempe, Naturæ integritas, sanguinis quies, siue tranquillitas, & aeris pro Corde sufficiens, ac libita quantitas.

Instat itidem, Si sic sanguinis fieret transitus per pulmones, in Emphyseis, quibus pus à cauitate pectoris per pulmones exigitur, & per tussim rejicitur, sanguinem quoque simul expendum fore (quibus nos addimus sufficulosos omnes, & aliquid è pulmonibus reiectantes) quod tamen non fit; Et respondet, id non fieri, quia puri, & alijs oleaginosi humoribus sanguis non potest tenaciter adherere: At non effugiet, hoc responso, vim argumenti: quia, etsi sanguis fortiter non adhereret, non tamen sic facile pus euaderet, quin ab eo aliquid rubedine tingeretur, prout videmus fieri, vbi cum recenti pulmonis vlcere sanguini non raro iungitur puris excretio. Adde in pleuritidis principio, sicui, & peripneumonix, vbi ab inflammata parte aliquid tenuioris sanguinis in pulmones imbibitur sanguinea quoque, & rubicunda spuma conspici; cur ergo non idem, si per pulmonis poros sanguinis transitus adeo celesberis fieret? Si autem purulentis spuris non adhæret sanguis, quid de alijs

Non valet.
ostenditur.

Ad Contrin-
giam expe-
rientem re-
spondetur.

Eiusdem in-
stantia quin-
ta, & resp-
sio.

Confirmat
tur instantia

alijs sputaminibus viscidis, tenuibus, crassis, aquosis? num hæc oleaginosa sunt? num sanguinis abhæsum fugient?

Tertia elusio obiectio, & solutio.

Obiectio in sua vi reponitur.

Obiectio tertia talis est! Plures sunt venæ, quæ destituuntur arteria coniuge, quid ergo poterunt illæ ad Cor reuhere? Respondet autem, per arterias posse sanguinem calidiorem, ac spirituosum longius eiaculari, vel ab ipsis partibus allici, venæ autem non possunt sic à longe sanguinem fugere. Sed responsio hæc obiectiorem ad vnguem non destruit: quandoquidem si vnum vas deductioni, alterum reductioni dicatum esset, frustra hoc sine illo, & illud sine hoc esset: quid enim vena reducet, nisi ab arteria deferatur? Et, si nil habet reducendum, cur sanguine nihilominus plena conspicitur? Ab arterijs longè sanguinem eiaculari, carnis, & partium soliditas vetat: Si verò partes ipsæ trahunt, non plus, quam illis opus sit, nec vt egerant, vel dimittant, sed vt fruantur: manifestum ergo in similibus sanguinem, qui in venulis ijs continetur, à truncis suis venire.

Instantia sexa, & ad eam responsio.

Expugnatur responsio.

Instat autem ibidem solertissimus Auctor, quod arteriæ deberent esse capaciores, (nos supra dicebamus saltèm æquales) quàm venæ: siquidem in ijs sanguis rarior, ac spiritosior est, qui in venis densior, ac frigidior venit; Et respondet, nihil hoc esse; quia ab arterijs statim ferè extra dimittitur. Verùm responsio imbecilla est: Ex eo enim, quod sanguis arteriarum rarior, spiritosiorque est, & ab arterijs multò angustioribus dimittitur, rationabiliter deduci potest, circulationem totius sanguinis minimè fieri: quia alioqui deberet deductioni reductio, reductioque deductio respondere: non potest autem celeritas extramissionis, ex arteriarum parte excessui copiarum respectu venarum decuplæ sic satisfacere, quin interim recens à iecore genitus superueniat sanguis, loco transmissi succedens, itaut venosus minimum circuletur.

Alia eiusdè instantia.

Responsio eiusdè.

Refellitur.

Instat insuper, Aneurismati illi, quod prouenit ex dilatatione arteriæ iuxta Pernelium, sic non fore locum, dum arteriæ indefinenter sanguinem extra se fundunt. Respondet, hanc dilatationem potius oriri ex resolutione fibrarum arteriæ illius, & ex laxitate in illa parte: Sed sic non cessat instantia: quia quantuncunque resoluantur illæ fibræ, si verum est, vt Harueius, Conringius, & sequaces opinantur, sanguinem vi Cordis eiaculantis per arterias excurrere, illiusque virtute arterias dilatari, nulli debet sanguis firmari, sed ultra ad finem arteriæ peruenire; cum sic nil fibræ pro dilatatione operentur: à Corde autem illa distincta portio tantum transmittitur, quæ non magis in vna, quam in alia dilatabit parte. Dicatur verò melius, Aneurisma, vt plurimum oriri ex vulnerata arteria, cui supererescat consolidata cutis, quæ a pulso sanguine in tumorem eleuatur, quò citra lacerationem dilatari potest, quod non accideret, si venæ excursum sanguinem à partibus allicerent, ad Cor reuherendum.

Quarta obiectio.

Obiectio quarta est: In tumoribus, echymosis, varicibus, cæterisque id genus alijs sanguinis in parte aliqua collectionibus, non videtur,

CAPVT VIGESIMVMSECVDVM. 215

hoc dari posse, cum venæ reuere illum sanguinem deberent. Similiter, & hæmorrhoidum defluxio huic circulationi obstat. Vno verbo se ab hac eximit, dicens, cum de circulatione agitur, intelligi de ijs, quæ accidunt secundum naturam se habenti; ea verò omnia præter naturam esse, ac fieri, sicuti, & pleuritis ex defluxu per venam azygos ad pleuram. Et hoc modo se se expedit ab omnibus ijs obiectionibus, quæ de similibus alijs fieri possent. Veruntamen non sic facilis ipsi cadet exbrigatio. Dato enim, quicquid vult, in ijs, quæ præter naturæ intentionem, & vi morbi sunt tum in partibus collectiones, tum extra corpus effusiones, quid dicet ad ea, quæ natura duce, ex ipsius vera intentione, nec à quoquam irritata, sed præuijs coctionibus in morbi pulsione, suiq; subuentionem fiunt? Sic sunt crebri de cubitus, sanguinis defluxus per narres, os, anum, vterum. Sic phlegmones, erysipelata, variolæ, aliaq; exanthemata non raro per crism foras pelluntur, inibiq; dissoluntur, vel maturescunt, à venis non retrotracta, quæ non solum finire, sed potius iuuare quoque tenemur. Ecquid ergo in his venæ non reuehant ad Cor? nùm contra naturam agunt? imò naturalissimè, & eæ, vt plurimum sunt, quæ deferunt ad extima, non arteriæ, in quibus optimus plerunque sanguis, & spiritosissimus hospitatur, etiam in cacochimis. In eo enim potissimum vires corporis consistunt, conseruantur, & per eum contra morbum pugnatur, ac vincitur. Sic de hæmorrhoidibus dicendum, si cuiquam naturaliter, & cum iuuamine fluant, opus est illud naturæ proprium est, bene operantis, & noxia pellentis, vt sanum hominem seruet; nec solum fæcem, sed aliquando solam sanguinis copiam per dictas partes Natura, venis mediantibus, exonerat, vt corpus leuet, & in mediocritate seruet. Vbi verò quid præter naturalis, vel respectu Naturæ agentis, vel respectu materiæ excretæ in dictis omnibus vigere, contendat, quid ad menstrua respondebit, quæ naturalissima esse mulieribus, omnes admittunt, & fatentur vtrò? In quibus, etiam si euincerent, excretionem per arterias fieri, vel deferri saltem (vt de omnibus, etiam fæculentissimis, nescio quo verissimè iure, contendunt Harueiani) id verò non effugient ad minus, tunc Venas illis coniuges non reducere ad Cor, sed sanguinem in ijs morari naturaliter; imò, si tunc partes illæ nutriti opus habent, etiam ad ipsas, vel ab alijs venis, vel ab earum truncis maioribus deuehi. Sed & quid de suis rationibus, experimentis, Autopsijsq; dicent Aduersantes? nonne omnia violenta, terrificæ plura contra naturæ electionem, præterquæ illius libertatem fiunt? Qui legem ponit, tenetur illi stare, vel si eam pro se abijcit, pro alijs etiam abijcere tenetur. De his autem in superioribus capitulis abundè dictum.

Obiectionis quintæ pars illa seriosior est, quod, data circulatione, sequeretur sâkêm, frustra in morbis, exempli gratia, capitis tundi cephalicam venam, vel saphenam &c.; quia, quauis alia vena scissa, nihilominus minueretur sanguinis copia, & sic arteriæ minus mitterent ad partem

Solutio.

Religatur.

Quintæ obiectionis pars ponitur.

soli ordo.

I. Vnde rei-
gi-
cia.

partem affectam. Et respondet, mitti sanguinem à pede, vt fluxus ille sursum siens deorsum trahatur, vel inhibeatur saltèm : à cephalica autem, quia per eum creditur, ad illam plus trahi sanguinis illius arteriæ, quæ ad caput fertur. Sed malè, mea sententia, soluit obicem : nam siuè à pede, siuè à manu, siuè aliunde sanguis mittatur, nec mutatur, nec desinit, nec intercipitur pulsus ; Et sic, cum per Harueij dogmata sanguis à Corde per pulsum in arterias pellatur quaquaversum, nec sanguis idèò ab illis retrorahetur, nec feretur minus per eas. Similiter nec ad venam cephalicam, per talia dogmata, sanguis arteriæ capitalis trahitur ; cum aliud sit iter arteriæ ad caput tendentis, & aliud arteriæ ad brachia cum cephalica currentis : venæ, autem, vt supponit ipse, nunquam à centro, sed semper ab extremis trahunt. Et sic patet, in suo vigore obicem persistere, & consequenter Circulationis inuentum è Medicinæ Sacratio eliminandum esse ; Vt iam congruum sit, libello huic, & Disputationi finem imponere, ac ad alia non minus scitu digna properanter transire.





LIBER TERTIVS.
IN QVO
DE SANGVINIS VSV
QVOAD LACTIS, SEMINIS,
FOETVSQVE GENERATIONEM,
ET
HVIUS ALITIONEM DISCEPTATVR:
PRÆMISSIO.

EXpedit ab ijs, quæ quoad circularem sanguinis motum aliquid dubij apud præsentis Scriptores afferre possunt, reliquum nunc est, vt ad ea, quæ circa eiusdem vsus apud Iuniorum animos dubia contingunt, dilucidanda, & annu- cleanda accedamus. Ea verò multiplicia, sicuti, & mul- tiplex cruoris vsque adhuc vsus Medicorum cetui innotuit, sese offerunt disceptanda. Etenim, cum, repertis Lacteis ductibus, via quædam, seu potius semita, deducendo ad superiora chylo, citra ieco- ris, & venarum rubearum incessum, idonea vel visa, vel imaginatione concepta fuerit; mirum dictu, quot hinc scrupuli circa sanguinis tam diù existimatam vniuersalem non vitæ solùm, sed & nutritioni, gene- rationiq; conferentiam, aptitudinem, & necessitatem iasurrexere: Re- misso siquidem vix ei, præter purpuram viuificantem, alitionis limita- to ministerio, à reliquis paulatim ablegatus est; ita ut ei vix alia utilitas, vsusue iam iam penes eleuatoria ingenia superfit. Hic illum à lacte constituendo, Hic à factu alendo, Hic à generationis munere obeundo, Hic à semine gignendo, Hic à corpore alendo mordicus amouit; nec aliud

aliud illi opus, præter spirituum, & caloris innati instaurationem (nonnullis ei carnis, & parenchymatum alitionem adhuc permittentibus) Juniores reliquere intactum: Cum imò nec defuerit, qui ipsum dicat partes solidas atterere, innati calidi substantiam consumere, & quendam veluti corporis helluonem esse. In eius solium chylus ascendit. Eius publicam sedem hic occupavit; & qui antea minister solum, nunc sodalis; qui coquilius, nunc Atrarius est effectus.

Sedeat nunc Sanguis infelix, & suam depleat infæcunditatem. Sed quid dixi? imò cursitet, circuatq; (juniorum voto) corporis oras omnes, & quiete vacans, alenti benefico, semenq; propaganti chylo robur suppetit, suppetias ferat, ferdoem porrigat, palliumq; ministret. Circumferat se, si placet, in cunctas Microcolmi plagas, & vigiles ubiq; excubias nutritio nouo succo pertendat, ut eius solo spiritu volatili factus hic partes alat, & cætera ad corporis, & sobolis tum alitionem, tum productionem necessaria prosequatur. Atuerò quid miramur? qui Regem, vel Patrem odit, illius vexilla cuncta, totam huius sobolem persequitur. Ergo si lecori infesti omnes, iure, & illius purpureum germen, genuinumq; odere succum.

Hæ tamen Scenæ breues. In suam quisque redibit ædem. Nimis violenta metamorphosis, ideoq; non durabit tempore longo: Suus cuique locus, suus vsus, suus honor. Sanguis commune est omnium corporis partium alimentum; Ex eo lac in mammis gignitur; eo alitur fœtus in utero; ex eo semen, & genitura cuncta procedit. Hic illius germanus vsus, multiplex quidem specie, genere tamen vnus, nempe vitalis alitio: quicquid enim de semine, lacte, menstruè dicitur, alimenti superfluum est, & primi vsus soboles annexa. Chylus ad hæc si aliquid confert, non immediatè quidem, sed quatenus ex eo fit sanguis. Quicquid contrarium ab alijs dicitur, contra Medicam hucusque creditam veritatem est, & à Medicorum insignium credulitate relegandum.

Progressu Libri huius hæc singula patebunt; monito interim Lectore, ne admiratione capiatur à me dispositi ordinis: Huic enim scopo innixus: ut à facillioribus, notioribusq; ad difficiliora, & incognita magis deueniatur, in primis de lactis materia, inde de alimonia fœtus, postea de ipsius generatione, ac de semine discepto; & tandem quibusdam de solidarum partium enutritione disputatis, ad quædam Naturæ arcana detegenda, ex doctrina Veterum, & sine Lactearum adiumento, pro coronide me confero; Non exterritus, quod alij Authores in ipsam versati sint subiectis: nam forsan in rationibus pro veriori opinione solidandis, & in aduersis argumentis, & obiectionibus eneruandis ea claritas, eaque adinuenietur seriositas, quæ repetitionis tardium, luctæq; reaggessionis molestiam leuet, atque contemperet.

*Inuenta Lactea nec Veterem de Lacte opinionem atterunt, nec nouam
elucidant magis: lac enim in mammis, & ex sanguine,
non è chylo gignitur.*

NON minus ergo imbecilla est Neotericorum quorundam assertio, ex Lactearum inuentione patere viam, qua lac in mammis lactantibus, & ad uterum in grauidis feratur, prout iam antea senserant nonnulli: Nam, vt à mammis incipiam, duæ videbantur, ante inuentionem Pecquetiani ductus, Iuniorum de Lacte opiniones; quarum vna Prosperi Martiani, & Petri Castelli fuit, per quam ex Hippocrate elicere videbantur (sic referente Bartholino *lib. 2. Anatom. reform. cap. 1.*), duplicem esse materiam lactis, sanguinem scilicet, qui à mammarijs veniat venis, & crudiore ventriculi chylum, qui per cæcas vias, à fusta dilatatas, vel à fætu comprimente expressas, ad mammas feratur. Altera Antonij Deusingij ex Georgio Entio &c. fuit, qui conspiciens, Acellianas lacteas à melsaraicis rubris distinctas, colligenq; si non sensu, saltè ratione, aliquam ab ijs, & Pancreate posse dari, licet inconspicuam, viam, quæ lacteum illum succum perduceret ad mammas; sanguini veniam omninò dedit è chyloq; non ex ipso, lac perfici, libera fronte in Opere ad id dicato sustinuit.

*Dux circa
lactis mam-
mis Iuniorū
opiniones.*

Sed verò, & huic, & anteriori multæ ab alijs Authoribus emanatas obiectiones obstitere semper, quarum præcipua illa erat, quod nullam liceret conspicuam chyli inuenire semitam, nec videretur poris, aut cæcis ductibus, pro tanta fabrefacienda lactis mole, acquiescendum; Et inter cæteros Bartholinus ipse loco citato Martiani, & Castelli rationes soluere non destitit: At, inuento paulò post à Ioanne Pecqueto receptaculo suo, cum thoracico lacteo tubo ad subclauias ascendente, disseminataq; ob id inter credulos Iuniores tali chyli semita, mirum quanto cum applausu, & ipsi Pecqueto, & Bartholino, & alijs multis visa fuerit secunda opinio ab euentu, & Autopsia confirmari. Quamuis enim adhuc vsque nemini licuerit continuationem dicti lactei tubi cum mammarum tubulis conspiciere; firmiter tamen varijs de causis, & rationibus, lac è chylo procreari, & lacteos ductulos, etsi inconspicuos ob exiguitatem, ad mammas ferri, determinant. Sicq; nouissimè Paulus Franciscus Pallierius in quodam Genuæ nuper edito libello De vera Lactis genesi, & vsu, hanc, cum alijs apud Neotericos decantatis adinventionibus studuit propagare.

*Iuniorum
pro secunda
opinionem ap-
plausus.*

Falluntur autem hi omnes primò, si putant, lac in mammas ferri ab alijs partibus confectum, itaut illæ solùm sint ipsius receptaculum, vt est vesica feri: Si sic enim esset, frustra tot glandosis, albis, pinguibsq; substantijs, & albicantibus cellulis mammas natura donasset, cum

*Lac in mam-
mas nō fer-
retur ibien-
tum virtute
gigal. ratio
prima.*

suffecisset, eo supposito, duas ibi simplices effinxisse cavitates, ad demandatum liquorem excipiendum idoneas, prout videmus in alijs illam egisse membris, à quibus nil gratiæ contenta receptura erant, veluti sunt utraque vesica, & inferiora intestina: Quod cum Natura non fecerit, rationabilius dicamus, mammas propriè lacti præparando, coquendo, perficiendoq; dicatas esse, prout ipse Bartholinus citato cap. ostenderat, probaueratq; contrarijs rationibus confutatis.

Ratio secunda.

Quemadmodum &, si sic esset, omnibus mulieribus, tum virginibus, tum viduis, tum Nuptis, tum gravidis, tum puerperis, tum sterilibus, & iuuenibus, & vetulis, lac in mammas colligeretur, sufficeretq; ut lac sugeretur, & ad exitum inuitaretur: At conspiciamus, in solis gravidis, puerperis, iuuenibusq; lactis ubertatem dari, rarissime alijs, nisi menstrua defecerint, ut ait Hipp. 5. aphor. 39., vel per longum tempus, & repetitis vicibus, & valde exugantur, prout ex quibusdam historijs apud Auctores non solum de mulieribus, sed & de masculis quandoque visum fuisse, fertur.

Ratio tertia.

Adde etiam, quod, siuè pingues, & glandosæ mammæ essent, siuè non, in omnibus lactis proventus idem daretur. Sed & è contra scimus, ijs solis masculis interdum lac fuisse datum, quibus eleuata vbera, pinguisa, glandosaq; à Natura data fuerant, & ex aduerso ijs mulieribus, quibus vel pinguisitas, vel glandes ipsæ siuè vitæ tabescentiæ morbosæ, siuè ætatis labentis vitio consumptæ fuerant, lac quoque defuisse, quantumvis ritè cibentur. Signum ergo, lac non aliunde ad mammas influere, sed in ijs ex superfluo attracti, vel transmissi alimenti gigni, & adseruari ob multitudinem, & magnitudinem glandularum, quæ sibi similem gignere succum aptæ natæ sunt, ut in alijs quoq; partibus, quibus hæc insunt, fieri videmus, ob sympathiam, & consensum maximum, quem habent cum vtero, ex quo retentus sanguis, & regurgitans, affluenter ad illas confluit; & ob lactentium succum, qui partem exercet, vasa dilatat, & valdè trahit: sic enim & Vir (ait Hipp. lib. de nat. pne. num 12), si multum coeat, venæ ampliores redditæ Venerem magis inducunt.

Conciliatur contra-
vie Hippocratis.

Nec eorum opinioni opitulatur, quæ tradit Hipp. eod. lib. num. 21. de generatione lactis, dum dicit, lac fieri ob compressionem abdominis ab vtero intumescente factam, itaut quodammodo a ventre exprimat-
tur pinguedo alba in venulas vtero, & mammis communes, ipsi dulcedine à calore communicata: quia primò hic ab Hippocrate non memorantur venæ mesenterij, aut eius glandularum, sed omenti, & carnis, ubi lactatæ lacteæ non adsunt. Secundo quia hic de expressione adipis, oleosæq; substantiæ agit, non de chylo. Tertiò quia ibidem non de vero lacte agitur, sed de quodam succo ad lac disposito, & ex sanguine cum illa pinguedine peocreato, non chylo. Quartò quia non inconuenit, in alijs quoque corporis glandulosis partibus, ut pancrea-
te, thymo &c., lacteam gigni substantiam, quæ tamen non in mammas
feratur

feratur, sed ibidem pro earum alimento, & fructione referuetur. Et veram Hippocratis mentem esse iuxta antedicta, ipsemet declarauit *lib. de gland. num. 11.* vbi similia protulit: Quin & glandulæ in pectoribus mammæ appellantur, & attolluntur, ac lac faciunt, aliquibus, verò lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, Viri verò non faciunt: mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum, quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab utero ad mammas accedit, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum facit, ne exprimit, ac sursum mittit omentum ad supernas partes ab ipso factu coarctatum. I soluitur ergo omnis contrarietas, quæ de lacte in Hippocratis dictis appareat, distinguendo lac in perfectum, pueri alimentum dicatum, & imperfectum factui in utero refocillato superfluum. Si itaq; de perfecto loquamur, hoc non nisi à mammis ex attracto, vel transmissio ad eas sanguine gignitur; Et sic videmus, lac à mammis grauidarum, & difficulter extrahi, & vitiosum, meliori scilicet ipsius, & sanguinis parte in factus alitione consumpta. Si de imperfecto, solatio factus superfluo, loquamur, ipsum exprimi ab utero in mammas, non quidem ex seroso mesenterij chylo, sed ex dulciori quoque sanguine, & adiposa omenti refudatione, per ipsummet Hippocratem dicendum.

Secundò nec materia lactis chylus esse potest, vt sentire nisi sunt supradicti, & alij quorum præcipuæ rationes, & argumenta infra ponuntur, ac soluntur; idq; non aspernendis rationibus, quarum prima est, quòd chylus sit quædam substantia, varia in se, & eterognea complexens: in eo enim, & biliosum, & pituitosum, & sæculentum excrementum adhuc indistinctum continetur; quæ nisi per secundam coctionem, ac depurationem seiungantur, sicuti ad cæteras partes, ita & ad mammas alendas, & lac gignendum ineptum reddunt: nullum autem membrum est, quod ab vberibus huiusmodi excrementa repurget: ergo nullo modo supponendum est, chylum ad illa pro alendo, lacteq; gignendo confluere.

Quod si dicas, etiam in sanguine similes reperiri succos, ideoq; & in lacte esse posse, respondetur, aliud esse humorem, aliud excrementum: is enim in sanguine necessarius est, vt quatuor elementis respondeat sanguis, varijsq; & variæ naturæ partibus nutriendis idoneus sublit; hoc autem, vti ad nutriendum ineptum, separari in alia coctione desiderat.

Item sapor chyli vel insipidus, vel acidulus, vel etiam aliquando acer est, vt ab ijs, qui ructus patiuntur, vel à ructibus studiosè à sano eleuatis gustu, & odore sentitur, & vt à natura ventriculi appetentis, chylicantisq; & à chylicandæ cibationis varijs, ac vt plurimum prædictis saporibus conijci potest; substantia autem vel nimis corpulenta, si in ventriculo, & intestinis obseruetur, vel tenuis, & aquosa, si in lacteis. Hæc autem non videntur posse à mammarum glandulosa natu-

Lactis mat-
tiam nō esse
chylum, pri-
ma ratio.

Obiectio;
Responsio;

Secunda ob-
iectio.

ra in saporem, & substantiam lacti consonam immutari: cum similium partium proprium sic potius attenuare, refrigerare, humectare, quàm secus.

Obiectio.
Responsio.

Neque aliquis mihi dicat, huiusmodi mutationes à lacteis, & mesentericis glandulis posse paulatim disponi: nam respondeo, vel eas esse plenas alimenti superfluo, & eadem, seu simili lactea substantia, qualis in mammis colligitur (cum natura similes sint partes), non autem chylum vehere, ut supra lib. 1. satis à nobis probatum est; Vel ubi chylum veherent, partes esse frigidas, remotas à fonte caloris, membraneas, tennes, & in quibus (si pro transmigratione chyli inseruiant) rapidissimè is moueretur. Ideo nullam, vel paucissimam gratiam chylū illinc recepturum.

Tertia ratio. Item quia nulla etiamnū patet via, qua chylus sanguineae alterationis expertus possit ad mammas peruenire: neque enim, ut dictum est, poris, inuisibilibusq; meatibus res concedenda fuit; cum hi ad tantam chyli quantitatem, quantam lactis ex mammis vnaquaque die exire possent, conspiciamus, referendam non sufficientiam; nec quæ ab ijs Auctoribus monstrantur viæ lacteæ, quicquam cum mammis communicant immediate; sed (si eorum dictis standum est) superius in subclauias venas sinistras tenuissimis oculis finiunt, & circulatione media, inde non ad thoracis exteriora, non ad mammas chylus cum sanguine, vel cum chylo sanguis, sed ad Cor vehitur indefinenter: si verò circulatio negetur (ut cuique ingenuè neganda est) non ad mammas solus, acinateratus exinde chylus, sed vnā cum sanguine mixtus, vel verius sanguis effectus, indubiè feretur. Ergo non ex chylo lac.

Nulla lactei
tubi cum
mammis co-
municatio.

Et equidem in presentiarum Excellentissimus Torrinus in sua quadā familiari liberè fatetur, se nullam vsque adhuc lactei tubi propaginem ad mammas tendentem obseruasse, nisi quandoque in thoracicam venam, & aliquando (rarissimè tamen) in coniugem arteriam quosdam illius thoracici tubi furculos inferi: quod tamen pro quadam ludicra Naturæ iocositate habet, cum hæc in perpetuis, & necessarijs non sic euacillat, sed se semper, vel saltem ut plurimū, in huiusmodi præstet eandem. Hoc ergo utcunque esset, non de chylo, sed de sanguine verificatur assumptum: quia, siue vena, siue arteria, vasa sanguinea sunt, & minimum succi a plurimo, etiam in extrinsecis, & inanimatis, multo ergo magis in animatis, per mixtionem euincitur, & immutatur. His additur, quod omnia ferè animalia ouipara mammis carent ex *Arist. 3. de hist. ani. 20.* & tamen ijs etiam lacteas inesse venas, ad subclauias tendentes, Pecquetiani contendunt. item & bruta mammis plurima habent in pectore, quod cum subclauijs, & thoracicis venis nil communicat. Ergo vasa illa non sunt lactei, seu chylo ad mammas deferendo dicata. Quod verò omnem tollit obicem, hæc, ni fallor, sat in primo Libro euicta fuisse, ubi non chylum, sed alimentum superfluum in ijs lacteis reperiri ductibus, comprobatum est.

Quod

Quod si nuncquis Bilſij imitans vota, venas lacteas à lymphaticis non ſeungat, contendatq; eas non ſolum ad ſubclauias venas, ſed & ad pericardium, ad mammas, collum, & caput ramulos tranſmittere, per quos poſſit chyli pars aliqua permeare, quamuis mihi adhuc de illius celebratiſſimi Viri ſcriptis nil aliud videre contigerit, quàm quæ retulis Deuſingius, in primo noſtro Libro memorata, nec ſciam, eius opinio- nem alijs vſq; modo probatam fuiſſe; Ea etiam data, in primis conſtat, ex euſdem Viri mente, tenuiſſimum ſolum per eas ferri ſuccum roris inſtar, & ſic nec ſanguinis, nec lactis proportionatam materiam; item vniuerſalioſe illarum venarum officium, cum plures ad alias partes tam ſuperiores, quàm inferiores ex Auctore ipſo procedant; & tertio nec ad hoc lactis exquiſitum miniſterium ſufficere, ſtante paucitate materię in illas (iuxta euſdem mentem) vaporis ritu ab inteſtinis reſu- dantis (! plurimam enim chyli partem, & optimam, in meſaraicas inſu- mi venas, & illius, quæ in lacteas abit, partem quoque conſiderabilem in lecur progrediſſe arbitratur), & in plurimas propagines, eaſq; te- nuiffimas abeuntis.

Quarta ratio eſt, quod, ſi ex chylo lac fieret, nihil vetaret, quin mulie- ribus quoque in viridi ſenecta conſtitutis (præcipuè ſi antea ſæcunda) lac in mammis copioſum colligeretur dummodò opportunè alerentur; & tamen quibus ob ætatem ceſſant menſtrua, lac quoque ceſſare, vel ſaltè maxime immiui, & ſeroſius fieri cernitur, etiamſi non minus edant, potent, epulentur; & valeant: Ergo non ex chylo lac immediatè produci- tur, ſed ſanguificationi ſuccedit.

Et quamuis hic mihi obijcerent, hanc nos æque ferire rationem, qui in ſanguine lactis materiam conſtituimus, vtpotè cum, & ſic neceſſe eſſet omnibus, dum ſanguis in venis ſuppetit, lac gigni; Dicimus, longè di- uerſam de chylo, ac de ſanguine rationem eſſe: quia cum chylus ex in- geſtis cibarijs in ventriculo perficiatur, nec eius vlla detur naturalis eua- cuatio, vel deſectus, (ſed aſſumptorum quantitati reſpondeat naturalis chyliſicatio), patet, ſi ex chylo immediatè lac fieret, quibuſcunque be- nè cibatis, etiam lac eſſe futurum. Intellige autem de mulieribus, qui- bus vbera perfecta ſunt, & ſuis ſinuofitatibus, glanduliſq; donatæ: At de ſanguine conſtat, quamuis naturaliter in mulieribus copioſus gigna- tur, ſuas etiam ineſſe periodicas excretiones per vterum, quemadmodum, & procedente ætate, licet poſſit mulier ex cibatione lauta copioſam in ventriculo chyloſim facere, non tamen in ſanguinem ob caloris maiore hebetudinem, & imminutionem ſic facile tranſire, quin potiùs præcipua portio in mucoſitates, & ſeroſitates diſſuat: Hinc ergo euenit, vt ex ma- terię deſectu lac quoque deſiciat in menſtruantibus, imbecillis, ætate proueſtis &c., quod non eſſet de chylo, vbi immediatè ad vbera ferre- tur, in lac commutandus, & multò minus, ſi nulla ab ijs requireretur coo- peratio, & alteratio.

Tertiò: Plura argumenta docent, lac è ſanguine generari; quorum

*Lac è sangui-
ne fieri, pri-
mum argu-
mentum.*

vnum est ipsius lactis dulcedo, & crassiuscula, seu moderata substantia, vniiformisq; ac laevis; quæ omnia cum sanguine coincidunt (solo dissentiens colore). Nec ab vberibus dulcedo, & mediocritas substantiæ valde mutuari possunt, cum glandularum proprium non sit tales succo qualitates impartiri; nihil enim dat, quod non habet. Nec a simili ciborum, aut potuum, nec per consequens chyli qualitate: quia tùm non semper talis dulcedo ex cibis provenit, qui non raro, maxime à mulieribus, acidi, acetosi, acres, insipidi &c. capiuntur; tùm non vana illorum opinio est, qui acidulum fermentum à liene in ventriculum instillari, vel saltem pro appetitu conciliando, opinantur; ex quibus ritè inferatur chylum acidæ, vel saltèm insipidæ qualitatæ generari. Adde, & talem per ructus sentiri in ijs, qui faciliè eructant, vel etiam studiose flatu eleuant, vt dictum est: Ergo ex proxima eius materia, nempe ex sanguine, hæc lacti obveniunt.

*Secundum
argumentum.*

Alterum argumentum est, quod lactis proventus, vt plurimum supponit menstruum retentionem, vel saltem (vidi siquidem sæcundam mulierem, quæ sine menstruis vitam continuè degere mihi asserbat, concepisse, peperisseq; pluries, & lactasse), ætatem menstruis competentem. Menstrua autem sanguis sunt, non alius humor, aut chylus in sana muliere: Ergo ex ipso sanguine lac gigni, arbitrandum: quo enim presente, aliquid gignitur, & absente cessat, magnum de sui concursu ad rei generationem præbet argumentum.

*Tertium ar-
gumentum.*

Uterius: cum lac nimium fugitur, sanguis ad lac consequitur: ergo ex eodem sanguine lac gigni, dicendum. Et hoc Hipp. argumentum est lib. de hom. struct. 6. Dicent, ex nimio sucto aperiri ora venarum, quæ alioqui oclusa erant. Respondetur, ex iisdem tunc papillæ oscillis sanguinem exire, è quibus antea lac exierat: quare non est, vt quæ oculis patent, occultioribus obscurantur: vnum enim ex his necessarium est, vel scilicet lacteos tubulos cum venis ipsis continuari, vel harum ora in eos coniuere semper, ex quo lacti excreto succedat sanguis.

*Quartum ar-
gumentum.*

Præterea: Lac in internis mammarum tubulis continetur, & ab iisdem exit: illi autem cum venis, quæ sanguinem continent, continuantur intimius, & cum exterioribus quoque sanguineis per plures anastomoses communicant: ergo communis quoque earum est succus, solaq; partis propria actione euariatus. Deusingij enim opinio, asserentis, eosdem tubulos esse vasa alterius generis, inuicem similis est; tùm quia fines omnium vasorum exiliores cum sint suis truncis, non deberent hi anatomicos oculos latere, sed imò, sicuti illi ab omnibus conspiciuntur, ita & hi clariùs cunctis apparerent; quod tamen adhuc nemini datum legitur: tùm quia à tot alijs Anatomicis pro constanti affirmatur, eos venis thoracicis continuari, sicuti, & ijs alias obuiam venire venas, ab utero per rectos musculos ascendentes, & in easdem inferi, vt & à Bartholino ipso loco nuper citato admittitur. Spes autem, quod veniant anni, quibus Oceanus vincula rerum laxet, nimis hucusque nobis adu-

lata

Iata est, itaut iam tempus sit ab ea nos abscedere, & cum nostris Parentibus idem sentire.

Amplius: Lac probum, & copiosum supponit mulierem optimi succi, Quintum argumentum. ac sanguinei habitus, non copiosam chylicationem: videmus enim aliquando mulieres sese copiose alentes pauciferum, & miserum lac procreare, si malè temperatæ sint, aut crebris menstruationibus assuetæ; & è contra alias sese frugaliter cibantes, eo quia sanguinei habitus sint, & menstrua desulant, multum lactis procreare.

Item: Si mittatur sanguis ex basilicis, alijsuè brachiorum venis, Sextum argumentum. etiam si mulier consuetè alatur, lac manifestè imminuitur, ac ad superiora retrahitur; & è contra mulieri sanguine plenæ, etsi ieiunium moderatum seruet, lac nec sic citò deficit, nec imminuitur quicquam: Ergo sanguis ipse, non chylus, est materia lactis.

Adhuc: Si lac retineatur, mammæ inflammantur, & in pus phlegmone vertitur, ac si sanguis retineretur; & impedimentum lactantes manifestè sentiunt in venis versus axillas commeantibus: Ergo parùm à sanguine lac differt, vel potius sanguis albus est: Alioqui chylus, cum subfrigidus sit, non videtur posse inflammari. Nec dicant, id ex sanguinis miscella euenire: quia sic etiam suos vastabunt de lacteis venulis conceptus, & fateri cogentur, sanguiferas venas lacteis, & lacti materiam suppeditare.

Quinimò Mulieribus, si ob lactationis cessationem, vel cum hac, Septimum argumentum. mammarum turgor, vel spatularum, dorfiq; grauitas, vel ex his febris superueniat, phlebotomia à brachijs celebrata mirificè confert, vt mihi proximè factitanti non semel videre obtigit: Ergo non chyli, sed sanguinis vbertas ex ea lactis intermissione concepta erat: Hoc enim ostendit magnum illud Hippocratis argumentum, sanatio: Ergo eorum alterutrum ex altero.

Iusuper: Lactatos pueros non parùm in animi moribus, & sensuum concupiscentijs lactanti mulieri, quamuis non matri, assimilari videmus: ideoq; apud laudatissimos Authores summè probatur, vt pueri, lac sumpturi, tradantur mulieribus bonæ indolis, & famæ. Huius exitus nulla alià causa reddi potest, quàm à nutriente lacte hoc prouenire, quod cum Corde, & lecore, in quibus animi, & concupiscentiæ fons ex Platone, & Galeno residet, sympathicam naturam obtineat, vel ab ijs quoquomodo progerminet. Huiusmodi autem conditionem non aliunde melius lac venabitur, quàm a proxima sua materia, nempe sanguine utroque venali, & arteriali, qui similium fontium virtutem latè consequitur. Quomodo autem à chylo id obtinebitur, qui solius ventriculi soboles, intestinorum postmodum, & exanguium ductuum solam actionem, vel contactum experiretur?

Posset hic aliquis dicere, etiam chylo, & lacti ipsi sympathicam Quoddam soluiur obiectum. aliquam qualitatem à Corde per impartitos spiritus posse communicari, vel in ventriculo, & deferentibus vasculis lacteis, vel in vberibus ipsis, Alio.

quæ illi adeo vicina sunt. Respondetur, solos spiritus esse substantiam fugacissimam, summèq; dissolubilem, ut ideo in auras abeant facillimè, non ideo illis referendam esse illam morum assimilationem, quæ adeo fixa est, ut multoties toto vitæ curriculo perseveret.

**Decimum argu-
mentum.**

Præter hæc: Si mulier lactans cacochima sit, etiamsi benè coquat ventriculus, beneq; alatur, lac tamen in ea prauum erit, & eo colore, & sapore infectum, quo humor in venis euincens. Sic si mulier biliosa fuerit, lac subflauum; si pituitosa, candidum, & aquosum; si melancholica, atrum; si cachectica, serosum conspicitur; Et sic Nutrices tunc ritè, & phlebotomia, si opus sit, & purgatione curantur: Signum ergo, lac ex illo venali succo, seu sanguine procreari, non autem ex chylo, immediatè ad vbera lato. Nec dicant, ex chylo huiusmodi posse inquinamenta lacti parari in corpore prædicto ob qualitatem illi in

**Obiectio pri-
ma.**

Soluitur.

ventriculo aduentam exuperanti humori analogam: Aduertant enim, argumenti vim in similitudine lactis cum redundante sanguine, data opportuna cibatione, consistere. Dicimus ergo, hoc præmissis, inueniri similiter illud obijci: quia primò non repugnat, posse cum sanguinis prauitate ventriculum sanum dari, à quo, si additur cibationis probitas, non potest chylo talis praua qualitas obuenire. Secundò constans est omnium ferè opinio, excrementa biliosa, & melancholica ex secunda coctione generari in iecore: ergo non in chylo: Tertiò quia etiamsi cibi assumantur contrariæ qualitatis, non nisi post aliquot dierum continuat onem, aut corpore expurgato, lac desinet esse illa labe

**Obiectio se-
cunda.**

Soluitur.

infectum. Si verò dicant, è chylo e contra eadem posse vitia lacti attribui ob ciborum prauitatem, vel ventriculi affectionem etiamsi sanguis in venis probus adsit; Respondeo, argumentum hoc pro chylo non æquivalere ei, quod pro sanguine iaciebatur: nam in hoc, quamuis detur praua chylicatio, non inde sequitur, si prauum lac in puro corpore fiat, è chylo immediatè hoc prouenire: quia idem potest mediatè accidere, scilicet per illam sanguinis portionem eo ex chylo genitam, & ad vbera lapsam, ex eo quod errores primæ coctionis ægrè ab altera corrigantur; Et hoc si semel, vel rarò fiat; cum aliqui non posset diuturnum ventriculi, eiusuè actionis vitium non toti corpori, ac sanguini toti citissimè communicari: At in nostro pro sanguine argumento necessaria currit cōsequentiā, quod, si sanguini prauo lac assimiletur, dum chylus probus supponitur, non potest non ex sanguine vitiatō lac fieri.

**Undecimum
argumentum
ab auctorita-
te.**

Tandem ex sanguine lac esse, habetur ex Hipp. lib. cit. de hom. struct. 6., ex Arist. 4. de generat. ani. 8., ex Gal. 5. de simpl. med. facul. 22. ex Alexandro 2. probl. 80., ex Auerroe in commen. Aristot. Inter Recentiores doctissimè hoc differunt Mercat. lib. 4. de morb. mil. cap. 16., & Zacut. Lusit. lib. 6. de Med. Pr. hist. 6. Idem plurimis alijs eorum Antecessoribus, & Coætaneis tum Latinis, tum Græcis, tum Arabibus Medicinæ Scriptoribus placuisse, nulli non notum, itaut superfluum sit alios hic congerere, citareq; nominatim Auctores.

CAPVT SECVNDVM.

Multa contra afferuntur Neotericorum, pro chylo pugnantium, rationes, obiectionesque, & solvuntur singulae.

Contra hæc autem insurgentes, ac pro chylo pugnantes superius nominati Auctores, afferunt in primis exemplum mulieris lactantis, ob diuturnum ieiunium mammas vacuas habentis, quæ mox ingestio cibo, potuque, sensit, sibi vbera lacte repleri, antequam potuerit cibum ille vix digeri, nedum in sanguinem conuerti; Ex quo putant, clarescere, à chylo lac fieri, non à sanguine.

Prima ratio, quod ex chylo non ex sanguine lac fiat ab euentu sumpta.

Facile erat autem iustam euentus causam reddere, absque quod ad repentinam, immediatamque chyli traiectionem recurrerent: nam cum glandulæ omnes partes sint omnium nostri corporis partium imbecillimæ, non quidem à corpore indigeno, ac famelcente succum pro suo alimento, & lacte; sed imò aliæ validiores partes simili in casu trahent ab ipsis glandulis, & sanguinem, & multò magis superfluum illis lacteum succum: non enim tunc possunt à iecore, liene, corde, cæterisque visceribus, nec à maioribus vasis concupitum alimentum suscipere: quia viscerum vnumquodque in indigentis pro se ipso retinet, & potius aliunde, nempe à propinquis vasis maioribus, trahit, & hæc à minoribus, vt in sua moderata plenitudine naturali seruentur. Vnde accidit, vt à parte post partem imbecillioribus contingat inanitio. Peractum ideo lac è mammis ipsis in vicinas venas retrahitur, & quasi suspenditur; quod inde, cibo exhibito, cum membra, venæque; aliunde, & à suis principiis, ac radicationibus naturalibus, quæ statim à pleno ventriculo aliquid tenuioris alliciunt, sanguinem pro alimento habeant, ad mammas quoque statim, quod suspendebatur, recurrere sinitur, imò reponitur. Et hoc verisimilius multò est, quàm putare, cibum ingestum subito in mammas currere, & lac euadere. Videmus siquidem, etiam post duas, vel tres horas cibum in ventriculo in coctum, & dissimilem adhuc esse plurius, nedum lac factum. Et quæ coctio dabitur subitanea? unde similis assumptorum in lac mutatio, vt vinum rubrum, viride edulium, flauum pulmentum, subito fiant alba, & lactis consistentiam crassa alimenta acquirant?

Cur vacuis ob famem mammis, cibo sumpto, lac statim suppedietur.

Dicunt etiam, impossibile esse, si lac ex sanguine fieret, tantam à muliere expectari posse lactis quotidianam excretionem, quanta sit ad libram, & amplius, cum videamus, à venæ sectione facillimè eam imbecillitari. Respondetur, non esse rationem vniformem: quia in phlebotomia emititur sanguis à maioribus venis, quæ vniuerso corpori, & principibus partibus præsertim pro promptuario deseruiunt, isque cum multis spiritibus, & ea cum violentia, qua totum venosum genus ad vacuam consecutionem exagitur: At in suctione lactis soli mammarum

Secunda ratio, à lactis quantitate desumpta.

Solvitur.

Carin lacta-
tione non
adeo patia-
tur mulier,
vt à phlebo-
som ia.

tubuli peculiares sine ipsarum vi, imò cum iucunditate, inaniuntur, sine spirituum iactura, qui in lacte paucissimi sunt; nec solo sanguine, sed quocunque alio superfluo illarum succo, qui non modicus est, sicuti dicitur inferius: vt propterea, si modus adsit, potius leuetur mülcta mulier, quàm patiatur. Alioqui, si excessus adsit, mulieres extremè pati in totius habitu corporis nutriendo, & febribus corripi, capitis doloribus, oculorumq; inflammationibus, & imbecillitatibus vexari, consuetissimum est; quæ non fierent, si suctio illa venas sanguifluas minimè tangeret, sanguinisq; ac spirituum motus non fieret, ac deperditio. Neque omnes ea lactis vbertate gaudent, vt puerum sine virium iactura lactare diù valeant: Sed eæ solæ, quibus, cum edaces sint, & sedentariè vivant, validus ventriculus, optimum à Natura lecur donatum est.

Denudò quan-
titas lactis
incaleatur,
& deteritur.

Sed repetunt, tantam aliquando lactis copiam in dies excerni, quantâ vix sanguinis venæ incladunt. Ad quod valet, nonnullas mulieres binos lactare pueros; Item ex *Aristotele 3. de hist. ani. 21.* in Epiro boues aliquando amphoram lactis singulo die reddere, quæ ad nonnullorum computum libras pendet octuaginta: At verò dicitur, positum casum siuè in muliere, siuè in boue nimis hyperbolicum esse, dum illa, libris viginti quinque plus minusuè sanguinis gaudens, sola vna lactis libra, vel paulò pluri priuatur, quod eodem die ab edace ventriculo, euchyma cibratione, & valido iecore per aliquod tempus commodè reponi potest.

Circa eandem
quantitatem
aduercentia
prima.

Interpreta-
tio Arist., cir-
ca lactis vac-
eini quanti-
tatem.

Vt autem meliùs intelligatur res, aduertatur primò, rarò fæminam duobus infantibus lactandis sufficere posse, nec nisi per paucos menses priores, in quibus partum lactis sugunt, vel cum aliquo alterius mulieris, aut alicuius delicatuli cibi adiutorio; quæ imò sic etiam valde patitur, itaut vel citò desistere cogatur, vel infirmetur. Quod verò de bouibus ex Arist. afferunt, sciri debet in primis, in Epiro ob pascuorum pinguedinem, & vbertatem Vaccas maximas euadere, vt propterea, (sic ipso referente Auctore) mulgentes erecti stare debeant; deinde amphoræ nomen vt plurimum genericè assumi pro vase quolibet, quo aqua manibus adfertur, incerti quidem, sed longissimè minoris ponderis capace; & ita ab Arist., qui Medicis mensuris non erat adstrictus, sumptum esse, necesse est; sicuti videmus, & in Euangelio Luca: cap. 22. hoc modo amphoræ sumi nomen. Aliter pro fabula haberi deberet, Vaccam, quamvis grandiore, octuaginta libras lactis singula die producere, si nostras consideremus, quæ pauculas libras deprecant; Aristotelemq; potius ab aliqua hyperbolici Ruralis relatione deceptum, quam suamet obseruatione nitentem, talia protulisse, dicendum esset.

Aduercentia
secunda.

Aduertendum præterea, duplex lac esse; probum scilicet, & laudabile, sanguinis consistentiam æmulans; & crudum, serosum. Si de primo loquamur, pauciferum à muliere gigni, & vix ad infantis nutritionem sufficere, videmus; adeo ut qui delicatius infantem educant,

non

CAPVT SECVNDVM.

non vnicam, sed duas eligant Nutrices. Si de secundo, copiosum lac exire, ac gigni posse, suetus frequentia, ac vi, ex sanguinis crudiori, ac serosiori parte, non est dubium: eo enim tempore à iecore per ramulos suos mammarum sugunt, hoc verò à ventriculo, & intestinis cibum, & potum semicocta rapit, ut possit suctioni reddere. Quare in simili casu sæpè, & abundanter cibari, bibereque cogitur mulier, & vitam sedentariam ducere, ad hoc, ut paucissima fiat in corporis reliquo dissolutio: aliter si vellat laborare, vel moderatè, parcèq; cibetur, & lac deficiet, & lactans extenuabitur nimis. Neque tamen serosum hoc lac (ni nimium) pro nutriendo partu omnino absonum est, si & pro cibo, & pro potu inferuire debet, & ventriculi, iecorisq; coctionem experitur, à quibus postmodum per intestina, fel, lienem, ac renes omnigena recrementa, sejunguntur.

Hic obijcit Deusingius, quærens, quomodo ab illo suctu crudior, & serosior tunc tantum sanguis è venis allicitur, & non reliqua massa sanguinea, vel ipsius imò pars spirituosior? Huic responsum velim, dicendo, tum à venis ipsis, tum à cæteris alendis partibus validioribus probum, purioremque trahi, & retineri sanguinem; reliquum verò crudior, ac serosior, ut minus familiarem, non solum sugi permitti, sed imò, si liceat, ad imbecilliora vbera pelli. Et hinc patet nunc, cur singula die persentitur vel bonitas, vel prauitas lactis, prout vel probis, vel prauis utitur alimentis. sœmina lactans.

Si verò instet, quomodo deceat, lac ex serosiori illa sanguinis portione gigni, & non ex tota sanguinea massa, ut in venis iacet, & ut pro reliquo alendo corpore exquiratur; dicimus, quod, si modicè vbera inaniantur, lac ex sanguine concoctiori fiet, & ipsum magis perfectum, & alimentosum erit: at si nimis exugantur, vel mulgeantur, mulier exsiccat magis, & ideo frequentius cibari, potareq; semicocta à iecore rapit, & sic à venis in vbera exportari, ut diximus, est necesse: quæ tamen (si paruus sit tenuitatis excessus) non inconueniunt in infante, cui duæ illæ ventriculi, & iecoris coctiones lac purificant, ab excrementis expiant, & in sanguinem alendo commodum conuertunt. Et hæc est differentia, quæ inter lac à puero deglutitum, & sanguinem in venis Nutricis contentum reperitur, superius in responsione ad rationem hanc secundam contra nos allatam deducta, ad indicandum, cur non adeo, ut à phlebotomia, à lactatione mulier imbecilletur.

Addunt, medicamentum epotum, vel cum cibo à Nutrice sumptum puerum citissime expurgare, quod & Hippocrati placet, dum dixit Mulier, & capra elaterium comedentes pueris purgatio; quod non esset, nisi chylus ad mammas breui via irrueret. Respondetur, medicamentis, si valida, etiam si in ventriculo morentur, (nec enim, ut cibi, coquantur, vel ut alimenta, trahuntur ad membra) à distantissimis attrahere paribus ea, quæ secum inde per latam intestinorum viam deducit; idq; ob purgantes halitus in vniuersas regiones transmissos: non

Ad sanguinem serosior, obiectio Deusingij tollitur.

Cur lac ex serosiori sanguine gignatur.

Tertia ratio à medicamentis efficacia lactis comunicata.

Cur lactanti exhibitum medicamentum puerum purget.

mirum igitur, si hi quoque, per poros in mammas peruenti illa qualitate lac inficiunt, quæ et si debilis, faciliè puerulum adigit.

Quarta ratio à lacti impressio como-
horum odo-
re deducta.

Solutio.

Cum lac, non
sanguis, cibi
odore imbui-
tur.

Adiungunt, aliquando lac eo odore imbui, quò cibis assumptus præditus est, prout, semet expertum esse, testatur Pallierius in muliere rurali, quæ alium largius comederat: lac enim forte degustans graui illud odore imbutum, & aere persensit, ut *cit. lib. cap. 5.* legitur; cum tamen sanguis in venis nunquam solet cum odore aliquo persentiri. Dicitur, hoc experimentum fallacissimum quoad sanguinem esse; cum possit quidem in lacte, quod ore fugitur, & degustatur pro libito, hoc faciliè percipi: at non in sanguine, qui non sic iocosè extrahitur, nec sic inhorridè degustatur. Sed dato, illud esse posse, dico, quod solum tunc in lacte remanebit odor, quando cibis ob suam virulentiam, aut extraneam, vel excedentem qualitatem non benè fuerit a ventriculo, iecoreque euictus: tunc ergo, cum proprium sit corporis benè valentis cruda omnia, vel extera in debiliores propellere partes, inter quas præcipuè vbera repouenda esse, ex Hipp. scitur, non mirum, si sanguis inodorus, lac autem odoratum sit.

Quinta ratio à cruditate
festinata in
lac impressio
ne desumpta.

Solutio.

Cum ventri-
culi cruditas
eodem die
lac inficiat.

Item obijciunt, si cibos prauos, vel crudos lactans assumat, ita ut in ventriculo coctio imperfecta, vel cruditas suboriat, eodem die puero obesse, ac dolores parere non raro; si gnum, ex chylo illius diei lac, & per consequens malum prouenisse. Respondetur, verum quidem esse, lac, ex illo chylo factum esse, sed non immediatè, quin prius à iecore in sanguinem qualemcunque fuerit conuersus: ergo cum cruditas primæ coctionis ægrè, vel non refarciatur ab altera, sanguis quoque crudus gignitur, qui ut plurimum, sicuti diximus, in imbecilliores partes distribuitur; maximè autem in mammas, quibus, præter innatam imbecillitatem, ad recipiendam quamlibet corporis colluuiem aptissimam, suctio extrinsecus obuenit ad trahendum efficax. Eæ enim, (ut ait Hipp. lib. de gland. in fine) reliqui corporis redundantiam auferunt. Testimonium abundè præbent mulieres, quibus morbus, aut alia calamitas mammas adimit: nam & vox ipsarum aspera redditur, & humores in gulam feruntur, & multo spatio vexantur, & caput dolent, & ab his ægrotant. Quare & hinc accidit, ut, si à pedum, & aliarum partium frigore, tristitia, aquæ potu, vel qua simili alia causa cruditas oboriat, etiam lac talem quamprimum labem patitur. Secus, si bona coctio succedit, cibi mutatio non nisi post plures dies lac mutat, ut de boue sænum comedente, si gramen edat, obseruauit Vualæus, & alij.

Sexta ratio ob inutili re-
rum circuitu
vitando.

Responsio.

Superaddunt, inutilem putandum fuisse hunc circuitum, nempe ut chylus fiat sanguis, inde in lac chylo æmulum vertendus, ut iterum in infante sanguis fiat, cum alioqui, si sanguis fieri debebat, potuisset sanguis remanere, & ita ab infante fugi. Respondetur, huiusmodi inutiles circuitus in vno, & eodem subiecto semper à natura euitari: at in, & per alia subiecta, nequaquam; sed imò à natura queri, ut continua sit rerum

rerum generatio, & generatarum alitio. Chylus ergo in sæmina sanguis fieri debebat, vt vniuerso corpori, & vberibus ipsis vniuersale esset idoneum alimentum. Ex eo in his lac superfluit, non sui ipsius, sed alterius gratia. Ad nutriendum quippe puerum idoneum multò magis lac, quam sanguis: illud enim ventriculo proportionatum tam quoad temperamentum, quam quoad secundarias qualitates gustui, tactui, & visui iucundas; hic verò minimè, qui extra venas concreuit, animiq; deliquit, veneno proximus, inducit, nisi aliquo condimento, aut coctura præueniatur, & præmuniatur extrinsecus; vt propterea sibi sanguinem exire non modò, sed & sanguinem sorbere natura ipsa, à nullo edocta, abhorreat. Addo, nec sic futurum fuisse congruum: nam cum Adultis opus esset forinsecus cibum capere, pro quo assimilando diuersas in corpore coquinas ordinatè Natura construxerat, dedebat eas, vbi perfectæ sint, otiosi omninò, sicuti è contra incongruum fuisset, eas, adhuc teneras, cibis fortioribus onerari: otiosæ autem fuissent, si sanguine ipso puerulus nutrire- tur. Et sic lac parauit Natura, faciliè à ventriculo, & iecore euincendum, vt sanguis redeat, & paulatim inde alijs hæc viscera assuescant minus similibus alimentis. Declaro autem membrum illud distinctionis præfatæ, scilicet circuitus huiusmodi in aliud subiectum à Natura permitti, imò quæri exteriori hoc exemplo, quod in animalibus ex chylo sanguis gignitur, ex eo caro, ossa, membraq; alia nutriuntur, lac, quaq; sunt, vt inde à nobis edantur, iterum in chylum, sanguinem, & carnes commutanda.

Lac puero nutriendi idoneu magis, quam sanguis.

Alia responsio.

Dicent, si per nos factus in viro nutritur sanguine, potuisse quoque in lucem editum eodem nutrir: Sed diuersa ratio: nam in viro sanguis per vmbilicales venas recta in iecur, venas, & Cor factus ingreditur, atque pergit; foris autem per infantis os, & gulam in ventriculum, & sic extra venas abiret, & pathemata idè indicta non euitarentur.

Cut spursu guine. puer lacte natura pascitur.

Subiungunt: Si lac ex sanguine fieret, mulier lactans, quæ solita erat tantum sanguinis congerere, vt lacti producendo sat esset, si ob necem pueri, vel quod aliud accidens à lactando desistat, in manifestam plethoram, & quem alium ex repletionem affectum incideret: quod tamen non obseruatur in praxi. Respondeo, efficacissimam esse hanc rationem; verum dictam experientiam omninò imperfectam, & hebetem. Etenim, si mulier iuuenis, lacte abundans à puero lactando subito cesset, si benè adhibeatur mens, videbimus primò, mammarum turgentibus, ac doloribus, & nisi lac extrahatur, phlegmonibus, horroribus, ac febribus subiici, itaut cogatur per vices catulo, aut arte aliqua (ni puer alius adsit) lac extraducere, indequè alimenta sibi subtrahere, vt paulatim natura ab illa vbertate desuescat; plethoram verò inde subsequi, & mala alia, nisi ea in cibo, potuq; valde se moderet, mensura superueniant, & exercitia, aut quid æquiualens natura, vel arte superindantur; Hincq; euenit, quod, si mulieri à morbo aliquo aggressæ subito tollatur, & ablaetetur infans, augetur febris, & alijs symptomata accedunt.

Septima ratio ab euentu ablaetationis eruita.

Solutio.

Quæ ablaetationi superueniant, & euadendi modus.

Aegra mulier subito lactata desinit, & augetur morbus.

Si

Si verò ob longum lactationis tempus, vel corporis, & virium imbecillitatem Nutrix parùm generet lactis, etiamsi ei tollatur infans, non patietur, vel minimùm, & paullisper; sed imò pinguescet, roborabitur; & ad mediocrem statum redacta, vel menstruabit, vel concipiet, vel, sic Natura docente, cibationes imminuet. Aliàs, & ipsa tandem patietur. Hæc vera praxis, & observatio nostris his in Oris, nisiq; forsàn alia sit alibi mulierum natura, fors, consuetudo, victus, aerisq; ac Cæli constitutio, talis ubique vicens.

Obstata ratio à puerperijs, & mensibus lactantis prosequentiibus addita.

Soluitur.

Cur puerperia lactantis minime retineantur.

Lactantibus plurimis cessant menstrua, & quibus fiunt, raro, & parvis.

Mona ratio ab obesitate, vel emaciatione lactantis sumpta.

Soluitur, & cur obesitas copia, & gracilitas inopia subdit, ratio ad-

Insuper: siuè ab vtero, siuè aliunde (dicunt) ad mammas progignendo lacte sanguis conflueret, necesse esset puerperis tertia die, quando plurimis vberim mammarum intumescunt, & lac emittunt, puerperia sisti; item nec lactanti menstrua prorumperent: Et tamen in illis videmus nihilominus profequi ab vtero fluxum, & his nonnunquam menstrua exire. Respondeo iterum, efficacem esse rationis vim, si supposita in conceptis terminis subsisterent: At non subsistunt: nam puerperia, nisi aliquando ob immaturitatem ex nimia vi, aut alio casu venæ aperiantur, verè sanguis non sunt, sed omnia ferè excrementa sanguineo colore tincta, & nonnunquam albicantia, ac serosa, ideo lochia dicta; quæ ex fætus (qui nitidiore alitur succo) enutritione superfuerunt in matris corpore, & hiantes vtero, facillimè tum ab eius cavitate, tum ex vasibus ipsius adhuc resudantibus, & se veluti in cloacam expurgantibus extruduntur; sanguine interim, qui solitus erat in fætus alimoniam absumi, ad mammas recurrente, & deinde per suctum etiam à Cavæ furculis thoracicis eodem allecto. Ergo diversitas excretæ, & excernendæ materiæ, & loci disjunctio, sese invicem non impedire excretiones, efficiunt. In plurimis quoque lactantibus cessant menstrua naturaliter, itaut ex decem lactantibus vix vna ea essent, & hæc quidem parcius, raro, & non nisi quando lactis exitus ad sanguinis superflui excretionem non sufficit: Sunt enim quædam mulieres adeò sanguinis feraces, ut mirum, quanta in copia per vterum, hæmorrhoides, & nares sanguinem ad tempus euacuent, si in otio degant. Non absurdum tandem, corpus plenum per plures euacuari partes.

Superaddunt: Si mulier obesa, & carnosia copiam lactis producat, quæ tamen venas tenues nanciscitur; & è contra excarnis, cui venæ tumidiore apparent, lactis inopia laborant; quomodo dicimus, ex sanguine lac procreari? manifestum quippè, ubi maior sanguinis quantitas insit, maiorem, & lactis copiam sic fore. Respondetur, in carnosiss, ac pinguis, ut potè affluenter nutritis, minimum nutrimenti partes trahere, & sic vberibus totum superfluum libere permitti: in extenuatis verò, si sanæ sint, partes omnes auidè trahere, itaut vberibus modica pars relinquatur, nec superflui quid, vel parum subdit (huiusmodi quoque vix menstruantur); sin ægræ, sanguinem fore primum, tertium, ac faculentum, id oq; lacti gignendo ineptum. Respondetur secundo, corpora plena, obæsaq; ut plurimum frigidiutcula, & sic minus dissolubilia esse: excarnia verò siuè gracilia, calidiora (ut quibus calor

calor non ab humiditate retunditur), & consecutiue magis dissoluentia, & alimenti conterentia: vnde, sicuti in illis parum sanguinis magnam potest fouere, & suppeditare excretionem, ita in his plus eiusdem minorem sensibus exitum obijciat. Respondetur tertio, obseculis vbera inesse turgida, pingua, carnosae, & glandosae magis, et sic lactis feraciora; in gracilibus e contra mammas quoque subsidentes, graciles, membraneas, & glandularum egenas, & sic minus facundas, vel steriles esse. Respondetur quarto, in extenuatis venas apparere amplas, non quia magis plenae sunt, sed quia caro illas non integit, nec premit, sed semiuacuae flauescunt, & subsident; vbi ex altera in carnosis venae a carne premuntur, teguntur; & ideo tenuiores oculis apparent: quare aliud est videri, aliud realiter esse sanguinis vbertatem. Hoc vnum scio, si sanguis abundet probus, mulierem non extenuari, sed succulentam esse, & lac copiosius suggeri a muliere habitus mediocris, quam a pinguiuscula, cui mammae quidem aliquando maiores, sed lactis inaniares adsunt.

Prosequuntur: Nulla ratio videtur posse suadere, cur factus in utero sanguine crudiore nutriatur, foras vero emissus eo concoctiore (cuiusmodi lac esset, si e sanguine fieret) fruatur. Respondetur, lac, etsi ex sanguine a mammis conficiatur, & in candidum vertatur, non posse dici sanguine, respectu alendi pueri, concoctius, sed imò minus: non enim ex quo simpliciter, sed & quale a liquid fit, & est, consideratur: mammarum autem, seu glandularum natura frigidior, sanguinem quoque in frigidiorum naturam, dum illum sibi assimilant, conuertit, ut habetur ex *Gal. 5. aphor. 40.* Quare, respectu infantis, ad sanguinem generandum, lac infra subsistit, & concoqui ulterius poscit: quamuis respectu mammarum ipsarum, cum lac sit earum nutrimentum proximius, verius dicatur sanguine magis elaboratum. Ergo constat, ex eo, quod statuamus, lac ex sanguine fieri; non posse tamē dici, infantem teneriori ali cibo quam factum, sed imò crudiori; Et id iure, cum in illo adsit ventriculi coctio, quae in hoc forsan otiaur.

Afferunt praeterea, magnam partem lactis in nutricibus a potulentis fieri, eaq; citissime in lac conuerti, quod fieri posse non videtur, si in sanguinem prius sunt vertenda. Respondetur cum *Hipp. 2. aphor. 11.* facilius impleri potius, quā cibo; cuius causa est, quod ea minimam a ventriculo alterationem expetunt, cum dissoluta, & liquida sint, ita ut facillime a iecore, si famelicum sit, attrahi simul, & concoqui possint; „ maxime autem vinum, quod, ut ait *Gal. 3. de temper. 2.* ut assimiletur, mutationem desiderat minimam; quo fit, ut tūc nutriat, tūc robor, borel celerrime.] Vnde, & *Hipp. 2. aphor. 21.* dixit famem thori exis, „ id est vini potio, soluit.] Non itaque mirandum, in lac etiam citissime conuerri.

Adijcit Deusingius, lac generari e chylo, demonstrari ex magna similitudine, quae est inter lac mammarum, & succum, qui in pancreate, & lacteis venis reperitur. Respondeo primo, aliquam quidem simi-

Decima ratio, à diverso factus, & infantis alimento petita soluitur.

Lac vario respectu, & magis, & minus coctum sanguine dici potest.

Vndecima ratio à citissimis potulentorum in lac conuersione. Scitur quoque, quod potulenta facile à ventriculo, & iecore conuertuntur,

Duodecima ratio à similitudine lactis, & lacteati succi ducta. Soluitur.

litudinem adesse, sed non totalem, cum aliquantum substantia differant: quia qui in lacteis, & pancreate reperitur succus, valde tenuis est, & aquosus, lac autem crassum; hoc dulce, læue, ille varius, & forsan insipidus. Secundo non esse mirum, quod assimilentur, cum ex simili materia uterque generetur succus, nimirum ex sanguine; & à similibus partibus, nempe glandulosis, pinguibus, spongiosis; & ad eundem finem, nempe ob sui alimoniam: quamvis in vberibus ob suctionem, & glandium magnitudinem, sic Natura dictante, copiosior superfluat succus ad commodum infantis: In paucissimis enim lactearum album succum esse chylum, qui ad secur eat: in plurimis verò alimenti vbertatem cum ferocitate ijs partibus familiari, sat fuit primo Libro commonstratum.

Cur hi affi-
milentur suc-
ci.

Decimater-
tia ratio, à
sensu lactan-
tis euulsa sol-
uitur.

Multa mu-
lierum dicta
minimè cre-
denda.

Quid sit
quod ad vbe-
ra ascenden-
te perferantur.

Decimoquar-
ta ratio, à le-
ge circulationis
mixta, in-
substantia.

Decimoquin-
ta ratio, à na-
tura, & via
sanguinis
sumpta.

Solentur.

Afferit insuper, lactantem aliquando post potum manifestè sentire eiusdem per latera ascensum ad vbera. Ad id respondeo, multa à mulieribus enarrari, quæ ob sexus leuitatem minimè sunt credenda: ut enim ad delicata pocula inuitentur, quid prohibet, quin dicant, se statim instaurari totas, lactificari, & vbera lacte impleri? Sic enim, & multoties (cum ex altera sint salaciores), se nil in coitu delectationis perferri prædicant, ut ad illum maioribus blanditijs irretiantur. Sed esto, talem sensum ascensus esse verum; nùm propterea dicendum, illā portionem statim ad vbera eleuari? hoc vanum: nam si statim ab vberibus ore, vel manu lac alicuius, non portionis colore, non sapore, non substantiam, sed costis lactis speciem præferret; nec è rubro in albū, e tenui in crassum, ex austero (talìa enim nonnunquam pocula sunt) in dulce quid sic festinatè mutatur: Itaque coniiciendum, solos vapores, (qui quoque ad Cor, & caput sensibilibiter efferuntur) mammas petere; qui si ibi in aliquantulam quoque humiditatem degenerare asserantur, non omnino absonum.

Illud etiam argumentum desumptum ab arteriarum impulsu, ex quo sanguinis extravaasio, phlegmone, & lactis plenitudo oriri posset, quæ viderentur circulo sanguinis supposito opponi, nil nos vrget, qui circulationi prædictæ nullam habemus fidem sanguinemque non per arterias tantum, sed multo magis per venas ea in quantitate, quæ deceat, & opus sit, illuc ferri cum Galeno, cæterisque contendimus, sicuti præcedenti Libro sat clarè demonstratum fuit. Et hoc idem pro nobis ibi fuit adductum.

His nonnullas alias rationes adijcit Paulus Franciscus Pallierius loco supracitato, quas hic libet breuiter ventilare. Et prima quidem, quam addit, est, quod longè distat natura sanguinis à lacte, obscuræque sunt viæ, per quas ad mammas deferri possit: quamvis enim cum Hippocrate sanguinis refluxum ad mammas ab utero pro lactis genesi admittant nonnulli, & mammarias assignent venas, non tamen eæ sunt, ut per illas tanta sanguinis quantitas continuè fluat. Sed quantò veridicentiùs hæc suo chylo obijciuntur! quantò enim longiùs à luna aer, quàm ignis

tantò

tantò à lacte chylus, quàm sanguis, distat magis. Quippè si lac dulce, chylus acidulus, si illud consistentia mediocri, chylus vel in ventriculo pulscus, vel in lacteis aqueus cernitur: E contra verò sanguis, & sapore dulcis, & consistentia medius adinuenitur. Et de vasis quidem multò melius eadem sibi possunt reponi: siquidem, si de sanguine loquamur, mirum, quin cum puduerit talia de vasis ad mammas deferentibus proficere; cum, si de mammarijs loquamur, nullus adeò ignobilis Anatomus sit, qui eas non designet per rectos musculos ab utero ascendentes, qui aliæ descendentes obuiam fiunt: si verò de superioribus, quæ verius lactis vbertati deferuiunt (& hoc in lactis retentione dignoscitur, in qua humeri, & dorsum grauantur) clarissimè tum ab axillari vena extrinsecus, thoracicas superiores dictas; tum ab eadem sub osse pectoris interius vsque ad mammarum glandulas (mammarias quoque venas nuncupatas) deriuat Bartholinus cit. lib. 2. anatom. reform. cap. 1. Vtunque autem sit, manifestum cuilibet est, copiosissimos venarum, & arteriarum fines in mammas inferi; vt propterea in ijs facillimè cancri enascantur, difficillimè curentur, & ijs abscissis, vix sanguinis arceatur fluxus. Hæc verò quis verè de suo chylo dixerit? cuius ductus nemo adhuc vsque à ventre inferiori ad mammas delineare potuit; & meritò cum nulli adsint pro lactis chylota materia ferenda idonei, vt supra diximus. Nec scio, quomodo sic lata fronte asserat ipse Pallierius, à thoracico tubo per thoracem lactiferos spargi ductulos, cum cæteri omnes nullas à dicto tubo progerminationes quàm in subclauiam venam agnoscant, vt illum nonnulli calamo scriptorio non incongruè assimilauerint.

Altera eiusdem ratio est, mammas, vt frigidas, & glandosas, ineptas esse ad sanguinem pro lacte gignendo elaborandum; cum potius ad corporis tollendam redundantiam aptæ esse videantur. Hæc tamen ratio valde imbecilla est: quælibet enim pars viuens, imò & planta, quamuis natura frigidissima, ad se deductum succum, quisquis fuerit (dummodò non extraneus) in sibi similem qualitatem alterare est potius. Vbi autem omnia cætera cessarent, sola pulmonum, & Cordis, in quibus natui caloris fucina moratur, vicinitas omnem argumento efficaciam prosternit. Sed & quod ijs, quibus vel ob morbum, vel ob ætatem glandulæ absumptæ, & pinguitas elapsa est, quantumuis probè alantur, & emulgeantur, lacte carent, nonnè indicat, illarum præsentiam ad lactis generationem prodesse? quo enim presente, aliquid sit, & absente, cessat, causam illius esse quis iuste negauerit? Et quod corporis multitudinem tollere ex Hippocrate aptæ natæ esse videantur, nihil vrget, imò confirmat intentum: est .n. & dicitur redundantia, non chyli, sed massæ sanguineæ vbertas; multa; vnus respectu superflua videntur, ac ideo excrementa dicuntur, quæ pro alijs alimentis dicuntur, & sunt.

Nec magis illud aliud eiusdem premis argumentum, sumptum à san-

Decimasecta ratio, ab Imbecilla, mammarum natura desumpta, soluitur.

Sola pulmonum, & Cordis vicinitas eam proferat.

Decima septima ratio, à colore lactis, & sanguinis sumpta.

Solutur ventriculi exemplum.

guinis rubro colore, qui non sic facillè videtur à mammis glandosis, caris, spongiosis, & mollibus euincendus, potissimum quia rubri in album commutatio difficillima est, vt videre licet tùm apud tindiores, tùm apud chymicos: Nam sola responsione euidentiæ, & experimenti contrarij diluitur: Videmus ergo, chylum cuius ipsemet se tantum patronum præstitit album fieri ex cibis, potibusq; viridibus, rubris, nigris croceis &c., à ventriculo, parte membranosa, exanguis, & frigida, nec sic Cordi vicina, vt sunt vbera: quæ verò de Arte adducit, difficultatem quidem arguunt, non impossibilitatem; & de Arte dicunt, quæ Naturam quidem imitari, non autem illius vim valet attingere.

Cætera, quæ ibi idem subiungit ingeniosissimus Auctor, iam supra allata, & ni fallor, euulsa sunt; itaut liceat hic Caput claudere, & concludere, vt in anteriori intendebatur, nouiter scilicet per Pecquetum inuenta vascula nil magis recentiorum de Lactis materia opinionem elucidare; quin liceat, ac possit toto Marte antiqua sustineri, & confirmari opinio. Lac ergo ex sanguine à mammis elaborari, & cumulari, non autem ex immediato chylo, sat constat, quantumcunque speciosa, & multiplicia fuerint, ac sint Iuniorum argumenta.

Concluditur lac e sanguine, non à chylo, à mammis elaborari.

CAPVT TERTIVM.

Statu in utero non chylo, sed sanguine, nutritur: frustra ergo putatur, Lactearum inuentum quicquam conferre ad contrariam nouam opinionem firmandam.

NON absimile, mea sententia, iudicium ferendum est de via chyli per lacteas venas ad vterum, pro sætu alendo, vt eodem ali noua iam apud quosdam insurrexit opinio; inter quos non infimū obtinet locum Antonius Deusingius iam supranominatus, Vir maximi ingenij quidem, sed & ipse ad noua ferenda deditus, quem nuperrimè sequutus est iam dictus Paulus Franciscus Pallierius Genuensis in suo supracitato lib. *de lact. vera gen., & vsu cap. 8.* Quandoquidem, si lacteæ à Pecqueto inuentæ considerantur, siq; sui ipsius, & Bartholini dictis acquiescendum, eas non nisi chylo toti ad Cor ferendo inferuire, aut quid etiam modicum seri in renes deportando esse, statuendum est; si verò stetur Bilsio, qui renes prætergressus, videtur inuenisse, venulas ab eo roriferas dictas vltra progredi, illas solam forositate roridam deferre, non chylum, nec lac, ex eodemmet ponendum est; nec adhuc visa, vel audita publicatio descriptionis eiusmodi vasorum, quæ ad vterum vsque progrediantur, quantumvis hoc enixè ab amicissimis meis postulauerim.

Sed (quod magis refert) inualide nimis illa opinio est, quæ antiquissimæ pugnans, decernit, vterinum germen ali chylofa substantia, cum vterius sanguine nutriatur. Circa quod ne acere loqui videar, duo hæc mihi

mibi probanda affumo; vnum nempe, puerum, siue factum in matrice nutriri sanguine; alterum non nutriri chylo immediatè, nec aisi prius in sanguinem verso. Quibus peractis, obiectiones, quæ antiquæ opinionis, ac rationibus pro ea adductis, fieri possunt, & nouissimæ opinionis fundamenta eripere, vel eliminare conabor. Factum ergo sanguine pasci, plura ostendunt.

Et primò: Alia introitus alimenti in fœtum via sensu non percipitur, quàm per os, & per vmbilium: per illud nihil ingredi suadet Autopsia, cum in eius ventriculo saltem primis mensibus nil vnquam adhuc fuerit inuentum, seu obseruatum, præter aliquid phlegmatis ex sui nutritione pronati; In hoc verò semper sanguis, nunquam chylus inuentus fuit: Ergo sanguine ipsum ali arbitrandum.

Fœtum sanguine nutriti, argumentum primò.

Secundò: Vnumquodque augetur, nutriturq; eo, ex quo genitum est: fieri autem hominem ex semine, & sanguine tam certum est, quàm quod certissimum, & insuper probatur infra cap. 9. Ergo iisdem augeri, nutritiq; est asserendum. Prior nota; cum eadem sit substantia, quæ augetur, & nutritur, ac ea, quæ gignitur: eadem ergo vtriusq; materia augens. Minor etiam est manifesta: sic enim, & Philosophi, & Medici omnes consentiunt; & præterea idem rei euidencia monstrat; cum non nisi menstruantibus conceptio contingat, & post conceptum illa vel cessent, vt in pluribus, vel minuantur plurimum in quibusdā: Nec enim ante menstrui eruptionem, nec post eius naturalem defectum, quampiā naturaliter erupisse, datur. Imò &, si ab obstructione, vel alio præter naturali affectu menstrua supprimantur, vel ex virili quadam natura non fluant, nec conceptio contingit: Signum ergo, sanguinis concursus ad graviditiam requiri. Nec momentum facit, quod cap. antecedenti dixerim, vidisse mulierem nunquam menstruantem concepisse: præter enim quod; vt ait Vallesius, nil in natura adeo necessarium est, quin aliquo ex casu aliter esse possit (quod tamen theorematum à plurimum contingentibus sumpta, immutare non debet); & id non accidet, nisi in ætate iuuenili, in habitu sanguineo, cuiq; etsi menses vel ob labores, distractionesue non erumpunt, sanguis tamen adhuc affluit; & mulieribus talia dicentibus vix creditur: nam non omnino malè ex Græcorum proverbio his dixit, Muliere iurante, ridet Cælum.

Argumentum secundum.

Tertiò: Nisi è sanguine fieret, & aleretur fœtus, mulieri gravidæ vel non supprimerentur menstrua, vel si ex occlusionem vasorum à fœtu facta suppressio oriretur, in plethoram laberetur ipsa, & ijs fieret subiecta malis, quæ retentis mensibus solent omnigena superuenire; eòq; magis, qui vteribus progreditur fœtatio: & tamen, è contra fieri, obseruatio quotidiana ostendit; cum & supprimantur menstrua, & primis solum mensibus quicquam gravidæ patiantur, cæteris verò incolumiter degant. Cum autem suppressionem dicimus, intellige quoque de plerisq;: quia hic eas non moror, quæ ob sanguinis feracitatem, quamuis gravidæ, aut lactantes, aliquid, vel quandoque menstruantur. In

Argumentum tertium.

his nihilominus manifesta conspicitur tum in quantitate, tum in vicibus diminutio; id quod in similibus ad rationis efficaciam sufficit: tantum enim dicitur retineri sanguinis in ea, quæ duas eiusdem heminas euacuare solita, vnicam excernit, quantum in ea, quæ vnicam sollebat educere, si prorsus retineatur.

Argumentum
quartum.

Quartò: Nisi è sanguine procrearetur, alereturq; fætus, frustra Natura tantam sanguinis fecunditatem mulieri tribuisset; frustra tantam sanguinis procliuatatem ad vterum instituisset; frustra tantam in venarum vteri osculis sanguinis effundendi facilitatem destinaisset: Ad quid enim mulieres tot profluuiorum periculis, tot ex suppressione (si quando accidat) miserijs, tot mensualibus, ob menstruationem molestijs, tot cruentatis sedationibus exponere, si nec ad lac gignendum, nec ad fætum alendum requirebatur sanguis, sed chylus? Vnico siquidem augendæ, vel minuendæ cibationis præsidio, se ab his ambagibus exbrigasset.

Argumentum
quintum.

Quintò: Si non ex sanguine fieret, nutrireturq; in vtero fætus. Natura se se ostenderet inspidam, quæ sanguineum animal formans, & alens, materiam aptam, promptam, affluentem, qualis in muliere sanguis est, respueret, vt ex chylo minus apto, (vltiori enim indiget coctione) illuc fluere insueto, non superfluo, opus perficeret; insciam, quæ ductus faciles, assuetos, sæpèq; hiantes fugiens, ad vascula asfractuosa, via comprehensibilia, nec effundere solita, se conuerteret; impiam, quæ matri validæ solitam sanguinis procreationem minueret, vt chylum suscipitur pro pascendo fætu, cui nihilominus, etsi imbecillo, is in sanguinem, & nutriatur, vterehdus est; inanem, quæ purpurea in puerperio daret indicia, cum intus pallido pallio indueretur.

Argumentum
sextum.

Sextò: Fætus alitio, vt quæ cum modico genitricis incommodo, ac detrimento contingit, ex aliquo huius superfluo fieri iudicanda est; alioqui si necessaria surripiantur, quomodo sine magno hæc fiet virum dispendio? At nullum euidentiùs superfluum in vtero, quàm sanguis. Ergo &c. Et minor ex supradictis patet, nimirum quod ab vtero antea solebant erumpere menstrua, quæ tunc iure retinentur.

Argumentum
septimum.

Septimò: Mulieri grauidæ non, nisi magno cum periculo abortus, mitti copiosum sanguinem, magisq; si fætus sit maior, & ab inferioribus educatur venis, omnes tum veteres, tum recentiores fatentur Libri; quod nullum esset, nisi ex sanguine aleretur infans: nam per talē emissionem nec subtractio alimenti, nec illius fieret violenta ad vterum confluxio; cum in alijs vasis chylus à Parte suppositus gignatur, moretur, ac fluat, quàm è sanguifluis venis.

Argumentum
octauum.

Octauò, similem fieri embryonis enutritionem docuere Hipp. lib. de nat. pne. num. 5. & 39 Arist. lib. 2. de gen. ani. 5. Gal. 5. aphor. 3. Hosq; sequuta Medicorum, ac Philosophorum schola omnis, constanter id asseruit, usquequò proximis temporibus Anton. Deusing. publicè asseruit, ac disputauit, fætum in vtero nutrirì chylo in pancreate elaborato, ac inde

inde ad vterum per incertos, nondumq; tunc inuentos ductus peruenito; quem sequuti sunt alij cum Pallierio supranominato. Nec mirandum, cum antea de lacte quoque idem accertimè tenuerit; optimè sciens ex *Arist. cit. loco, & Auerroe in commen.* eandem esse materiam lactis, & succi, ex quo vnumquodque gignitur, & nutritur.

CAPVT QVARTVM.

Fatum chylo non nutriri, probatur.

HÆC viderentur sufficere argumenta ad exclusionem chyli pro vterino germine nutriendo; cum de regulis Iuris sit, inclusionem vnus valere ad exclusionem alterius: Vt autem clariùs adhuc veritas pateat, quod fatus non nutriatur chylo, pluribus alijs argumentis suadere conabor.

Et primò, quod muliere obesa sine cibo duos, vel tres dies commorante, nihilominus viuât, aliturq; fatus; Sicuti &, si illa acuto aliquo morbo laboret, & ob id per plures dies paucissimo, & tenui victu utatur, viuât tamen ille, &, ni lethalis sit affectio, aut imbecillima fatans, saluator incolumis. Quæ quomodo fieri possint in embryone, & fatus primordijs, si chylo ali debeat, mens mea capere nescit: nam si dixit *Hipp. primo aphor. 13.* Pueros minimè ieiunium ferre posse, quid de embryone dicendum, cui & formatio, & actio debentur simul? quomodo autem sine cibo chylus?

Argumentum primum

Secundò, quod pauciora multò alimenta grauida mulier capit primis mensibus, quàm antea, & multoties assumpta euomit; & tamen, si duobus nutrimentum debetur, copiosior potius esse deberet quotidiana cibatio, cum chylus non nisi à cibo habeatur, nec in via ampliùs, quàm paucis horis, ex Neotericorum autopsia commoretur.

Argumentum secundum

Tertiò, quod aliquando prægnantes in principijs, & per tres menses pica corripiuntur, & aliena ingurgitant, carbones, gipsum, calcem &c.; vel praua alia deuorant alimenta, præsertim acerba, acidâq; à quibus, si sola ventriculi actione alterentur, quomodo proba fatui alimentio, possit obuénire, quomodoq; cuitari valeat illius extrema lætio, nescio imaginari: dato enim posse à ventriculo virtute caloris, ab vtero prægnante adaucti, melius concoqui, & euinci, id saltèm non aufugietur, quin ex prauis edulijs prauus gignatur chylus, qui si immediatè ad vterum feratur, incommoda grauiâ, aufugi minimè posse, videtur.

Argumentum tertium

Quartò, quod ex Circulantium præscripto venæ omnes ab extremis reducant ad Cor, non autèm versus extrema, vt proprium videtur esse (ex eorum sententia) arteriarum: cum ergo harum proprietàs sit vehere sanguinem, non chylum, patet hinc, chylum nec ad vterum fore deducendum. Quod si dicant, has lacteas non esse de aliarum venarum genere: necessariò tamen concedere debent, eas vel versus Cor

Argumentum quartum

dedu-

deducere, tamquàm ad centrum, & sic non ad vterum, nec ad mammam; vel ad circumferentiam, seu ad alia membra, & sic non ad Cor, nisi per ramusculos, vt ad alias partes; Sicq; cessabit decantata totius, vel plurimi chyli semita ad Cor; nec ad vterum perueniet plus, quàm sua portio petat, ad alendum factum insufficiens Sed quod omnem tollit scrupulum, adhuc nullus, quod sciam, hos ramulos ad vterum pertinentes inuenit, aut descripsit Anatomicus, quicquid de Bilio speraret Deusingius.

Argumentum quintum.

Quintò, quòd sanæ, libereq; mulieri deberet esse naturalis chyli ad vterum corruatio per illa vasa; aliter quomodo in grauidatione talimunere fungentur? Et sic vel vterum illo nutriti, esset necesse, vel inibi collectum afferuari, vel ad tempora excerni. Illud primum non videtur rationi consonum: quia sic frustra essent tot aliæ sanguineæ venæ, ac arteriæ ad vterum deriuatæ, cum sic videretur solâ menstrua educenda dicatæ, quod non est dicendum, & secundò, quia non sic exigua eadem vasa esse deberent, vt Anatomicorum oculos, sic nunc lynceos, effugerent, qui tamen lacteas, veluti araneorum telæ fila paruulas in mesenterio deprehendunt. Illud secundum necesse potest: quia nullum tale vas propè vterum, vel in vtero, chylo plenum, ex anatome vnquam repertum fuit. Tertium nec obseruatur: etsi enim dentur mulieres, quibus intermedio menstrui tempore alba effluvia per annos durant, plurimæ tamen rubra menstrua qualibet lunatione effundunt, reliquò tempore his in partibus siæscientes in illis verò non chylosa substantia, sed mucosa, aquea, & phlegmatica exit, quæ multotiès efficit infæcunditatem.

Argumentum sextum.

Si alimentum à fœtu trahitur facilius sanguis, quàm chylus, duet quatuor de causis.

Sextò: Vel alimentum ad fœtum alendum confluit attractum, vel impulsum. Vt cuique sit, potiùs sanguis, quàm chylus corruabitur: ergo sic fieri, supponendum. Nam si per attractionem fœtus fluere debeat, quod potiùs sanguis fluat, probatur primò ex assuetudine sanguinis sic faciendi, quæ luce clariùs indicatur à menstruorum effluuiò, cum ex altera chyli per eundem locum eduçtio inter miranda ab historicis numeretur. Secundò ex vasorum aptitudine: venæ enim, ac arteriæ facillimè in vteri cavitatem sanguinem reiciant, vasa lactea (si adsunt) vel nunquam chylum, vel albo coruo rariùs; illæ latæ, & cuique Anatomico conspicuæ, hæc non nisi oculatoribus, & forsan lucinatis, vel somniantibus visa. Tertio ex similitudine proportionata attracti ad attrahens: similior namque corpori vndique sanguineo, ac alendo magis proportionatus: vt proximum alimentum) sanguis est, quàm chylus, qui frigidior, ideoq; coctionis vltioris egenus extat, & priusquam alat, sanguis euadere debet: Quartò ex abundantia: nam sanguis in fœmina sit faciliè superfluous, chylus autem non magis in ea, quàm in viro superabundans, & si parcè viatur, vel ieiunetur, deficit attractum, quod non accidit sanguini, qui in toto venarum, arteriarumq; ambitu semper pro indigentijs copiosus afferuatur.

Quod

CAPVT QVARTVM. 241

Quod si per impulsum fluere alimentum, dicamus, sic etiam concludendum esse, constat primò ex impellentis facultatis natura: hæc enim ad expellendum non insurgit, nisi vel à copia grauetur, vel ab irritante qualitate incitetur: vtrique autem in sanguine facilius; nempe copia ob fecunditatem mulierum, mollietatem, etiam, & naturalem aptitudinem; qualitas irritans ob menstrui retentionem, in quo semper aliquod excrementum residet; In chylo non sic, vt cui facilius aditus ad hepar, & sanguinem sit, quàm aliò, ob idq; copia non asseruetur; quique à glandularum mollietate, & frigiditate in omnibus qualitatibus mitigetur, ac demulceatur. Secundo ex abundantia spirituum (qui excretici facultati famulantur) tum in arterias, tum in venas à Corde, & Iecore irruentium; qui è contra paucissimi in lacteis morantur, & chylo miscentur ob eorum euidentiore frigiditatem, & à visceribus (si Inuentorum dictis standum) independentiam. Tertio ex agilitate succi, quæ in sanguine evidens ob eius calorem, & spiritositatem cernitur, & in chylo ob eius qualitatem, & spirituum parsimoniam desideratur.

Si illud impellitur. etiam factus sanguis, quàm chylus influet tribus de causis.

Septimò: Si lacte, seu chylo (idem quippe sunt hæc Aduersantibus) aleretur in vtero fœtus, plura, & fetidiora tum alui (illuc bile transmissa), tum vesicæ (ob serum à renibus exsuctum, & per cutis poros expirans) congererentur excrementa, ita ut nec vterus caperet, nec mater sufficeret, nec fœtus toleraret; exemplo in lucem editi infantis, qui lacte nutritus tot per aluum, & urinam quotidie excernit; quod cum non videatur, dicendum, succo benigniori, eliminatoriq; fœtum ali in vtero, sic Naturæ providentia distante.

Argumentum septimum.

Octauo: Si chylo aleretur fœtus, durius multò ageretur cum eo teneriore, quàm cum validiore ab vtero egresso: hic namque, si lac fugit, concoquit in ventriculo, & fæces in intestina relinquit: At ille, cum per vmbilicum trahat rectà in iecur, ventriculi, intestinorumq; opera fraudatur, & sic ei fæces superessent, & frigidiore iecur potiretur sanguinis efficiendi, seu perficiendi materia: nam, vt ait Gal 5. aphor. 40. Quanto adenes iecore sunt frigidiore, tanto lac sanguine frigidus.

Argumentum Octauum.

Nonò: Si chylus tantum requireretur (præter semen) ad generationem, & ad nutritionem fœtus, etiam post menstrui naturalem defectum, & ante eius exitum, dummodo commodè aleretur, & opipare viueret mulier, conceptio, & fœtus alitio fieret: At hæc non fiunt: Ergo non chylum, sed sanguinem ad vteri gestationem requiri, statuendum. Et minor probatur: quia ni poni, & sanguinei habitus sit mulier, neq; conceptio, neque perfectio fœtus, sed vel sterilitas, vel abortus, quâcumq; cibetur, contingunt.

Argumentum nonum.

Ex his omnibus, & alijs, quæ possent afferri, argumentis, indicijs, & coniecturis, manifestum sit, non lac, non chylum, sed sanguinem inferuire tum conceptioni, tum alitioni pueri in vtero commorantis; Et propterea frustra dictum fuisse, ex Lactearum inuentione monstratam viam esse, qua chylus ad fœtum migrat.

Obiectiones pro Deusingio, ac Alijs contra prima pro sanguine argumenta facta perimuntur.

Contra supradictas autem rationes multa pro Deusingio, & alijs obijci possunt; quæ tamen nihil vrgere, monstrabitur. Et primò contra primum nostrum argumentum ex ijs, quæ tertio capite leguntur, Hippocrates *lib. de nat. pue.*, & *lib. de carn.* manifestè asserit, factum in vtero ore lac sugere, ac per os alimentum trahere, cuius asserti dat argumenta duo, scilicet stercus illud, quod vix natus infans nigrescens per aluum deijcit, Meconium dictum; & eiusdem statim ferè nati pueri ore suctum à mammis, qui non sic citò videretur fieri posse, nisi tam in vtero illi assueuisset. Huic opinioni, & Aristoteles visus est

„adhærere, quando *lib. 4. de gen. ani. 8.* hæc dixit: Cum præ magnitudine non amplius sufficit fœtui alimentum, quod per vmbilicum ministratur, lac ad alendum vtile succedit; Cumq; per vmbilicum alimentum non subeat amplius, comprimunt sese venæ illæ, circum quas tunica illa est, quæ vmbilicus vocatur, atque ob eam rem tunc exitum opportunè fœtus consequitur.] Qui duo Auctores in hoc

Soluitur.

videntur opinioni Democriti sic sentientis subscripsisse. Hæc verò nil penitus vrgent: nam, supposito etiam, quod hi Doctores sic sentirent, veraq; opinarentur, clarè videre est, eos tali casu admittere solum aliquem lactis accessum vltimis fætationis mensibus; quibus non sufficere videtur sanguinis per vmbilicum aduentus, & illum potius oblectationis gratia, quàm secus: Nam *Hipp. lib. de nat. pue. num. 21.* ponens primò generationem lactis in grauida promoueri à compressione facta omento, & carnibus ab vtero tumente (hæc autem non ante quartum accidit mensem), inde subdit: Et vbi peruenerit in vteros de

„lacte, puer ipso paululum fruitur.] Et *num. 39.* sic: Trahit enim, quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulq; etiam lacte modicè fruitur. Aristoteles autem verba vel de vltimis tantum mensibus essent

„intelligenda, vel, quod verius puto, post fœtus exitum: sic enim in principio Capitis ait: Lac autem fit ijs fœminis, quæ animal intra se generant, quod vtile partus tempore est: natura enim id alimenti gratia externi animalibus parauit, vt nec deesset tempore debito, neque vltra id tempus superesset.] Qui imò *lib. 2. de gen. anim. 5.* manifestè illam Democriti opinionem refellit his verbis: Qui infantes ali in vtero aiunt sugentes carunculam quandam, non rectè dicunt; idem enim, & cæteris animalibus eueniret, quod tamen nusquam videmus.] Et parùm post: Itaque non rectè aiunt, qui ita dicunt, vt

„Democritus.] Neque tamen illa Hipp. opinio inuersionis est, quod scilicet grandior, ac perfectus fœtus, sicuti functionibus alijs animalibus

Contra primum de sanguine argumentum obiectio.

Solis vltimis mensibus aliquid lactis legitur ab Hippocrate, & Aristotele conceditur.

Hippocr. opinio non est reprobanda.

animalibus modicè fungitur, nimirum motu, ac sensu, ita & deglutitioni possit aliquantulum intendere; & hoc citra dubium suffocationis à serositate, quæ rationabiliter in parte vteri inferiori, & inter duas tunicas secundinàs dictas, vti excrementum moratur: cum os infantis „ versus superiora (& si parum inter genua inclinans) detineatur : „ producentur enim (ait *Hipp. lib. de ost. par. 2.*) omnes sursum habentes caput.] Et sic esse, mulieres quoque patientes asserunt, quæ manifestè sentiunt, fætum exiturum versus inferiora volui. Imò illi libenter, liberèq; subscriberem, si modò viam, qua lac è venis mammarijs fætus ori offerri posset, aliquis demonstraret; In quo non omninò improbanda est, pro parte opinio doctissimi Io. Claudij de la Cornuè, arbitrantii, succum inter secundas, & embryonem detentum nutritium esse, & ore ab eo fugit quod tamen vellem intelligi de aliqua portione (saluo vmbilici vfu) ori fætus oblata post primos menses (non autem de totali eiusdem enutritione); & ea cum restrictione, non è chylò immediatè, sed è sanguine talem procreari succum, vt ipsemet, & Harucius intelligunt, contra quàm referat sine rubore Palladius. Magna enim duo illa argumenta sunt alui stercus, & fætus sic subitò nato cognitus; quibus accedat lac sine vlla pueri passione, vel detrimento exugi, quæ non viderentur euitabilia in subitanea cibi mutatione, vt ipse etiam Deusingius optimè aduertit : qui tamen in hoc hallucinatur, dum putat, & fætus primordia, & alimentum progressum omnem à lacte, seu veriùs chylò fieri, coq; non à mammis, nec per mammarias venas exporrecto, sed à pancreate, & per lactea vascula ad vterum deduci, & in vocatam placentam acceptari; vbi autumat quandam illius mixtionem fieri cum sanguine à fætus corde illuc demandato per arterias, & circulariter per venas in Cor deduci; quæ omnes ingenij chimeræ sunt, ad saluandas introductæ circulationis leges adinuentæ. Clara autem Hippocratis Aristotelisque sententia est, lac illud fætus solatio erogatum à dulcissima sanguinis portione, & pinguiori succo procreari, in venasq; vtero, ac mammis communes venire.

Cum histamen certissimum apud hos Authores est, proprium, ac genuinum fætus alimentum per vmbilicum ingredi: Etenim *Hipp. lib. de postim. part. num. 4.* his verbis vsus fuit: At verò vmbilicus, per quem „ alimenti, ac spiritus ingressus pueris coniungunt, solus ex omni corpore vtero adheret.] Et *lib. de nat. pue. 5.* iuxta mediam autem carnem vmbilicus distat, per quem spirat, & alimentum, ac incrementum „ capit.] *Aristot. verò cit. cap. 3.* sic statim fatuit: Augentur fætus, „ qui forma animalis nascuntur per vmbilici annexum, vt ante diximus; Cum enim vis quoque nutriendi in animalibus insit, vmbilicū „ statim, quasi radicem, agunt in vterum.] Quæ sententia, vbi sic se verè seruari debeat, nec modus deficiet, quo in ventriculum aliquid succi prorumpat per venas à iecore illuc implantatas, sanguineumq; ali-

Genuinum
fætus alimē-
tū per Hippo-
& Arist. ab
vmbilico sec-
tur.

lactifera, (quæ tamen se nunquam vidisse, aut nouisse, fatetur ingenuè) magis esse patula ob diffusum a fætus cordæ allicientem calorem: Horum autem vasculorum naturalem hiatus arguit à naturali interiora utri humiditate, quæ plurimis etiam sanis vsuuenit: Atuerit, præterquam quod ea vascula dari, omnium adhuc anceps contenditur, si sibi talia dentur, vel hoc ipse dare cogetur, conceptum faciliù obuenturum ijs, quæ tales utri humiditates, seu muliebria patiuntur: ita enim prompta esset materia ad iuuandam conceptionem apta: Sed hoc est contra experientiam, quæ docet, similes mulieres rarissimè fæcundari, & non nisi arte, vel natura exsiccantur; & contra rationem, cum illa excrementa humida sint, inibi ab imbecillo calore genita, vel illuc ab impuro corpore demandata, non autem vilia ex superfluitate alimenti redundantia, ut indicatur ab excretorum qualitate, ut Prædici omnes docent, & ut differens vtilium natura commonstrat. Rursus falsum est, plurimas mulieres tales humiditates habere naturaliter. Item quomodo à crassitie, & lentore adhærescentis genituræ claudentur ora venarum, ad quæ sanguis calidus sæpè confluit, & recludentur, aut minime occludentur ora vasculorum serositatem veluti resudantium? quæ ratio illi materiæ præsidet, & cur à calore fætus dilatantur hæc vasa exangua, frigidaq;: venæ autem caloriferæ restringentur? Inualida nimis hæc mihi videntur, cum nil sit, quod rationabiliter chyli maiorem prouentum incitet, sanguinem verò coerceat.

Quarto argumento quis pro Parte respondere posset, non omnino frustra mulieribus tantam sanguinis fæcunditatem datam esse, etiam si fætus ratione minimè deseruiat; cum hoc fuerit, ut earum pulchritudo, venustas, & mollities augetur, ut conciliarentur alacritas, pietas, viuacitas; aliæq; muliebres gratiæ propagarentur, quibus illaqueatus homo, magis studiosus, & ad seria deditus, in earum brachia festinans, Veneri succedaneas pænitentias, lassitudines, tædiazq; floccifaceret, siq; generatio, alioqui vacillans, in Mundo perennaret; nec frustra illam sanguinis ad uterum propensionem, facilemque ab eo exitum datum esse; cum hoc fuerit, ut huius humoris calore, spiritositatq; citillata, ac irritata in sic venerea parte mulier, in Viri concubitum ferè inuitè allecta, grauidationis, partus, lactationis, nutritionisq; tædia, dolores, molestias, ac miseras nihili penderet. Cui talis sanguinis fæcunditas nil damni allatura erat grauidationis tempore, quo, chylo in fetum absumpto, tanta inde cessaret eiusdem procreatio. Verum enim verò acuta quidem, & ingeniosa, sed leuissima talis responsio censenda est: nam & citra similem sanguinis feracitatem tot poterant nihilominus mulieribus gratiæ donari, ut viris quoque multoties in iuuentute donantur, ex quibus multi, præsertim adolescentes, in talibus dotibus fæminis minimè cedunt, nec minus alliciunt, quàm alliciantur, maxime cum ad easdem sufficeret, imò præstaret sanguinis mediocritas, citra superfluitatem, quæ illas potius & lædit, & minuit. Sicuti, & absque

Ad quartum
pro sanguine
argumentum
obicitur.

Resolutum;

absque profluuiorum periculo, & exitus necessitate, & poterant, sola vteri temperie, ac arteriarum numero mutatis, non minus, quàm Viri, coitum mulieres affectare; & euentus id probat, cum salaciores sint mulieres, quibus parce, quàm quibus copiose menstrua fluunt. Quam obrem non ob sic leuia intenta arbitrandum, adeo seria, ac discriminosâ pericula mulieribus minitasse. Naturam, sicq; leuiter ansam dedisse superfluo, vt cogeretur postea in alterum succum superfluitatem transmutare.

Ad quintum
pro sanguine
argumentum
obiectio.

Tollitur;

Ad quintum quoque argumentum nostrum tale pro Deusingio responsum dari posset, Naturam non se inspidam, impiam, ac inanem, sed sapientissimam in lacte factum nutriendo se se prætulisse, vt quæ sic inutilem circuitum euitare, & repentinas mutationes effugare mauouit: frustra enim videretur in matre chylus in sanguinem mutari, si in venis mammarijs, vel alijs vteri venis lac iterum redire deberet, vt inde in factu iterum fieret sanguis; Et cum natus infans lacte alatur, rationabiliter dicendum, eodem in vtero nutriri. Sed ex allatis auctoritatibus Hippocratis iam visum est, factum propriè per vmbilicum trahere sanguinem, qui recta in iecur abit; si quid verò ex superfluo, & expresso dulciori succe ad factum ore trahitur, id esse in vltimis tantum mensibus, & quid supraplus ad supplendum aliquem defectum vmbilici, qui paulatim indurefcens suas videtur constringere venas, & maiori sic alendo factui non sufficit; Et sic imò placida mutatione procedi, à solo sanguine gradatim lacti assuescendo, vt natus puer lacte solo vtens, inde quoque pedetentim durioribus adaptetur, & ordinatè postmodum solis hisce vtatur alimentis. Sic imò etiam euitari quencunq; circuitu, si qui futurus in factu sanguis est, iam factus sanguis confluat, vt imperfecto addatur perfectio, & imbecillo labor subtrahatur omnis.

Ad sextum
pro sanguine
argumentum
responso.

Refellitur.

Ad sextum insuper posset responderi, negando minorem: non minus enim superflua suis temporibus est profusio chyli in glandulas tùm menterij, tùm vberum, quàm sanguinis in venas vteri; ac insuper cum minori virium dispendio fore illius, quàm huius consumptionem: Verùm negari non potest, hoc chyli superfluu (respectu vteri) incognitū adhuc esse, incognitam viam, incognita vasa illud detinentia; & ex altera notissimā sanguinis superfluitatē, notissimum iter, notissima vasa illius: nam si de pancreate, receptaculo, vel lacteis nouiter inuentis dicatur, ea omnia & angusta esse vasa, & cum (ex ipsorum Inuentorum dictis) ad Cor chylum deferant sanguificandum, paucissimum, vel nullum potius, posse ad vterum ferre succum, constat. Sit autem quoque verum, chyli consumptionem cum minori matris detrimento futuram, verissimum tamen, & erit, eam cum minori factus vtilitate, & eius maiori cum labore futuram.

Ad septimum
pro sanguine
argumentum
responso.

Ad septimum responderet Deusingius, ex eo non conculcari, quin lacte possit ali factus: quia, hoc supposito, dici potest, per phleboto-

alimen-

alimento, & ita, cum auidè trahant à ventriculo, & intestinis, totam, vel plurimam chyli absumere, ac rapere partem, itaut infanti debiliore sua subtrahatur portio, indeq; abortus periculum. Sed dicimus, nimis à longe damnum cōijci, cum evidens sit immediatum: illud etenim solam supponeretur futuri alimenti, non iam in lacteis vteri, vel fœtus existentis priuationem: hoc verò (nimirum ob phlebotomiam sanguineis venis accedens) immediatam supponit subtractionem eius, quod iam fluxum, & iam etiam in ipsum fœtum introiuit; cum per vnus venæ sectionem omnes citò possint inaniri venæ, & eò citius, quò proximiores, & incisæ communiore sunt; vltra quod venarum vniuersalitas ad vterum potest concitationem parere. Cum itaque videamus, quandoque ex phlebotomia eadem die subsequi abortum, (vt iam visum, & lectum) non est, vt à tam longinquo ratiocinemur causam discriminis, si proximam, & certam cernimus. Respondetur præterea, in Pecqueti opinione non valere talem responsionem, qui putauit, & scripsit, chyli transmigrationem totam impulsione fieri: nam sic clarum, non minus impellendum fore in lacteas, quàm ante phlebotomiam fieret.

Ad octauum verò sicuti eadem, quæ primo, dari posset obiectio, ita & eadem illius supra allata peremptio valere potest.

CAPVT SEXTVM.

Obiectiones contra secundas superiores rationes, chylum excludentes, factæ, vel factu faciles solvuntur.

Nunc igitur videndum, quid ad cæteras pro chyli exclusionem quarto capite allatas rationes posset ab aduersa parte obijci; vt tandem nebulis omnibus excussis, clarior veritatis lux appareat.

Ad primam itaque si respondeatur, fœtum tempore ieiunij trahere id, quod adhuc seruabatur in via, seu in vasis galaëto foris nuncupatis, cum rationabile sit, non omnino ea vnquam vacua remanere, quin, sicuti venæ sanguinem, ita & ipsa chylum, siue lac pro sua cauitate moderanda retineant; Debilis inquam hæc responsio nimis, & Lactearum Inuentorum iudicio, & Autopsiæ ipsorum minimè cohærens: ipsi namque fatentur, si quarta, vel quinta hora post pastum aperiantur, videri eas chylo plenas, ac citissimè per illas ipsum moueri, itaut nonnulli (quamuis inaniter) ausi fuerint motum eis adscribere peristalticum; qui pro indubitato quoque ponunt, si ieiunium secetur animal, nil, nisi serum, in ijs inueniri, & imò eas tunc ferè inuisibiles esse. Quod si aliquis in ijs longius lactis existentiam protraxit, non vltra viginti quatuor horas id admisit, vt primo Libro vidimus. Ergo demus, aliquid in eis detineri, quod possit à fœtu necessitate coactò, trahi, id valeret pro vnus, vel alterius cibationis carentia. Sed quid si plurium? num sine cibo nutrietur, viuere augebitur? Porro si de puero dixit Hipp. eum

Ad primam
contra chyli
rationem res-
ponso.

Dissoluitur

difficil-

difficillimè ieiunium ferre, quid de formando, simulq; nutriendo, & augeſcente dicendum?

*Ad ſecundam
contra chyli
rationem reſ-
ponſio.*

Ad ſecundam poſſet quidem pro aduerſò opinantibus reſponderi, etiamſi mulier primis menſibus grauidationis parcè cibetur, non ob id conſutari ſætuſ alitionem ex chylo: quia, occluſa menſtruorum via, ſanguis ſuperfluus in venis retentus matri ad ſui alitionem ſufficit, itaut pauciſſimo adiumento ex chylo indigeat, & ſic illa levis cibatio tota ferè ad ſætum, qui & paucis in principio indiget, commodè poſſit excurrere: Levis tamen obiectio: quia vt plurimum, vt dixi, ſunt conceptus finicis menſtruis, ſicquè corpore à plenitudine liberato: vnde venæ inanitz, & iecur matris validum ſuam chyli ſolitam portionem à denibus imbecillis non remittent: quomodo ergo ex pauciori cibo plus chyli? & quomodo ex pauciori chylo ſætui dabitur (qui quid plus matre ſola eſt) formatio, & augmentum? Sed detur, ſætum trahere vafi- diùs venis; cur ergo ſi a ventriculo trahitur, non adeſt appetitus velocior, & ſic congrua cibatio? manifeſtum quippe, etiam ſanguinis quotidie partem diſſolui, & ideo illum quoque inſtaurandum.

*Ad tertiam
contra chyli
rationem reſ-
ponſio.*

Ad tertiam poſſet pro Iſpis reſponderi, ex prauis illis cibarijs lædi quidem ſætum, & ideo videri multoties, in ſic inordinatis mulieribus, & abortus inſequi, & infantes exire prauis inſtruçtoſ humoribus, & multis paſſionibus obnoxios. Verùm enimuerò, etſi negari non poſſit, aliquando abortus inſequi, & imbecillos pueros erumpere ob prauorum ciborum ingluuiem, vt qui nec a forti iecore, nec a venarum valida vi poſſunt quandoq; euinci; attamen, cum plurimi ſætus, harum præcipuè fæminarum agreſtium, etiamſi prædicta errata committant, ab vtero ſani oriantur, hoc futurum fuiſſe non videretur, ſi cibaria illa ſic immediatè à ventriculo ad vterum confluèrent, quantulacunque præparatio ſupponatur fieri a lacteis, partibus frigidis, imbecillis, & potiùs excrementorum, quam alimentorum ductui, idoneis.

*Ad quartam
contra chyli
rationem reſ-
ponſio.*

Ad quartam dicitur, quod quamuis cæteris temporibus ad vterum per lacteas ſola levis portio conſugit, vtero tamē geſtante, ob attritionem ſætus maior chyli portio veniet, & ea, quæ tùm ſætui, tùm vtero ſufficiat ſicuti mammis acci- lit, ad quas ſuctus, tempore lactis abundantia colligitur, cum cæteris temporibus pauciſſimum ex ſui alitione ſuperſit: Verùm improporcionata eſt hæc illatio: nam ad mammas lac non peruenit, ſed in ijs fabricatur, in ijs tubuli capaces extant, & virtus commutatiua fortis, itaut ſola requiratur materia vndique fluens, & illius ſuctio; quæ omnia in vtero deſiderantur: nec enim tubuli capace, non glandes, non lactea virtus obſeruatur; & ſic cum aliunde, & per determinata vaſcula debeat prouenire, patet, non maiorem copiam peruenturam, quam capacitas eorum vaſorum, quæ paruiſſima, vt potè inuiſibilia, (vel potiùs nulla) eſſe debent, ferre poſſit.

*Ad quintam,
& ſextam al-
leguaciones.*

Ad alias duas, quid iuſtè, vel apparenter obijci poſſit, non video. Ad ſeptimam obijci Deuſingius, chylum, qui ad vterum fertur, elabo- ratiorem

boratiorem esse lacte mammarum, eo quia in pancreate non minus, quàm in vberibus elimatur, & sic adhuc ampliùs in itinere à pancreate ad vterum elaborari, & propterea non tot excrementa super futura esse, vt puero foris lactenti. Sed faciliè hoc responsum redarguitur: quia si ipsimet Auctori standum est, lac ad mammas defluens in pancreate quoque conficitur, & ideo non minus in via ab eo ad mammas adhuc magis perficitur, quàm in via ab illo ad vterum. Imò, si rationi attendatur, in mammis ipsis propriissimè ampliùs elaboratur, ab earum insita facultate, & à vicino cordis calore adiuta. Neque rursus ab ea ratione excusat, quod fœtus in lucem editus voraciùs, vt qui animali incipit sensu duci, lac exugat, ac fortiùs, trahat: quia, hoc etiam concessio, proportionaliter nouimestri spatio faciliè coniici potest, quàm plura acceruantur excrementa; Quod inconueniens, facillimum visa est, multò meliùs ex suppositis nostris euitari: Nam sanguis, iam à matre elaboratus crassas fœces reliquit, bilem superfluam amisit, atram fœcem depofuit, & feri partem dimisit (quorum plurima in chylo permanent) vt vel paucissima hepatis infantilis vix indigeat eliminatione, à qua per consequens paucissima quoque excrementa remanent; vel non nisi quæ à tertia coctione resulant, benigniora fœcalia superfint.

Ad septimū
contra chy-
lationem o-
bectio.

Deliciæ.

Alia obie-
ctio tollitur.

Contra octauam dicitur, Chylum à matris ventriculo euictum, ab adenibus mesentericis bonificatum, ac à vasis ducentibus colatum, dulciterq; attractum, nulla alia ventriculi egere coctione, à soloq; iecoris, cordisq; infantilis opera perficiendum; cum alioqui à mammis exsuctum lac, vt quod violenter, & frequenter nimis à pueri ora fugitur, copiosioribus excrementis scateat, & ob id, etiam ventriculi puerilis ope elaboratum, nil melioris conditionis acquirat, quàm alterum sine ea possideat: Replicatur autem, vt tactum est, lac in mammis cordi proximis, copiosisq; ac magnis glandulis, & pinguis sitatibus instructis, etiam si à chylo ab eodem pancreate ad eas iuxta Deusingium procedente fieret (multò ergo magis si ex sanguine) meliùs concoctum, ac elaboratum iri, quàm id, quod à solo pancreate, & vterinis ductibus expoliretur, idcircoq; duriùs cum fœtu, quàm cum puero ageretur, vt ratio concludit.

Ad Octauam
contra chy-
lum ratione
obectio,

Fugatur.

Contra nonam tandem diceret idem Deusingius, in muliere menstruis orbata necessariò calorem imbecillitari non solum in sanguificatione, sed & in chylicatrice facultate, cum imò videamus, in huiusmodi ventriculum præcipuè pati; vt propterea ineptus chylus sit tum ad conceptum, tum ad fœtus alimoniam: Sed excusatio ista leuissima est: quia dantur mulierum multæ, quæ post quadragiennium non ampliùs concipiunt, cum tamen habitus boni sint, appetitu gaudeant, & ventriculi polleant robore. Sed quid dicetur de adolescentulis, quibus, nisi menstrua erumpant, nec vteri gestatio succedit? annè calor imbecillus est, & chylicatio deficit? absit. An deficit ætas? nec hæc, sed quia deficit conceptionis materia potissima, puta sanguis superfluus, nec vter ogerant.

Ad nonam
contra chy-
lum ratione
obectio.

Solutur.

*Afferuntur pro fœtus enutritione lactea tùm Deusingij,
tùm Sequacium, argumenta.*

Oui exem-
plo concep-
tio sine san-
guinis in tes-
tamentu pro-
batu.

NE propterea tamen putes, beneuole Lector, præstantissimum Antonium Deusingium vnâ cum cæteris sic ruditer in talem abijsse sententiam, quin à multis, nec contemnendis rationibus ad eam fuerint adacti; Et quia forsân tibi stomachum mouere posset, quod à conceptione quoque, nedum à nutritione, ablegarint sanguinem; scias, apud ipsos Cor esse proprium sanguificationis organum, itaut (iuxta eorum mentem) ex utroque semine primò omnium Corde genito, in idq; indito vitali spiritu, sanguis propria eiusdem virtute procreetur, ad cætera membra tùm fabricanda, tùm alenda idoneus: Sic enim in ouo videmus fieri, e quo videmus sine sanguinis interuentu animal sanguineum gigni, alboq; inde ipsius, vel, vt vult Deusingius, vitello nutrirî, vsque quò perfectum inde exeat. Hoc itaque præmissis, varia hic illorû argumenta ponam, quæ huiusmodi sunt.

I. Difficile captu est, quòd tam subitò Natura mutationem faciat, vt fœtui loco sanguinis, quo in utero creditur ali, lac illicò simul atque in lucem editus, voluerit destinatum: Imprudenter siquidem id fecisset ipsa, ex cuius constanti lege sancitum est, omnem subitam mutationem etiam in adultis periculosam esse: melius igitur putabitur, ex chylo, seu lacte, etiam in utero ipsum naturaliter enutrirî.

II. Si sanguine mensuris spatijs excerni solito nutriretur fœtus, multis prægnantibus ea quantitas in tantam fœtus molem nouemstri spatio conflandam non sufficeret: cum experientia doceat, plurimas grandes emittere infantes, quibus vix quinque sanguinis vnciæ quolibet mense excerni solitæ fuerant; nihiloq; minus tanta simul lochiorû moles congesta sit, quantam vix tota nouem vnita menstrua compleant. Cum his insuper cernimus nihilominus maiorem sanguinis copiam in vasis detineri, adeout quandoque venam secare sit necesse.

III. Si sanguine mensuro nutriretur embryo, conceptus vitalis esse non posset, paucis diebus post menstruam purgationem: deficeret enim alimentum saltèm tribus septimanis. Quinimò nec paulò ante fluxum menstruorum: obrueretur enim à copia tunc fluentis sanguinis tenella organizanda, vel nuper organizata moles.

IV. Si antiquæ opinioni standum esset, nequaquam ratio dari posset, cur, facta conceptione, non amplius fluant menses: nam, quod in embryonis alimentum totus absumatur sanguis, dici non debet: qui enim primo mense tanta copia in tantillum corpusculum abiret? nec sufficit dicere, partem sanguinis in venis restagnare: etenim talis stagnationis causa reddenda est. Quod si nouæ insistamus opinioni, hæc redde-

reddetur ratio, quod ipsa sanguinis materia diuerſi incipiat, lacte pro nutrimento factus ad vterum confluente, & quod ab illo affluxu, & conceptu mutatur vteri natura, menstrua fermentans, itaut non exurgat excretrix vteri facultas.

V. Si sanguine aleretur factus, minus superflui redundare deberet in vltimis mensibus, cum factus sit grandior, quam ante: Sed contrarium cernitur, cum magis mammae tunc turgeant, & lac in ijs sit genitum; cuius causam Aristoteles, & alij referunt in maiorem copiam vsq; adhuc retenti menstrui.

VI. Sed, & euidentissimum argumentum ab Autopsia desumitur; quod nempe vasa matris sanguinem continentia non communicent cum factus vmbilico: nam nec illa vltra vterum, nec vasa factus vltra vterinum hepar (sic placentam nominant) exporriguntur; itaut si sanguis externi solitus ad vterum conflueret, ibidem extrauasatus haereret, & inflammationes pareret: Alia ergo materia illuc confluere statuenda, atque per venam vmbilicalem attrahi, quae cum sanguine in embryone genito, ad placentamq; vulgo dictam per arteriam transmissio, mixta, intrò per hepar, & Cauam reuehatur ad Cor ipsius in sanguinem vertenda: quare sanguis ille, qui putatur à venis matris exporrectus, ab ipso embryone venit, & circulariter sic mouetur.

VII. Atque hoc ipsum denuò colligi potest eo argumento, quod, si quis vterum praegnantis contueatur, omnia illius conceptacula lacte plena deprehendantur. Ad quod spectat, Laurentium scripsisse, plurimas puerperas copiam lactis per vterum excreuisse.

VIII. Eidem rei similiter fidem facit id, quod notatur à Backio *Dissert. de Cord. cap. 3.* nimirum succum illum, qui è corpore vteri descendit, non forma sanguinis, sed oui albumini similem prodire.

IX. Confirmat item hanc sententiam Analogia sanguificationis, seu potius chymosis, quae peragitur in adultis: quippe chymosi illi, quae sit ex contemperatione chyli per lacteas prodeuntis cum sanguine per Portam ad hepar remeante (sic enim circulationis ab His introductae leges sanciant) vt inde in Corde elaboratur reddatur, respondebit illa chymosis, quae in vterino hepate peragitur ex miscella lactis ab vtero attracti, & sanguinis à corde factus illuc per arterias deportato, vt per venas reuehatur ad Cor.

X. Nec est praeter rationem, quod ait Entius, fetum illud, quod in vtero statim à conceptu colligitur, praecedaneum esse crassiori chylo; aquam verò, cui factus innatat, partem illam chyli tenuiorem esse, quae in nato per renes in vesicam deponitur: nam si sanguinis materni serum esset, nequaquam acrimonia careret, adeoq; fieri non posset, quin tenerum infantem tanto temporis spatio viceraret, ac laederet.

XI. Huic item sero analogum est illud, quod primis mensibus colligitur in gammis: Analogia autem illa identitatem materiae arguit, qua lac gignitur, & qua alimentum capit in vtero factus.

XII. His addito aliud ex Pallierio argumentum, nempe *Fætum*, ut emissus ab utero est, lac audissimè ex mammis fugere, sanguinem verò respuere, quod indicat illum tali cibo usque tunc usum in utero fuisse: nec enim (inquit) dicendum, Naturam non edoctam, quæ vitilia sunt peragere; quia nulla dabitur ratio, qua non ad congenueum, diùq; familiarem succum potius rudis, ignarusq; puer spontè duceretur, quàm ad insuetum, nunquamq; antea suctum; Quod quidem argumentum ex supra allato Hippocratis videtur pro parte desumptum esse.

XIII. Valet etiam alia eiusdem ex Harueio adducta ratio; quòd scilicet in ventriculo tenuibusq; intestinis recens educti fætus reperitur quid lacti coagulato simile; quòd bile, & vrina, quæ secundæ coctionis excrementa sunt, utraque vesica turgescit; & quod si mamulæ ipsius premantur, lac exprimitur, omnia indicia, chylo infantem ali, non sanguine.

XIV. Sed & si sanguis ad uterum pro nutriendo fætu protruditur, quomodo si illi detinetur, & eo pascitur fætus, ad mammas, ut lac euadat, transmittitur, & quam ratione tertio, quartoq; mense lac candicat, si tunc grandior fætus infans maiori indiget alimonia?

Hæc ponderosiora argumenta sunt, quibus Iuniores ad veterem eliminandâ de fætus alitione sententiam uti solent, & quæ sequenti Capite ponderabuntur.

CAPVT OCTAVVM.

Soluntur omnia supra allata Partis argumenta.

Responde-
tur ad exen-
plum ab ovo
pulli deest
tribus de
causis inua-
lidum mon-
stratur.

HIS tamen omnibus nil obstantibus, certam tenere debemus Antiquorum opinionem tum circa conceptum, tum circa alitionem fætus: Nam quod primò affertur exemplum de ovo pulli, vel alterius volatilis, nequicquam contra facit tribus de causis, quarum prior est, in ovo facundo unâ cum collecto masculi, & fæminæ semine adesse etiam vel actualiter, vel proximè sanguineum succum (ut multoties in ovīs edendis non subventaneis punctus sanguinolentus conspicitur), ex quo, & substantia, ac vi seminis, valido incubantis matris calore adiectâ, putandum est, rationabiliter, hepar generari, & Cor; neq; cerebrum; ea inuicem separari, & varia inter hæc enasci vasa, ita ut postmodum per umbilicum attracto succo paulatim cætera plasmentur membra, ac simul alantur; tandemq; ex albo quoque in sanguinem, hepatis virtute, versototum perfici, & augeri pullum. Circa quod obiter notandum, quantum cum *Arist. lib. 3. de gen. ani. cap. 2.* fallatur Deusingius, quando supponit *lib. de motu cord., & sang. num. 10.* pullum generari ex ovi albumine, & vitello nutriri, cum apertè videamus, punctum sanguineum vitello insitum esse; cum hic sit albo in sanguinem mutabilior; natura prius sit centrum circumferentiâ, & interior alitum alimento.

Sed

Sed & hoc apertè docet *Hipp. lib. de nat. pue. num. 4.* hisce notis: Volu-
cris ex luteo oui nascitur hoc modo &c. Ergo etiam huiusmodi ani-
malia ex semine, & sanguine gignuntur.

Altera causa est, quod ouum fecundum dicitur conceptum, forma-
tumquè (vt in viuiparis embryo) vi seminis in matris utero, & poten-
tialiter viuens, extra tamen velociter educum ob multiplicatam fœ-
tum. Luteus autem ex sanguine sanè gignitur, vt illius temperata,
dulcis, lenis, nutrimentosq; substantia eiusdem suadet, sicuti, & albu-
men seminosam esse substantiam, patet. A matre foris aliud non ha-
bet, quàm natiui caloris auxilium, per quod membra, & actualis vita
inducuntur, sicuti à mulieris utero embryoni, & forma fœtus, & ani-
malis vita subinducitur. Ergo ex sanguine, & semine fit, & alitur pullus,
vt & homo.

Tertia ratio, quod alia est generatio animalis in utero materno or-
ganizati, & actualiter viuents; alia extra uterum formati, & ad ani-
malis vitæ actum extrinsecus perducti: in illa enim, intruso semine,
ab utero ipso suisq; vasibus suppeditatur materia conceptui, & alimenta
necessaria debito tempore, ac vsque ad perfectam animalis forma-
tionem, porriguntur: in hac autem, cum non aliunde posset de cæ-
tero aliud obuenire, (intus enim utero viuens affigi non debuerat) Na-
tura totum id, quod generationi, sed verius viuificationi, organizationi,
alitioniq; vsque ad fœtus perfectionem necessarium existit, in duriuscu-
lum putamen includit; eoq; amplius modo dispositum, vt homini quoq;
cuius gratia cuncta huius Mundi à Deo creata sunt, pro optimo tum ali-
mento, tum medicamento inferuaret: cuique enim patet, quantum oua
nutriant, & aspera demulceant: ideo hæc non actu sanguinea, quæ ab
hominis natura horrentur, sed virtute quidem, & potentia proxima ta-
lia esse debuerant, vt facilè à cubantis calore ducerentur ad actum; Qui
respectus in vterinis fœtibus, quibus vndique proximus sanguis actualis
adest, non viget.

Quare non bene ab vno ad aliud exemplum sumitur. Et hic valde
miror, quomodo tantum momentum faciant omnes hi moderni Scrip-
tores in dicta formatione pulli, vt inde deducant formationem, ac ali-
tionem hominis, inter quos maximè tanta diuersitas tum membrorum
omnium, tum vasorum est, vt videmus. Quod si tamen insistatur ali-
quam inde analogiam elucescere, videbimus, non minus, imò magis
multò nostram exinde firmari opinionem, quàm contrariam; & primò
ex illa bulla sanguinea vel plus, vel minus in ouo adhuc integro, vt di-
ximus, inuenta, si fecundum sit, & vitelli sanguinea temperatura; se-
cundò ex diuersitate alitionis pulli adhuc in ouo existentis, ab ea, quæ
statim egresso fit: intus enim vel vitellus ad perfectionem vsque omnium
corporis partium, vel oui albumen in usum venit, cum foras pullus
emissus grano, milio, pane &c. sine alterius mediatione cibi vtatur, &
absq; timore absurdi, à ratione pro infantis vterina alitione lactea ad-
ferè adducta prætenfi.

Nunc

Soluitur pri-
mum argu-
mentum.

206

Nunc verò, ad argumenta veniens, ad primum respondeo, quod, si cum Hippocrate sentiatur, iuxta iam allatam eius interpretationem, quam nullatenus impugno, Natura ordinatissimè procederet, alens primo embryonem solo sanguine; deinde ipsi grandescenti, animalibusq; viribus excitatis, vltra sanguinem per vmbilicum introeuntem, modicum lactis per os de gustandi addens, vt foras educus lacti soli, dentire verò incipiens solidioribus paulatim se cibis dedit: Si verò ab aliquo contendatur cum Galeno, ac cæteris, solum sanguinem per totam veteri gestationem inseruire pro cibo, à quibus neque dissentio, iam nec illa mutatio post emissum factum mirabilis; cum non inconueniat, mutatis gradibus perfectionis, mutari quoque non intentionem, aut virtutem, sed secundarias solum cibi conditiones; nec periculosa, cum hæc paucissimum à sanguine distet: etsi enim dixerit *Gal. 5. simpl. 2.*, lac mediū esse inter sanguinem, & pituitam, subdit tamen statim, recedere illud magis a pituita, accede req; ad sanguinem. Quinimò hæc mutatio saluberrima censenda est: sicuti enim puero additur coctio ventriculi, quæ factui seriabatur, ita conueniens erat alimentum quoq; inferius coctibilitate esse; quemadmodum & validiori facto ventriculo, a lacte ad solidiora alimenta transire decuit. Neque aliquis hic replicet, lac imò sanguini coctione præstare, si per nos verum est, lac è sanguine per mammarum coctionem fieri: nam huic iam dubio responsum fuit suprà cap. 2. Hæc vero mutationes alimenti manifestè videntur etiam in cæteris nascentibus animalibus naturaliter obuenire: Etenim omne volatile intus oui liquore vefcens, exterius semina, panes, cæteraq; symboleica alimenta ore deglutit, vt dictum est, & pisces, bombyces, cunctaq; ex seminali ouo nata animalia exteriore se statim alimento, & in-fueto connutriunt.

Soluitur se-
cundum ar-
gumentum.

3

Ad secundum dicitur, Naturam aliud agere spontè, aliud verò coactam: spontè enim mulier vsque ad decimum octauum annum circiter, vel parùm ante, sicuti & adolescentulus, nil fundet sanguinis; quibus tamen si libra sanguinis extrahatur, vel aliquo ex casu, aut occasione à matribus exeat in maiori etiam copia, vel nil patientur, vel minimum: Cum ergo aliud sit mensium excretio, quæ spontanea est, aliud factus alitio, quæ ex parte coacta, iure dixero, malè ab vno ad aliud argumentari. Quod autem naturam mulieris partim coactè factum nutrire dixerim, ex hoc prouenit, quod is per se viuens, & egens, ad se per hiantia, sibi; continuata vasa alimentum allicit necessarium; matris verò natura partim transfert, quod sibi superfluum est, partim quod nec superabundat, attrahi permittit: Quare non mirandum, si mulier, solita quinque vel sex vncias tantum sanguinis quolibet mense excernere, factum pariat multas libras pendentem: Idem namque videtur etià in lactatione, quæ matri multò durior, & spontina excretionē copiosior est: cui tamen ipsa sufficit plerumque ad puerum perfectè educandum. Hinc euenit quippè, vt mulier, tum grauida (tertiò, vel quarto mense

menſe tranſaſto), tùm lactans, quò excretioni, & diſſolutioni reſiſtat, multò plura cibaria ſumat, & maiora pocula ſiccet, ſi modò ad perfectiorem partus, & lactatiodebet produci. Quod ſi vel ob ſtomachi imbecillitatem, vel ob iecoris inualiditatem, obſtruſtionemue, vel ob delicatulam naturę complexionem nec tantũ poteſt mulier alimentũ ſumere, nec tantum gignere ſanguinem valet, hinc abortus, hinc variandarum Nutricum neceſſitates quotidie à patribus familias perſentuntur.

Vnde quæſo tot factuum ſpontinæ deperditiones, tot fatantium demacrationes, tot ſæcundarum imbecillitates, & ſeneſcæ præcoces, niſi à nimia ſanguinis, & ſpirituum iactura? Alioqui ſi robuſta ſit mulier, quantò magis ex ea ſanguinis ſugitur, tantò magis (largiori ſumpto cibo) adaugetur, & ſanguinis procreatio: hepar enim, ſi validum ſit, quicquid ei ſurripitur, à ventriculo rapit, & attrahendo reſundit, vſque quò poſſit: Natura ſiquidem proportionatas inuicem, & conſentaneas hepatis, & ventriculi actiones conſtituit, itaut in ſano corpore, quantum coquit ventriculus, tantum & (ſæcibus detractis) recoquat hepar, & e contra.

Neque tamen putent Iuniores, inirandam ſanguinis quantitatem ad factum augendum, alendumq; requiri, quin poſſit à mediocri complexionem ferri: Nam hinc ſupponendum eſt, ſanguinem ſuauiſſimè, & ſine ſpirituum iactura, ac ſerè furtim à factu rapi; nullam, vel pauciſſimam in factu ſequi reſolutionem tùm ob quietem aliti, tùm ob interdictum aeris acceſſum (hæ autem duæ cauſæ ſunt in corporibus præcipuè diſſoluentes, motus, & aer), modicaq; excrementa ſciungio attrahæ benignioris materiæ, puritatem. Sed quod omnem amouet lapidem, quæ maior ratio, cur poſſit mulier ſufficere alitioni ex lacte, non ex ſanguine? qualecunque enim ſit, vel ex chylo, vel ex ſanguine lac, eadem erit materia vel ſanguini dempta, vel ipſi denegata, vel ob deſluxionem ad vterum intercepta.

Ad tertium dicitur, nec de futuro conceptui alimentum, menſtruo ceſſante; quia alius ſupereſt in venis ſanguis, qui menſtruo ſemper ſuccedit (nec enim alterius à reliquo ſanguine generis illum eſſe, putandum) & à genituræ vi trahitur, cui nec plurimus in principiis erit opus; Nec ab adueniente menſtruo obruendam fore: quia conceptus ipſe ora vaſorum occupat, nec plus admittit, quam ſibi ſit neceſſe. Alioqui idem, imò maius eſſet periculum, ſi chylo deberet al: niſi enim aduenienti ſanguini via præcluderetur, ſuffocaretur certius embryo, illius nihilò in alitionem conſumpto.

Ad quartum dicitur, imò ex antiqua opinione optimam reddi rationem, cur facta conceptione, ceſſent menſtrua, dicendo, id euenire tùm ob iam dictam vaſorum à genitura viſcida factam obſtructionem; tùm ob totius conſtrictionem vteri, & per conſequens oris, & vaſorum eius; tùm ob conſumptionem ipſuſinet ſanguinis etiam in primis menſibus in quantitate conſiderabili, & ſerè menſtruo æquali: tunc enim non

Solutio reſtium argumentum.

Solutio quantum argumentum.

ſolùm

solum embryo, sed & secundinae, & ex secundinarum vasis vmbilicalia quoque vasa formantur, itaut, etiam si paruitas embryonis paululum paululi exquirat, inuolucrorum multiplicitas sanguinis partem absumat. His alia additur ratio, quod tunc grauidae appetentia minuitur, & fastidia incipiunt (vt sentit *Hipp. lib. 5. aphor. 62.*) & vellitationes, aut picæ succrescunt, vnde & minus sanguinis gignitur; quæ omnia è contrariis esse deberent, si fœtui, vltra matrem, chylus expulceretur. Contra verò, si noua teneatur opinio, non sic promptum est rationem quadrantem reddere: vtcunque enim dicatur, diuerſi materiam gignendo sanguini aptam, quid dicetur de genito, de subito fluxuro, vel de actu fluente? vbi, & cur restitabit? quæ causa chylo iter mutabit? quæ ipsi ratio, qui motus, quæ noua attractio, vel impulsio insurget? quid valitura erit vteri naturæ mutatio, quæ non subito fit, ad affluentem, & iam confluentem sanguinem compescendum, chylum verò alliciendum?

Solutæ
quintum argu-
mentum.

Ad quintum dicitur, rationem contrariam esse quidem verissimam, sed suppositum omnino falsum; maior enim multo sanguinis redundantia, (quicquid de excrementis aliud dicendum sit) quatuor primis fœturæ mensibus in matris corpore extat, quam vltimis; cuius indicia corporis grauitas, ac segnities, venarum turgor, inappetentia, sanguinis è naribus eruptiones, & nonnunquam ex vteri ceruice, capitis dolores &c., quæ omnia, vel plura in principiis enata, exinde (si fœlix succedat fœtatio) paulatim cessant, & contraria aſurgunt. Illud autem maioris redundantia postremis mensibus enatae argumentum à lacte desumptum, leuissimum est; cum arguat quidem maius fœtui superflium alimentum ob eius validiorem vim, à Cauæ germinibus validius attrahentem, ad mammas deponi (cuius signum est, hæc primò post partum exiens aliquo modo vitiosum esse): non autem copiosiores sanguinem in toto corpore retineri; sed contrarium potius esse, vt indicat matris extenuatio, oculorum liuiditas, & virium languor; Sicq; intelligendus venit Arist., & cum eo omnes alij, qui in similem causam lactis generationem referunt. Quod si aliquando ad venæ sectionem, vt præcaueatur abortus, confugere sit necesse, quis vnquam vltimis mensibus, & non primis (ni morbus aliquis subsit) ad hoc illam laudabit?

Solutæ sex-
tum argumē-
tum.

Ad sextum dicitur, inualidam nimis illam esse Autopsiam, cuius nomen tam crebro inaniter ab his chyli fautoribus vsurpatur: ei siquidem tot fide dignorum Auctorum antiquissima solidissimaq; repugnat Autopsia, per quam statuitur, à venarum, arteriarumq; matriculæ osculis venas, arteriasq; per placentam in totum secundinarum ambitum produci, & ab ijs tum venas, tum arterias vmbilicales sanguine scætescentes in embryonem insinuari, ipsiq; alimentum deferre. Sic statuunt *Aristot. lib. 2. de gen. ani. 5. in principio, & Auer. in comm. Gal. lib. de format. fœt. cap. 2. Vesal. lib. 5. de corp. hum. fabr. cap. 17. alijq; permul- ti Hippocrati innitentes, qui lib. de ossim. part. loc. cit. asseruit, vmbilicum infantis vtero adhærere. Quibus & euentuum ratio applaudit; cū*

in violentis abortibus sanguinis ingens copia sequatur, quod non esset, nisi vasa sanguinea fœtui inhiarent, inuolucris continuarentur, & ob violentiam vniò dipelleretur. Quinimò, & in plurimis partibus aliqua sanguinis plus vel minus portio vna cum lochijs exit, & ad aliquot durat dies: vndenam ergo, nisi ab hiantibus adhuc sanguineis vasis? His fauet Bartholinus ipse, qui lib. x. *Anatom. reform. cap. 36.* manifestè tradit, venas vteri sanguinem in placentam ferre, & ab hac vmbilicū eundem sanguinem ad fœtum nutriendum ferre, quod pluriès dixerat cap. 28. Ostendant nunc aduersam tuentes opinionem, sic esse de suis lactiferis vasis, & quomodo fœtui implantentur, & quomodo alimentum ferant: quicquid enim de alio succo ad placentam veniente comminiscuntur, imaginationis potius, quàm rei, specimen præfert.

Soluitur septimum argumentum.

Ad septimum respondetur, commentitium esse, quod de lactea substantia, conceptaculis omnibus vteri adhærescente, asseritur, nec tot Anatonicis, qui grauidos vteros conspexere, notum, qui solum concedunt, aliquid phlegmatis, mucij, pinguedinis, & feri, tum in vteris reperiri, tum fœtus ambitu hæerere, tum à partu excerni. De Laurentij autem testificatis dicendum est, illum forsan in hoc falsum esse, putantem, quicquid album visitur, vel exit, chylum, seu lac esse, vel ex his fieri; nil curando, siue lentum, siue fufum, siue crassum, siue tenue, siue pallidum, siue candicans illud sit; quasi lac sit quoddam genus, omnia alia præter sanguinem comprehendens, vel in similia degenerans. præterquàm quod à raro contingentibus doctrina seria non sumitur. Hoc vnum scio, quotquot puerperas interrogauerim dixisse, solum serum primum omnium in naturali partu excerni, (aquæ ruptionem vulgo vocitant), dein puerum excuti, inde secundas, cruenta lochia, ac sanguinem; postremis verò diebus ichores, mucositatesque exire. Variant quidem hæc non raro ordine, quantitate, & qualitate varijs de causis: non eò tamen, vt adhuc vsque lacteum audierim, vel viderim à quaquam exiisse humorem. Semel tantum in vrinis fœtantis febre longa detentæ per plures dies obseruavi similem lacti sedimen copiosum adfuisse (quod & in Viro febricitante vidi) cuius originem crudis crassiq; humoribus in venis affluentibus semper adscripsi; quod confirmauit euentus: quamuis enim illa ritè; & vitalem, superstitemq; puellam deinde pepererit, ipsa tamen tandem ex longa illa febre occubuit. Quinimò, si Hippocrati lib. 3. *aph. 45.* creditur, in quibus vteri acetabula sunt plena mucoris, abortus periculum indici potest.

Soluitur octauum argumentum.

Ad octauum dicitur, si quid vel post partum, vel ante, vel alijs temporibus albumini oui simile per vuluam exit (quod non semel euenit) longè à lactis natura distare tum consistentia, tum colore: cum lac magis album, crassiusque sit, minus autem lentum, minusq; lucidum: illud verò vel non nisi pituita est, quæ ibi ex alente crudo sanguine remanet, & vtero vasisq; ob partum hiantibus exit, aut à corpore cacothimo in cloacam secer nitur, indeq; ore ad tempus relesato, egreditur;

tur; vel quicquam à spermaticis patibus elabescens: Dicerem enim, sperma aliquando esse, si vel gonorrhæa detineretur mulier, vt & viri solent, vel longo tempore ob viduitatem, aut aliam causam retentum semen, illa vteri deplendi occasione nacta, proflueret; aliquando verò pituitositatem ab iisdem, & cæteris vasis elabentem. Quicquid autem sit, distat longe ab oui albumine lac, nec ab vno ad aliud rite infertur.

*Soluitur no-
tum argu-
mentum.*

Ad nonum dicitur, Analogiam illam esse penitus fictitiam; cum ad placentam non quidem à corde fœtus exire sanguinem, sit asserendum, sed benè inde à venis vteri trahi, vt per vmbilicum ingeediens ad iecur eat, inibi à aliqua cruditare vindicandus, & ad vniuersas partes deuehendus. Neque illa analogia necessaria ex tat, imò esset iniqua: quia sicuti exterius aliud est infantis, aliud adulti alimentum; ita rationi consonum est, proportionatè aliud embryonis, aliud pueri nutrimentum esse, vt superius quoque diximus.

*Circulatio
sanguinis in
fœtu refel-
gitur.*

Ad quid autem sanguinem exire à fœtu, putandum, vt iterùm innoteat? Et quæ ratio alia dabitur alimentis à matre in fœtum adeptis, nisi dicamus, vel illud à fœtu trahi, vel ab vtero propelli, vel vtroque modo adigi? Vtuncque verò sit, quomodo duo simul contraria à fœtu fient? vt hinc trahat, illinc foras emittat? Vnde alio, si tantum, vel maius esset id, quod per arterias exiret, quàm quod per venas remearet? etsi enim venæ arterijs ampliores sint, celerior tamen in his motus. Præterquàm quod circulationi matris repugnaret circulatio fœtus, si matris arteriæ in arterias pueri debilioris impellerent, venæ autem illius ab huius venis reducerent, vel è contra. Sed & quis circulationi in fœtu statueretur finis? non sanguinis in extremis ab ambiente refrigerati, vel ob cordis distantiam incrudescens recalcactio, vel recoctio: quia, vndeque ab vtero matris amplexus, ab aere fœtus vindicatur, & vbi à proprijs visceribus distet, matris magis viscera calidiora tangit. Non vt alantur partes; quia ad hoc sufficit, tantum ad membra sanguinis deriuari, quantum eis opus est, non superfluum. Non vt pulsui cordis materia suppediret: quia ad hoc mutua sanguinis, & spirituum à corde, & arterijs ad venas, & ab his ad illa confluxio sufficit; sanguis verò solus potius liberam reciprocationem dyastoles, & systoles impediret.

*Soluitur deci-
mum argu-
mentum.*

Ad decimum dicitur, aliud esse serum, aliud lac, nec vbi serum, ibi lac successurum: alioqui & ad renes, & ad vesicam magis, quàm aliò lac colligeretur. Quinimò & in sanguine contineri, & ab eodem serum effluere, certissimum omnibus est: & lac verò solummodò hoc mammis dari (vbi illud cernitur) vel etiam alijs glandulis (vbi supponitur), non alibi, rationi congruit: Ergo serum illud in vtero prægnante coaceruaturn supponendum est à sanguine ad embryonem attractio superesse, & per vrinaculum vmbilicarem, vel per fœtus pudendum inter ipsum fœtum, & membranulam amnion excipi, prout Anatomicis hucusque placuit. Nec dubium, quod ab eo erodi possit cutis, tùm ob benignitatem attracti sanguinis, ab infantis hepate vterius percolati,

& à bile seiundū; cum ob sordes illas, quæ cuti adhærent, in grandioribus seu adultis per lotiones, & indusia detractas; sic docente Vesallio loco supra citato. Ergo ex illius feri aduentu (vt iuvat repetere) melius sanguinem illuc fluere solitum, quàm lac adesse, ac suggeri, arguetur.

Ad undecimum brevis est responsio, admittendo, eandem esse lactis materiam, & ex qua alitur fœtus. Ideo cum superius probatum sit, lac ex sanguine fieri, sic etiam concludendum videtur, fœtus alitionem ab eodem provenire.

Solutur vndecimum argumentum.

Ad duodecimum respondetur, quod, si ab interpretata Hippocratis, Aristotelisq; opinione teneatur, cum per eam admissum sit, fœtum in utero, vltra umbilicale alimentum, aliquid etiam lactis substantiæ postremis mensibus degustare, clarum est, cessante in eius natiuitate umbilici officio, remanere solam exsuctionem lactis iam ex parte assueti: Si verò strictim sanguine solo per umbilicum attracto nutrirī, existimetur, non inconuenire, sicuti mutatur agens, seu attrahens, ita & mutari obiectum: Umbilico igitur, qui vena, arteriaq; constat, adæquatam obiectum fuit sanguis; ori autem, in quo gustus instrumentum residet, magis adæquatam lac erit, vtpotè quod tepidius, dulcius, sineq; alia exuperante qualitate, prout è contra sanguis calidior, asperior, & alicuius acrimonix non omninò expers, quiq; e vena emissus, etiam in ipsomet corpore calido concresecit, & venenositatem quandam induit, vt ex typhothimijs, & cordis passionibus, in huiusmodi casu euenientibus, constat. Natura itaque magistrante, fuget quidem lac puer, non fuget sic sanguinem; vltra quod nec mulieri data papilla est, per quam sanguis, vt lac, possit emulgeri. Nec alio doctore opus habuit puer, cum & pullus sciat miluum fugere, passeres sequi; granum, & milium mandere, zizaniā deferere. Et quis puero risum gemitum, ploratum, respirationem indicauit? horum verò nullum antea in utero exercuisse credibile est, quamuis vix emissus spiret, ploret, gemat, rideat. Sed quid plura? Etiam plantæ sibi congenium trahere succum sciunt, & vbiis non aditus potius emoriuntur, & arent.

Ad decimumtertium dicitur, etiam si quid in ventriculo, tenuibusq; intestinis chylo simile reperiri, donetur, illud non chylum reuera, nec lac, sed vel superfluum quoddam alimenti esse illarum partium, vel potius excrementum eius, quod per venas mesaraicas è iecore trahi, superiori cap. 5. monstratum est. Quod bilis in felle, & serum in vesica adsit, certissimum esse signum secundæ coctionis, quæ sit in hepate, libenter admittimus; illud enim non esse omnino otiosum decebat. Et quāuis sanguis ei offeratur, è quo immediatè ali possit; nō tamen adeo perfectū illum à matre venire, arbitrandum est, vt aliqua non egeat iecoris expolitione; idq; tribus de causis, & quia sanguis muliebris viriliter crudior, & quia qui ad uterum venit, nō omni vitio caret, & quia is in utero, ob huius excrementosam naturam aliquo modo conspurcatur; Et sic

Solutur decimumtertium argumentum.

quid bilis, seriq; fecerini, est necesse, alias multò copiosiorum, si lacte aleretur infans, vt dictum est. Quod item in mammis pueri lac insit, sicuti & in thymo, pancreate, glandulis alijs, lacteisque vasibus; cum illud sit earum partium alimenti superfluum, non mirum, si partibus producentibus, quamvis alantur sanguine, simile fiat: quicquid enim gignitur, gignentis simile gignitur. Quod quidem negari non potest: alioquin eisdem suamet positio redarguet: qui enim ex chylo, ex lacte, ex semine fieret sanguis? Hæc autem dicta sunt in patrocinium sententiæ communioris: Nam si altera Hippocratis teneatur, omnia hæc subito cadunt obiecta.

Solutio de-
cimæ quar-
tæ argumē-
tum.

Ad decimum quartum dicitur, ideo vtero gerente, lac in mammis colligi, quia sanguis fluere ab vtero solitus, retinetur, ideoq; in mammis, quæ illi ita celebriter communicant, & ad excipiendam redundantiam videntur enatæ, deponitur: nec tamen probum gignitur lac, dum sanguinis ad eas delati pars melior in fætus alitione consumitur; melius inde gestationis progressu euadens ex suæ in minera moræ longitudine, & mulieris ob cor additum infantis aucto calore, & pinguiore aliqua succi parte illuc ab extento abdomine expressa iuxta iam dicta Hippocratis distamina.

CAPVT NONVM.

Tot exempla Neoteriorum à brutis sumpta non valere in hominis vterino alimento statuendo, monstratur.

Videretur sanè ex præmissis, optimè omnibus cōtrarijs argumentis satisfactum, communisq; & antiqua de fætus alitione stabilita opinio: Sed quoniam passim Deusingius, Harueius; ac alij illorum Affectæ, vt concludant, fætum humanum in vtero lacte, vel chylo solo pasci, ad hoc vtuntur exemplis aliorum animalium tùm quadrupedū, tùm volatiliū, tùm reptiliū à quorum dissectis grauidantibus vteris, vel ruptis ouis fætantibus, & lustratis omnibus, venantur, vel venari imaginantur talem illorum alendorum materiam; Idèò hic quàm malè, & in his determinandis, & in sanguinis officina statuenda tali argumento adeò innitatur, monstrare, operæ prætium duxi. Aliquam scilicet analogiam, & seu genericam alitionis formam inde desumi, nō inficiabor quidem (, cum communis omnibus vegetatiua anima insit): at specificam, vel indiuidualem indidem alendi materiam argui, constanter nego. Vtpotè.

Exemplum
brutalis ali-
menti ad hu-
manum, esse
incongruum,
ratio prima.

Si cuique speciei data est aliqua in pluribus peculiaris differentia multò magis cuique generi: aliud autem homo est, aliud sensibile animal, aliud planta: Hæc siquidem tria animarum præcipua genera ponit Philosophus, eoque ordine inter se disposita, quod perfectius imperfectum quidem sub se continet, sed perfectiori modo dispositum: aliam

enim

enim videmus plantæ aliam animalis alitionem, alia instrumenta, aliam electionem. Initio itaque sumpto ab hominis dignitate, non valde circa hanc dilatabo ratiocinationem meam, cum quisque libenter concesserit, hominis conditionem supra omnium aliorum animantium naturam adeo præcellere, ut non immerito illorum Dominans à Deo fuerit constitutus: Illius namque rationalitas cæteris cunctorum viuentium dotibus sola præfulget, & diuersam adeo constituit prærogatiuam, ut sicuti animalia plantis, ita homo cunctis animantibus præferatur, & diuersi generis constituatur. Sicuti igitur deforme esset animalium alimentum succum merè terreum statuere, propterea quod plantæ cum quibus illa communem habent animam vegetantem, eo nutrantur; ita non minus inconuenit ab alimento brutorum ex eo, quod communis utrique sit anima sensitua, hominis alimentum conieciare.

Sed & si hominis tum animi mores, tum corporis temperaturam perpendamus, talem, & sic excellentem mediocritatem in omnibus seruare comperiemus, ut non iniuria sit velut linea recta, iuxta quam obligis omnibus norma præbetur: Ad illius namque benignitatem, pietatem, amorem, patientiæquæ cætera comparata animantia vel minus, vel magis talia nuncupantur; sicuti, & ipsius temperiei respectu animalia alia, & plantæ ipsæ calidæ, vel frigidæ habentur. Idem de accidentali illius forma aliorum animatorum respectu dicendum: gratia enim, pulchritudo, mollities carnis, membrorum proportio, corporis dispositio, aliarumque; externarum qualitatum fulgor sic aliorum sensibilibus accidentibus præsidet, ut non minus hæc illis, quàm his plantarum figuræ, & dispositiones corporeæ cedant.

Hinc mirum non fiat, et iam si gratis concederetur, cætera animantia in utero, chylo, lacte, pituitositate, vel alio his analogo, succo nutrirî, (quid enim de his, quæ foris sunt, pensitamus? Veterinarijs remittantur) hominem sanguine purissimo ali. Quæ varietas rationalis quoque esset, ut scilicet temperamento alii corresponderet alimentum, utque Genitorum animæ naturalia quæque; femina à primis suis natalibus imbiberet homo: qui enim mores hominis homo, & matris filius retineret, si ex chylo illius nutriretur, & auferretur? Quam cordis sympathiam, naturalemque; morum similitudinem secum vehet chylus, qui è ventriculo per mesenterij ductulos procedat? Dicent, à Corde spiritus ventriculo impariri: Sed spiritus tenuissimus, aereusque cum sit, facillimè dissoluitur, ut non possit morum symbolesitatem imprimere, ac permanentem efficere.

Hanc autem varietatem vterini alimenti verisimiliter adesse, vltra allatas rationes plura arguere possunt. Primò nutritionis exterioris diuersitas: nam quamuis terrestrium animalium multa in sui ortus principio lacte pro cibo utantur; plurima tamen, & omne volatiliū, & aquatiliū genus (præter Delphinum) sine lacte aluntur, ac viuunt: transactis verò in cunabulis, quàm rudiore tum cibo, tum potu cætera quoque

Ad idem ratio secunda.

Vasleratem humani, & ferini alimentum in utero multa arguunt, de primò externi cibi diuersitate.

Mammarum
firus, & nu-
meri varietas

quoque lactifera nutrianur, quàmque ijs delicatioribus, quauè arte tùm coctis, tùm fermentatis, conditis, & contritis iisdem vtatur homo; cuique patet. Secundò diuersitas situs, numeri; mammarum: nam hæ in cæteris animalibus, præter simiam, & paucissima alia, propè vterum, mesenterium, & pubem implantantur, itaut facillimum sit à ventre aliquid per inconspicuos ductus, vel porositates in ipsas eructari, sicuti, & ab ijs per anastomoses, & canaliculorum communionem aliquid lacteæ substantiæ in vterum deriuari: atuerò mulier mammæ habet in pectore per septum à ventre seiuncto, quarum ideo venæ à superioribus, nempe axillaribus, & Cauæ ramis trahunt originem, solaque aliqua anastomosi, & connexione cum vteri venis communicant. Item, & plures multis brutis mammæ, binæ autem mulieribus insunt, & sic in illis copia maior lactis. Tertiò diuersitas materiæ ante conceptum in matricem prouenientis, ac ab ea ob superfluitatem exeuntis: nulla enim alia animalia præter mulierem rubra, & sanguinea menstrua habent, vt docet *Alex. Mussar. lib. 4. præf. Med. cap. 1.* nam si aliquando aliquid ex vtero aliorum animalium exit, mucositas sola, & quid serosum est, nunquam sanguis. Quartò diuersitas fætationis: Omnia enim alia animalia præfinitum à Natura tempus habent vteri gestationis; nempe Equa duodecimo mense, bos decimo, sus tertio, canis secundo parit &c.: Mulier autem, & septimo, & octauo, & nono, & decimo parturit mense, vt idem *Massar. ex Hippocr. & Aristot. tradit citato lib. cap. 11.* Quintò diuersitas vteri, & vasculorum eius: nam si Vesalio oculatissimo Anatomico creditur, ls *lib. 5. de corp. hum. fabr. cap. 16.*

Diuersitas
materiæ, per
tempus an-
te concepti
excentis.

Differentia
temporis vte-
ri gestatio-
nis.

Differentia
vterorum, &
vasculorum in
eis existen-
tium.

studiosè inquirens, quid de acetabuli nomine intelligatur, dicit, se in oue prægnante varios in superficie vteri sinus adinuenisse, in quidam semiglobuli eminebant, ac si pisæ dimidium agglutinatum esset. Idem & in Vacca, capra, ac Cerua obseruasse, scribit. Multiplices quoque tùm arterias, tùm venas suis sinibus in hæc capitula ex tubercare, ac conceptus tempore illa tubercula aperiri, semenque amplecti, & vasa umbilicalia in fætum exporrecta efformare, tradit: frustra autem (inquit) in muliebris vteri cavitare tubercula illa, quæ subtilia, & dimidiata, pisæ simillima esse diximus, indagabis: cum illa his penitus non donetur.] Insuper (subdit) in muliere, quæ non ita pridem concepit, in cassum sinus illos, quos coxendicis acetabulo conferebam, inquires: quod non solum hinc conijcio, quia non prægnantium mulierum vteri illis tuberculis prorsus expertes sunt, sed quod per refectionem in muliere fuste à marito intersecta, & quæ non multò ante conceperat, id etiam didicerim.] Sextò diuersitas exeuntium post partum: Vix enim videas mulierem sine sanguinis effusione parere, & cui non per aliquot dies rubra puerperia durent, multòque magis si violentus partus, vel abortus superueniat; signum, sanguiferas recludi, & dehiscere venas: At alia animalia, solo seroso humore, vixque rubra mucositate cum secundina excretis, nil aliud inde, nisi aliquid visceri per paucos

Differentia
tuberculum
post partum.

paucos dies excernitur. Septimò diuersitas respectu fætus excundi modus: nam puer adhuc integro cum vmbilico secundinis continuato, & sanguinis non ex parte exit, vt illum rescare, & alligare sit necesse, adeo vt inuenti infantuli sint, qui ex neglecta ligaturæ integritate sanguinis copiam excreuerint, & post aliquot dies de vita periclitati sint, prout de infantula Alicis nata mihi certè relatum est: At aliorum animalium vmbilicus ex seipso seiungitur, nec vllò vt plurimum opus habet ministerio, vel ligatura. Item & secundinæ nonnunquam mulieris adhuc vtero alligatæ cum magno ipsius periculo retinentur.

Differentia enutriendi modi, in pueris, & brutis obseruati.

Quantum autem diuersitates illæ diuersum quoque humani fætus à cæteris alimentum persuadere possint faciliè cuique vel leuiter in naturalibus experto patebit: De prima siquidem non est dubium: nam dum ab exterioribus, & visibilibus faciliè in interiorum, & inuisibilium cognitionem venimus, si sanguineorum animantium tot species lac nò gustant; vinum; aut cereuiam cuncta quoque alia minimè potant; cibos verò plurima diuersos mandunt; solus autem homo tot ciborum, potuumq; cocturis, purificationibus, custodijs, & dispositionibus vtitur; nonne & sic diuersificari in vterina alitione, iustè dubitari potest? De secunda, si proprium lactis gignendi membrum mamma est (quod enim in cæteris corporis glandulis residet, lacti quidem simile quid est, sed non verum lac, cum & dulcedine, & mediocritate substantiæ careat) facilius quidem erit mutua lactis inter mammas, & vterum anadosis, si mammarum prope ipsum vterum, sint, quam si è longinquo. Si verò diceremus cum Hippocr. lac ad fætum veniens non esse mammarum, sed quid pingue ab omento, & dulcissima sanguinis parte expressum, id quoque facilius veniet si mammarum super ipsum omentum sint, quam si procul; Eademq; vigeat ratio, quando per lumbares ductus veniret, vt Deusingij Pars supponit. De tertia satis clara est diuersitatis quoque alimenti deductio: nam si ab excretis cognoscimus, quæ, & in quibus partibus exuperent; nullum autem in natura datur superfluum frustra; cognoscimus etiam ex erumpentibus menstruis, in vtero superfluitatem adesse sanguinis ad fætum humanum alendum vtilem, quicquid sit de brutis solas mucositates, & rarè excernentibus. Quarta, quamuis paruum habere vim in intentam differentiam indicanda videatur, non tamen omninò reiicienda, cum ex ijs quoque temporum varietatibus naturæ, sicuti & alimenti, aliqua varietas commonstratur: suum siquidem cuiunque generi datum esse à natura etiam alimenti modum, verissimillimum est. Quinta cæteris ad coniectandum validior: si enim muliebris vteri conformatio, & cotyledonum, vasculorū, succiq; forma ab vteris, acetabulis, succoque brutorum variant, variare simul, & concipiendi, & alendi modum, potest aptè deduci. A sexta adhuc maius descimen arguitur: excretio namque sanguinis in muliere pariente illius retentionem in fætante ad aliquod bonum arguit: Si verò sanguis ad alendum omnium aptissimus iudicatur, quid aliud boni

Quid probet prima diuersitas.

Quid secunda diuersitas valeat.

Quid tertia diuersitas insinuet.

Quid quarta polleat.

Quid quinta importet.

Quid sexta arguat.

arguetur.

Quid septi-
ma concludat.

arguetur, quàm ab eo alimentum subministrari factui? in alijs autem animalibus sint illæ mucofitates vel alimento destinatæ, vel alimento supersint, quid ad nos, qui solum hominem contemplari volumus? ratû autem est, pituitam succum incoctum esse, qui si vterius coquatur, potest aptè alere. Septima tandem nec parùm in indicando varietatem supradictam valet: nam sicuti in nascente homine umbilicus adhuc integer, secundinis continuus, sanguinis non inops, mollisq; potest illius presentaneum & sive tunc & sive (sanguinem scilicet ad factum vehendi) manifestare; ita in cæteris animantibus illius facilis, seu spontanea seiunctio, sanguinis & coniuventia possunt attestari, eundem tandem inutilem & sive prædictum ob cutis supererescentiam euasisse, itaut tunc factus ore sugere cogeretur.

Si itaque tanta dissimilitudo inter mulierem, & bruta cernitur, quòd vetat, quamvis de his conuinceretur (quod non conceditur) chylum, seu lac ad conceptus alimoniam desiderari, quin sustineatur, humanum factum, uti nobiliorem, excellentiori anima donatum, ac ad egregia genitum, delicatiori ex materia formari, nobiliori; alimento nutrirî?

Communi-
tas vegetan-
tis animæ nil
contra con-
stat.

Neque iterum aliquis hic mihi obijciat communitatem animæ vegetantis, cuius opera videntur in omnibus uniformia esse debere: nam hoc intelligitur circa modum agendi in genere, non autem specificè: instrumenta quippe actionis, & specifica, seu formalia obiecta diverso generi genere diuersa, diuersæ speciei diuersa quoque specie conueniunt. Et sic aliud arbori, aliud animali, aliud homini nutrimentum; aliaq; huius assumendi, coquendi, distribuendi; organa cunctis efformata fuere: quæ tamen analogum operandi modum, sinemq; cuncta habere, patet.

Quantuncunq; autem donetur, etiam humanum factum, uti dictum est, aliquid in fine per os sugere, nam illud chylum esse, credendum? nequaquam, sed potius lac è sanguine ipso in vterinis quibusdam tubulis stagnante, vel à mammarijs venis exporcedum esse, arbitrandum est. Et sic *Lud. Mercat. lib. 3. de steril.*, & *pragn. affect. cap. 19.* putat, sanguinem, quo puer alitur, in vtero quoddam lactis rudimentum accipere. Harueius ipse, qui albo succo factum pasci prædicat *lib. de gen. anim. p. 329.*, & 331. tubulos illos in vtero animalium (hic notandum, non de muliere dici) eminentes, ac conceptui hærescentes plurimis arteriolarum, venularumq; ramulis scatere, vasesq; vteri in carunculas illas definire, & ibi ex sanguine lacteam gigni substantiam, scripsit mandauit. Et licet Deusingio, qui per propria potius vascula ad vterum venire chylum, imaginatur, videretur, ex Harueij obseruatione (quæ Vesalij quoque est. *cir. lib. 5. cap. 1.*) potius concludendum, factum illò ali sanguine, ut & nobis & Vesalio etiam videtur: Attamen pro Harueio quis respondere posset, albugineum illum succum ex sanguine ab illis venis, arterijsq; non excurrente, sed refundante, in illis carunculis, veluti in glandulis generari.

Nisi

Nisi velis melius dicere, si quæ vascula in vtero fæmineo succum quandam albugineum, cuius alio similem continere reperiantur, vasa seminaria esse, quæ à testibus derivata; lacteorum æmula per vteri membranas disseminantur; & per eius latera corruata partim per medium cornu in cavitatem vteri semen effundunt, partim infra os eius illud in cervicem efferunt, ut tradit, & ex Zerbo, Fernelio, Laurentio, & Varolio refert Bartholinus lib. *supra cit.* cap. 27. Cum quibus vasculis, quid mirum, si conceptus aliquo modo communicet? Et hæc forsitan eadem vascula sunt, quæ vellei Deussingius, vel cuperet, pro Lacteis venditari.

Quid sit lac-
cus albus, &
vteri quibus-
dam vulva-
lis cõtentus.

Quamvis autem Aristot., & cum eo nonnulli contendat, fæminas semine carere; id tamen adeo viriliter impognat Gal., & iuxta illius mentem discutit Alex. Massar. lib. *supra cit.* cap. 5., ut nunc omnibus Anatomicis in confesso sit, eas semen profundere: etiam si aliqui falsò opinati fuerint, illud infæcundum esse. Et reuera idem Arist. deberet, & fæmineum semen, & fæcundum facillè ex suis mēt̃ assertis concedere: nam lib. 10. de *hist. anim.* cap. 4. prosequens indiciã aptitudinis muliebris ad conceptum, ab vtero ea petit, sic dicens. Quæ autem circa ipsum, vterum euenire oporteat, hæc sunt. Primum ut in somnis tamquam cum viro coeat mulier, & profundat facillè perinde, ac si concumberet, quod quantò sæpius euenire visum fuerit, tantò melius; utq; surgens huiusmodi interitũ curatione indigeat, quam, ubi cum viro rem habuerit, adhuc confuevit, interdum exsiccatione.] Cap. 5. lato ore sic dixit: Nam & mulier fæcundum semen emittit.] Cap. 7. ut fiat conceptus æqualem maris, & fæmine concursum in semen emittendo desiderari scribit. Ibidem, & cap. 8. fæminas in somnis semen profundere, asserit. & ubi hoc efficitur, aliquando eas subleuari, cum satis multum est, quod superest, aliquando imbecillitari, scribit, sicuti quando cum viro coeunt; necnon et ad conceptionem concurrere; Aues autem fæminas sine mare subuentaneã ova concipere, quia semen intra se emittunt. Et quàmvis id videatur negare lib. 1. de *gen. anim.* cap. 20. aduertatur tamen, rationem, quam adducit, debillimam esse, nam cum dicit, voluptatem, quam in coitu sentit mulier, ex perfricatione partis, & spirituum emissionem provenire, huic experientia repugnat; seminis enim emissio, ut in viro, cum voluptate excidit, & finita emissionem, delectatio cessat. Cum verò dicit, id, quod emittitur, non esse feminalem humorem, sed vteri excretionem, facile visu est; sub excrementi nomine ab ipso semen includi; item quod non nisi in coitu, vel coitus imaginatione, nec nisi cum delectatione illud in somnis exire, observatur. Sed ad quid fæcunditatem illa profusio in somnis facta ex parte mulieris arguet, & concursus in emissionem generationem adiuvabit, si inutile excrementum est?

Mulier semen habet, & illud fæcundum.

Idem et Arist. asserunt.

De his plura possent dici, si res mea hæc esset. Tetigisse tamen volui, breui hac occasione nata, ut colligatur, quid illud aliquando sit, quod

quod ab utero muliebri emanat, qui, alba, simile. Quibus si quis contradicat, & pro Aristotelis contradictione vindicanda asserat, prioribus in locis sub seminis nomine intelligi menstruum, fallitur; quia ibi de humiditate agit, quæ similis sit, ac si mulier cum Viro concumberet, & in lib. de gen. anim. se solum tuetur cum hoc, quod sit excretio uterina.

CAPVT DECIMVM.

In fetus conceptu cum semine non chylum, sed sanguinem requiri, probatur ulterius.

HActenus de fetus alicione uterina egimus, quam, nisi me mea fallit affectio, ex sanguine fieri, vel si quid minimum in fine gestationis de lacte exquiratur, hoc quoque e sanguinis gigni, satis superque probatum, & confirmatum est. Nec de conceptu quædam generaliora tacuimus. Nunc de hoc specialius disquirendum; Innata enim est nobis via (ais *Arist. 1. Phys. 2.*) à notioribus nobis ad notiora naturæ procedere. In quo quidem conceptu eum duo, præter formam, & finem, necessario exquirantur, unum scilicet, à quo principium motus, alterum ex quo fiat, seu circa quod versetur actio, nempe materia, sepositis ijs, quæ ad Medicam facultatem parum, vel nil facere videntur, hæc duo hic nunc quærimus; nunc scilicet ex sanguine, & semine fetus generetur, ut hucusque à Peripateticis, Medicisque ferè omnibus tentum est, & ut in anterioribus non parum tetigimus, necne; Alterum ex quo semen ipsum in animante gignatur: Neque enim in Antiquiorum dilucidationibus acquiescere Iuniorum natura suffert; sed nova semper appetens, etiam vetera in hoc invertere, & noviora adducere festinat.

Fuit circa hæc quæstio celebris inter Aristotelem, & Galenum, an sanguis muliebris solius materiæ, semen autem solius principij à quo in generatione hominis munus obiret, an verò simul, & semen, & sanguis præter efficientiam in materiæ etiam officium intrarent, Aristoteles siquidem priorem sententiam patrocinatus, merum efficientis vivus virili semini attribuit, materiale autem sanguini menstruo assignavit: Sed Galenus notiori ab evidentia demonstratione usus, credidit, & erudiuit, semen utrunque esse quidem principium efficiens, sed & simul materiale, ex quo solidæ partes distæ, & vasa præsertim spermatica constant; sanguinem verò nec materiæ solius vires supplere, sed & aliquid simul effectui conferre. De qua quæstione, ut lucidissime, & doctissime à multis agitata, sed præcipue ab *Alex. Massar. lib. 4. Pract. Med. cap. 5.* iam supra citato, ne crambem recoquere videar, nolo quicquam dicere sufficiat tantummodò pro instituti nostri ratione annuere, mihi multò veriorum videri Galeni sententiam, qua supponitur, seminis substantiam ipsam in substantiam fetus transire, sanguinem sibi comitem asciscendo, ad multaque peculiariter videndo.

Verum

Verum nunc ultra sentire videntur quidam Neoterici, inter quos forsitan Harueius principem locum obtinet, quem sequuntur Io. Claudius de la Couruee, & Anton. Deusingius, sanguinem cum eo ab huiusmodi functione prorsus ablegare, & eius loco lacteam substantiam substituere conantes: In hoc tamen dissentientes, quod illi lac vltimum quid arbitrantur ex sanguine dimanans, hic vero chylum à pancreate, & vasculis purificatum. Non hic se continet Pallierius in cæteris Deusingium sequutus, sed vterius progrediens, quam ille ancipitem, hic firmam, & asseuerantem protulit positionem, semen è chylo, non è sanguine produci, constituens; vnde videre est apud eum libro nuper edito cap. 22.

Quis Harueij
& aliorum de
conceptus materiæ
sententia.

Pallierius,
semen è chylo
fieri, tradit.

De priori tamen assertione (altera ad sequens caput dilata) in primis nonnulla hic annexenda videntur mihi: pauca tamen, tum quia de ea iam multa superioribus capitibus dicta fuere, tum quia cætera argumenta, quæ pro factus alitione adducta fuerunt, sat sustinent, & concludunt, etiam ad conceptum requiri sanguinem, non chylum: Nam si quod minus videtur inesse, inest, ergo; & quod magis, minus autem naturæ opus est alitio quam generatio: Si ergo ad illam non chylus, sed sanguis requiritur, ad hanc idem erit, & magis.

Quæ de factus
alitione dicuntur, de
conceptu etiam
valent.

Vbi autem hoc propter aliud non conuinceretur, ex eo saltem videretur prorsus euincendum, quod sanguis nimirum animæ sit sedes præcipua, & proximum ad omnes actiones obeundas instrumentum, cui spiritus tum viuifici, tum naturales implantantur, ac indistincti inhærent: chylus autem, vt cunque per glandulas, & strictos aditus percoletur, semper quid frigidum est, & serosum, non alitioni immediatæ solum, sed & conceptui quoque ineptissimum, quoadusque per hepar transiens, & in sanguineas venas defluens arteriaci sanguinis per mutuas venarum, arteriarumque anastomoses spirituositatem foueatur, & ad viuificandas actiones aptus constituatur. Tunc verò sanguis est, non amplius chylus: nam hepatis mæandros prætergressus, priorem formam amisit, nouamque purpuram indutus, vniuersale alitionis, & generationis imperium est assequutus. Propterea, quicquid de alijs esset animalibus (de quibus tamen idem sentiri, fas est), saltem in hominis omnium animantium Reguli productione non chylum quidem, sed sanguinem à Deo deputatum fuisse, quo naturales animæ influxus omnes sic intimius genitæ intruderentur proli, constantissimè tenendum.

Sanguinis eminentia
supra chylum
eadem conceptum
hominis acit primo.

Et hoc insuper inuictissimè roboratur ab irrefragabili illa magni Coi Autopsia circa mulieris genituram dierum sex, quæ cuique panditur lib. de nat. pue. num. 4., quamque ad verbum refert, & fusè explicat Gal. lib. de fet. form. cap. 1. 2., & 3. Erat autem (ait ipse) velut si quis ouo crudo externam testam circum circum adimat; in interna verò pellicula inclusus liquor pelluceat. Modus quidem talis erat, & vt abundè dicam, ruber erat liquor, & rotundus. In pellicula verò fibre quædam albæ, ac crassæ inesse videbantur cum cruore crasso, &

Ad conceptum
requiritur
sanguinem.
probatur Aulopis Hippo.

, rubro obuolutæ : circum autem pelliculam foris cruenta vestigia
 ,, instar sugillatorum &c.] Quæ Autopsia veracissima cum sit, quid
 poterunt dicere Nepterici, ab ovo pulli ad hominis generationem ar-
 guentes ? Tunc ne cor, formatum iam esset, & sanguinem funderet ?
 Manifestum, quod non, & tamen ruber ille liquor intus, & in pellicula
 cruor, & extra ipsam signa cuoris erant. Ex rubro autem illo globulo
 non cor solum, sed & hepar, & cerebrum primò omnium erant fabre-
 facienda, vt clarissimè ibidem inquit Gal., ac nouissimè Galtruccius in
 sua *Physica particul. disput. 3. cap. 2.*

Probatur e-
 tiam autho-
 ritate Theo-
 log. Port. &
 Historiogr.

Addatur his auctoritas Theologorum, qui Christi conceptionem
 memorantes, non lac, non chylum, sed sanguinem Mariæ purissimum
 (Spiritus Sancti obumbratione efficiente) pro materia ex qua propo-
 nunt. Poetæ item, & Historici omnes alicuius genealogiam proferen-
 tes, semper ad sanguinem recurrunt, & stirpis communionem consan-
 guinitatis nomine, insigniunt; pro quo plura ex Ijs possem citare loca,
 nisi vereretur frustra cartas implere.

Idem proba-
 tur ex Salo-
 mone,

His & sacræ paginæ acclamant, dum Salomon in sua Sapientia cap. 7.
 ,, Se in ventre materno, carnem figuratum, decem mensium tempore
 ,, in sanguine coagulatum, ex semine hominis, & delectamento somni
 ,, conueniente appellat.

Respondetur
 auctoritati
 ex Iob à Pal-
 lierio citatæ.

Ex quo loco clarè patet, dictum illud *Iob. cap. 10.* ad huius nostræ
 communis opinionis contradictionem à Pallierio adductum minimè
 valere; quod melius adhuc constabit, si illud intimius consideremus.
 ,, Nonne (inquit ibi Iob, Deum alloquendo) sicut lac multisti me, &
 sicut caseum me coagulasti ? Ex quibus verbis, è lacte hominem fieri,
 deducere vellet Pallierius: ibi autem non materiam, sed formandi mo-
 dum Iob annuere, habetur ex Isidoro Clario in cominen. his verbis:
 ,, Hic graphicè formatio hominis describitur; comparando scilicet
 ,, semen lacti, quod funditur primò, & deinde semen conceptum coa-
 ,, dunatur, vt concipiendis membro um lineamentis sit commodius.]
 Et equidem ibi Sanctum Iob non de substantia ad conceptum requisita,
 sed de modo, quo fit conceptio, loqui apparet ex illa dictione [sicut]
 addita verbis actiuis [multisti, & coagulasti], vt ionueret scilicet simi-
 litudinem actionis, quæ magna, & palpabilis est: Sicut enim emulgetur
 è mammæ papillis lac, indeq; in vase opportuno, vt caseus fiat,
 coagulatur; ita à turgente vtero quasi emulgetur è Viri membro semen,
 & in se receptum comprehenditur, coagulaturque à nativo eius calore
 in sanguine, vt inquit Salomon. Quod si contendat ipse, illam dictio-
 nem sicut non ad verba illa actiua, sed ad nomina [lac, & caseum] re-
 ferri, itaut similitudo materiæ non actionis ibi indicetur (quæ tamen
 non sic congruit); Sciatur, hoc illi in nullo prodesse, tum quia similitudo
 substantiæ arguit non identitatem, sed similitudinem originis, & sic
 sicuti lac est alimenti superfluum, ita & semen: sed illud mammæ,
 hoc testium; tum quia etiam si deduceretur identitas originis, vt supra
 abundè

Vera illius
 Iobi interpre-
 tatio.

abundè probatum est, lac e sanguine fieri, ita & semen ex eodem esse, infra statuitur: Cum his verò nec sanguis à concursu, & adiutorio minime arcetur, qui per alteram superiore sententiam clarè admittitur.

Urget autem opinionem hanc de conceptu nostram, & magnum ex eodem Pallierio obiectionem affert, quod sanguis menstruus prauis qualitatibus videatur esse imbutus, vt deducitur ex quibusdam prauis, & ferè venenosis effectibus, qui de eo referuntur à Plinio, & à nonnullis vulgaribus facillimè creduntur: nam in hanc causam præcipuè reduci solet exitus variolarum, vel morbillorum cuique mortalium communis, & non raro perniciosus: Quare videtur absonum supponere similem materiam esse conceptioni proficuum.

Huic obiectioni respondetur primò cum Galtruechio in sua Physica *part. disput. 3. cap. 1.* menstruum esse optimæ notæ sanguinem (quatenus scilicet natura mulieris datur), sola ideo quantitate excedentem, ac superfluum ob illius frigidiorē temperiem, quæ sanguinis alioqui ferax parum, & minus, quam Vir, ex eo dissoluit; Item talem ad congruam generationem requiri. Hinc est, quod, si aliquando sanguis ille sit vitiosus, vt in quibusdam intemperatis, & morbosis mulieribus accidit, vel non, vel vitiosa fiat conceptio, & morbosus fœtus ex ea generetur.

Quod si qui narrentur de menstruo in plantas, herbasq; venefici effectus, vel falsi sunt, vel in corruptionem sanguinis ipsius extrinsecus ab aere factam reducendi; vt enim dici solet, corruptio optimi pessima (& sic videmus quoque sanguinem virilem extra vasatum, si in corpore detineatur, lypothimias, & angores adducere); vel in viciatam omnino menstruantis intemperiem. Variolarum verò, & morbillorum exitus, vel non in similem menstrui malitiam referendus venit, vel non prauitatem, sed solam ebulliendi aptitudinem arguit. Illud quidem, cum non omnibus, non sine influenza quadam epidemica, non eadem ætate, nec semel tantum singulis excitentur: hoc autem; quia, nisi illa epidemia subsit praua, ac pestilens, synocam, eamquē benignam, febrem inuehunt.

Sed quando aliqua menstrui prauitas datur (prout & dari potest) nec ideo à generatione hominis ablegandum esse, dicendum: siquidem in primis illa in vocata placenta, & membranis remittitur; sola benignior pars à valido semine attrahitur; & hepate genito, adhuc expositur, & coquitur vterius; vt hinc pateat, hallucinari eos, qui arbitrantur, embryonis hepar otiosum fore, ni chylus ad id feratur. Præterea huic incongruo ipsa Natura prospexit, cum vt plurimum desinente menstruo, & non nisi in sanis mulieribus, vel conualescentibus, purgatoq; corpore, ritè conceptio fiat, vt sanus exeat infans.

Verum dato etiam cum his omnibus, quod aliquod in eodem sanguine vitium inemendabile, & inuitabile insit, an propterea chylus aptior putabitur? Si in viridi hæc sunt, quid fiet in arido? si chylus ruidior

Obiectionur
menstrui ma-
litia.

Respondetur
primo.

Effectus ex
menstruo prauo
in quam
causam con-
ijciendi.

Quid de va-
riolarum exitu
sentientiū

Respondetur
secundo.

Respondetur
tercio.

rudior est, minusq; defæcatus, quomodo, & cur erit magis à prauitate immunis? Et vnde gratia hæc rudi chylo, quæ depurato sanguine denegatur?

CAPVT VNDECIMVM:

Semen ex puriori sanguinis substantia, non è chylo fieri, probatur.

Ironiæ chylo, ac ventriculo arrogata dignitas ampliat.

Quid nunc autem de semine audio? num & hoc ex chylo immèdiatè gignetur? Equidem cum hoc in doctissimi Physici Opere conspexi, non potui non mirari diuersitatem humani capitis, & ingenij: Et quid hoc maius dici poterat? Cadat nunc è folio suo sanguis, vel pronus assurgens ministro suo salue dicat. Cedat illius purpura incultæ chyli lanæ. Præsit aqua mero, præsit crystalla rubinis. Cor, cerebrum, & hepar iam iam sedeant in antro, & salienti in Thronum Ventriculo assurgant; Nec iniuria, cum hic Rex humani corporis cum Q. Serenio ab eodem Pallierio cap. 16. nuncupetur. Quid ergo Regia valet; si omnes ad Coquinam accurrunt? Et quis Rex alter, quàm qui scit, & valet lautas, sapidasq; cunctis præparare, & exporrigere dapes? Quid adhuc ergo de Principatu vos tres corporis humani Principes simul contenditis, si quartus vltra vos, & ad altiora confurgit? Viuat Ventriculus, qui toti corpori, totiq; Naturæ hominis suppetias affert, & spirituum affluentium sola ope contentus, totum Microcosmum nutrit, regit, omninoq; suo nutu disponit. Sic est: quia sine chylo non viuit homo, chylo aluntur solidæ partes, è chylo lac gignitur, è chylo fætus nutritur, & ex chylo generatio tota descendit; Sedet verò sanguis iners, vel irrequietus circular, quid superfluum, solaq; vigente necessitate aliquid boni ferens. Quinimò nec ferè inorbus oritur, cui non ventriculi affectus ansam dederit, & natiuitatem.

Eidem Ventriculo Ironiæ præfertur Pancreas, & Receptaculum.

Sed cur amabò non Ventriculo Pancreas, venarum lactearum foveas, vel Pecqueti Receptaculum præfertur? quippè in his albedinem, puritatem, splendorem, ac omnimodam nutriendi facultatem (si his statim Auctoribus) acquirit chylus, qui prius è ventriculo facibus mixtus, & eduliorum adhuc aliquo colore tinctus emanauit; Ab his toti corpori (carnibus exceptis) alimentum distribuitur, ab his lac in mammis abit, ab his semen in testes, ac in vterum fætus origo, & nutritio dimanant.

Seria exclamatio.

O dirum fatum, quod nec parci Heroibus. Ergo, & Principibus Coqui, ac depuratores; fontibus emunctoria; Plateis ductus inquinati præcellant? Ita nunc est, quando omnia retrogrado passu incedunt, præpostero modo tenentur. Mittamus ergo nugas.

Improbatur Pallierij sententia de semine gignendi materia.

Equidem, cum de cæteris hucusque disceptatis aliqua verisimilitudo chylum euehat, in hoc de semine nouiter assumpto nullam prorsus adesse, contendo, præter albedinem, quæ videtur ab albo deuenisse; quafi

quasi albi omnes liquores, albaq; corpora vel ex albo fiant, vel illius sint germina. In quo quantum erretur, quiuis facile percipiet, qui minimam naturalium facultatum cognitionem habuerit. Natura enim partium ea est, quæ in sibi similem liquorem ad se delatum conuertit, non è contra. Si sic autem non esset, quomodo ex albo chylo rubeus sanguis fieret? quomodo ex vino rubro, viridi ædulo, flauo melle, & nigro tubere chylus albus exiret? quomodo sanguis tuber in solidis, & carne iterum, albesceret? Et ex albo tandem quomodo nigra cutis in Aethiope, nigra in oculo pupilla gignantur, & aluntur? Sed hæc sunt, quæ Pallierio dura, & inuicilia videntur, cum satis existimet, cuique parti similem à sagacissimo dispensatore porrigi succum. Hoc autem in sequentibus discutietur capitibus. Nunc de semine agendum. Circa quod illud inter nos conuenit, semen esse perfectum vltimi alimenti virtute testium elaboratum, & in proprijs vasculis seruatum. In hoc differimus, quod è sanguine, tamquam materia proxima illud fieri, ego ex Maiorum nostrorum opinione profiteor: ille autem ex chylo. Hoc darem, si sano modo sumeretur, nempe ex chylo sanguinem, ex hoc lac, semen, & humidum radicale produci, ac instaurari, ita vt omnia è chylo mediata effici statuerentur: Sed hic non sistitur, dum immediatè ipsum solida alere, hæc gignere, fætum nutrire, semenq; producere, sustinetur.

Porro è sanguine semen fieri, ostendunt multa; Et primo continuatio spermaticorum vasculorum cum arterijs, ac venis sanguineis, quæ arguit quoq; continuitatem contenti succi, nisi quod à figura, & natura varia partis diuersificatur quoque contentorum substantiæ modus. Etenim, vt præclare affirmat *Gal. lib. de sem. cap. 12.* Arteria, & vena, ad utrunque testem descendere conspiciuntur non recto itinere, vt reliquæ omnes, sed instar capreoli, aut hederæ varijs modis inuolutæ: vnde vt puto, à dissectionis professoribus partim hæderaria, partim capreolaris natura ipsarum fuit appellata. In his verò capreolis, & anfractibus, quos faciunt, antequam ad testes perueniant, albescere paulatim sanguinem videre licet; tùm demum vbi iam ipsos testes attingerint, seminis substantia in ipsis manifestè apparet. Illi cæteri fauent Anatomici, & in specie Bartholinus *lib. 1. Anatom. reform. cap. 21. 22., & 23.* Ex altera autem nullum aliud vas illuc chylum ferens ad hucq; Anatomicis patuit.

Vidit huius rationis vim Pallierius; ideo dixit, chylum vel per proprios ductus, vel per venas fluere: Sed vbi hoc esset, dicendum est, vel chylū hunc priusquam in venas has feratur, hepatis parenchyma transfretare; vel per nouos ductus in Cauam, indeq; in testium venas; vel, vt vult Pecquetus in Cor, & ab eo in arterias, ab his autem in testes confluere. Si primo modo, quis imaginari poterit, in tot venularum gyrationibus, & iccorarij parenchymatis contactibus quid impermixti manere, & non in sanguinem verti? Si secundo, cur Natura voluit præ-

Ex sanguine
semen fieri.
prima ratio
à vasculis con-
tinuitate.

Quid respon-
deat Pallie-
rius.
Refutatio.

Chylus sanguini mixtus sanguis fit.

te rirc hepar, vt candidum feruaret chyldm pro feminis productione, & inde in sanguineas venas ducere, & cum crure miscere? Et cur chyli minimum multo sanguini mixtum non fiet sanguis? vel quæ contra Scipsum sententia, quæ circulationem, cui latè subscribit ipse destitueret? Equidem si viuut sanguis, & nutritur, vt videtur in admittit, dum illum ex se moueri, affirmat, & ali ex Hipp. auctoritate autumat; manifestum, quod fiet sanguis: si autem non viuut (vt qui nec ex se mouetur, nec rectè ali, sed metaphoricè dicitur) sola mixtio plurimi minimum corrumpet, & vel à venis ipsis, quibus talis ab hepate facultas inditur, in sanguinem mutabitur. Sed & quomodo illud dabitur, si suæ Circulationi, quæ venis reductionem, non adductionem permittit, fietur? Si tertio, quomodo Cor pertransiens, & arterias peruadens, adhuc poterit chylus consistere, & non vocitari, fieriq; reuera sanguis? Patet ergo, è sanguine, non è chyllo semen fieri.

Secunda ratio à subsequenti sanguinis emissionem.

Pallierij responsio refellitur.

Idem probat assumptum, quod, si quis nimis validè, & frequenter Veneri incumbat, sanguinem loco feminis emittet; quod indicat propeperatam euacuationem, vt non poeuerit sanguis adhuc concoqui; & in semen abire: nam ad id & alteratio, & tempus commodum exquirunt. Et hoc idem fuit argumentum Hippocratis loco inferiùs adducendo de *hpm. struct.*, & *Aristotelis 1. de gen. anim. 19.* Cuius vñ nequaquam infringit responsio Pallierij, vbi dicit, hoc ideo accidere, quia exhaustis semine vasculis, ac creberrate emissionis, corporisq; concussionem infirmatis, sanguis accurrit, vti proximior, & rarefactus, reclusisq; vasorum osculis, tenuissimus cum sit, profilit postmodum exhausti feminis vice. J In primis enim à suamet conclusione refellitur pag. 127. vbi hæc protulit: Chylus igitur, siuè per proprios ductus, siuè per venas deuehatur, rudior est feminis materies, ex qua inde perfectè conficitur, spermaticis ipsum vasculis præparantibus, & excoquantibus aduenientibus inde, iunctisq; spiritibus cum sanguine arterioso, qui fermenti quodammodo vices gerit, nobiliori forma decoratur. J Vanè ergo recurritur ad reclusionem osculorum, cum sic ex eo possit optimè à calefactis arterijs adducenitibus sanguis educio semini succedere. Item quia si ora venarum recluderentur, non sic facilè cessaret sanguinis emissio, quin & inuoluntariè per semel obtentum exitum emitteretur, aut in cavitates alias laberetur; maximè ex arterijs, quæ difficiliùs occluduntur. Item quia si verus esset, & ordinarius illuc chyli accessus, non sanguis, sed chylus deberet vice spermatis emanare.

Tertio ratio à feminis vasculis eximio.

Probatur item ex hoc, quod è pauco semine gignitur animal simile in specie, & in indiuiduo, nempe Genitoribus: non in facie solùm, sed multoties in quolibet membro, nec solùm circa effigiem, sed & circa vires, & affectiones tum corporis, tum animi, & ni quid obstat, etiam intellectus. Hanc autem sic eximiam virtutem in parua materia supponere aliter non licet, nisi dicamus, illam vel ab omnibus, vel saltem à nobilissimis partibus, & ijs, quæ virtute cæteras omnes contineant, in

testes

testes derivatam, ibiq; vterius expositam esse. Eam igitur aliunde venire, nisi per riuulos neruorum, arteriarum, venarumq; quæ toto cum corpore, singuloq; membro communicant, à fontibus animalium, vitæ, naturaliumq; actionum, cerebro nempe, corde, ac iecore, quis possit iuste imaginari? Per eos autem canales aliud influere, quàm spiritus, ac sanguinem, sensui non patet. Ergo ex iisdem semen fieri, est asserendum. De priori verò propositione experientia rerum magistra fidem facit. Videmus enim tum filios, tum filias ut plurimum patri, vel matri, vel utrique assimilari informatione, habitu, viribus secundum partes ipsas quoque; itaut podragrici, phytici, nephritici, lienosi &c. sapissimè in filios propriam labem transferant, nisi ab alterius Parentis contrario robore alterius imbecillitas euincatur. Ita etiam rixosi, iracundi, melancholici, faceti, audaces &c., etiam similia mul-toties habent germina. Et sic de reliquis.

Filij paren-
tibus similes
etiam in par-
tibus sunt.

Hic verò opponunt Contrarij, huiusmodi non esse certa, cum videamus à sanis aliquando parentibus viciatos, & à morbosos sanos edipartus; sicuti, & in cæteris omnibus accidentibus; itaut concludi possit, illas similitudines potius casuales esse, quàm à vi seminis prodire. Parcant verò mihi; in hoc non bene sentiunt. Dicerem quidem ego, merè casuales dissimilitudines, quæ à mille euentibus, vel imaginationis vi tum in utero, tum in educatione obueniunt; non similitudines, quæ Naturæ, si quid aliud, familiarissimè sunt; cum aspiciamus, non animalia solum, sed & plantas ipsas similes patri, matri, vel utrique factus producere, non in specie, & natura tantum, sed & in accidentibus quamplurimis magnitudinis, coloris, figuræ, temperiei, virium. Ne ergo opponant cæcum, vel mancum aliquando ab integris, & lynceis parentibus productum: quia, si in utero talis fiat, id non nisi ex aliquo externo, accidente, vel interno vteri symptomate eueniet: si verò extra, mero euentui imputandum; Neque opponant videntem à cæco, & integrum à mutilo productum: quia saltem alter genitorum, & validior, videns, & integer erit.

Oppositio
ad eandem.

Tollitur.
Dissimilitudo filiorum
casualis simi-
litudo à nat-
ura.

Comprobatur etiam ex eo, quod Vir, ac mulier, semine emisso, tristantur, cum antea gestientes, & voluptuosi ambo essent: Ergo signum, semen in se aliquod lætificans continuisse, quo amisso, tristitia insurgat. Nullus autem humorum ad lætitiā confert, nisi sanguis, cuius temperies Cor exhilarat. Ex hoc ergo semen constare, asserendum. Probatur illud ex Hippocrate, qui lib. de hom. str. & n. 2. dixit Qui puri sanguinis non inexpertes sunt, hi vsquequaque rident, & aspectu, ac corpore floridi, necnon perspicui coloris existunt. Quod de chylo nec is, nec alius dixit. Et sic ideo vinum Cor lætificare dicitur, quia sanguini analogum, & in sanguinem facillimè transit.

Quæ ratio
à succedente
tristitia post
Venere.

Solus sanguis
ex humori-
bus hila-
ritatem confert,

Conualidatur quoque eo, quia, si modum excedat Coitus, summè corpus debilitatur; & tamen pauca est materia, quæ excernitur: signū ergo, eam nobilissimam, & validissimam esse. Quis autem valor è ven-

Quæ ratio
à debilitate
coitus infer-
re queat.

Pallierij re-
sponſiones
oliduntur.

Dupliciter
excunt à va-
ſis ſpiritus.

Vbi ſanguis
chylus cedit.

Sex ratio à
fecunditate
ſanguineorū

Obiectio.

Reſponſio.

Omnes in
hepate gi-
gnuntur co-
geneſi hu-
moreſ.

triculo, & à materia rudi, vt chylo? Dicit Pallierius, ſi à ſpiritu
excretorum copia euenire: Sed qui ſpiritus à laſcis vaſis ſemini ſuppe-
ditari poſſunt, quæ vt eorum fautores volunt, à nullo principalium mem-
brorum trahunt originem? Dicit, ab arterijs, ac venis iſſis ſuppeditari:
ſciat autem, exinde ſpiritus exire, vt & à neruis, dupliciter, hoc eſt vel
aeris modo, vel cum ſucco aliquo mixtos. Si dixerit primo modo, iam
non magis valoris in ſpermatice imprimetur vaſa, quàm in ventriculum,
intestina, & veſicam: in has enim partes non minus ea implantantur,
ac ſpiritus fundunt, quàm in vaſa prædicta, & tamen ab illis partibus
copioſa euacuata materia, non adeo languent vires, vt ab his exigua.
Ergo non eo ſolo communicari modo ſpiritus, ſed peculiariter imprimi,
dicendum, prout & Pallierius ipſe, vti iam ſupra ex eo attulimus, ſentit.
Si ſecundo, iam habemus intentum: ad quid enim chyloſus, ſi ſanguis
adeſt? Vbi maior, minor ceſſat. Et ad quid ſanguis, ſi chyloſus? vnus
eorum ſuperfluus; fruſtra ſit per plura, quod per pauciora fieri poteſt.
Agnouit autem robur argumenti vir eruditiffimus, ideoq; addidit arte-
rioſi ſanguinis conuentum ad nobiliorem chyli elaborationem: At uerò
cur admittere chylum, qui arteriaci ſanguinis ope indigeat, & reiſcere
ipſum ſanguinem, qui ſimul cum venali, & materiam ſimul, & vim im-
primat? Si enim à ſanguine arterioſo ſolam vim ſpirituum exhiberi
contendat, quam mihi aſſignabit cauſam, quæ illam ſubſtantiam able-
get, ſola virtute reſiſta? Quod ſi dixerit, à venis retrahi, ac reduci ſan-
guinem verſus Cor, vt volunt Circulationis fautores, quam viam aſſi-
gnabit ipſe chylo per venas, quæ ſit contraria dictæ reductioni? nimis
intricata repugnancia.

Addatur, quod ſemine abundant, qui bono corporis habitu præditi,
& ſanguinei ſunt, non qui copioſe edunt, ſi obæſi, vel extenuati. Ergo
&c. Declaratur antecedens: Conualeſcentes ex longa ægitudine, et ſi
copioſe edant, benèq; chyliſcent, niſi mediocrem ſanguinis quantita-
tem fuerint adepti; & phlegmatofi, bilioſiq; quamuis moderatè alantur,
& concoquant, vel pauciſſimū, vel morboſum ſemen emittunt. Reſpon-
debit ipſe, conualeſcentes non affluere ſemine, quamuis copioſe edant;
quia corpus egeum præripit chylum, vt non ſeratur ad teſtes; phle-
gmatofos autem, vel bilioſos chylum prauum gignere, & ineptum ad
ſeminiſ productionem: Sed inutilis hæc reſponſio ei, qui poſuit, chylum
ex ſe per corpus moueri: ſi enim ex ſe mouetur, cur non omniquaque
conſluet, & in ſolitos ductus? quæ ratio ei inerit, vt ſomniet, ſibi eun-
dum ad hepar, non ad teſtes? Adde, & cæteris, quod teſtes inter vali-
diora membra adnumerantur, vt propterea dubium non ſit, quin magis
de chylo, quàm plura alia, ad ſe retraherent, ſi modò aliud à ſanguine
ei iter ineſt, & cibatio affluens. Circa phlegmatofos autem, & bilioſos,
quamuis nonnullis videatur, phlegma in ventriculo produci; commu-
nior tamen opinio eſt, humores omnes gigni in hepate, vt qui ſanguini
connaſcuntur; in ventriculo autem ſolum conteri cibum, & ad ſan-
guinem,

guinem, sicuti, & ad excrementa secernenda parari: si ergo per ipsum chyli portio, quæ adenosas, solidasq; partes alere, mammas replere, vterum fecundare, testesq; semine donare debet, per nouas lacteas, vel per porositates defluit, non est, cur in ijs non generetur semen cibo respondens. Tollitur verò magis omnis obiectio, si dixerò, in ratione supponi moderatam tum cibationem, tum chyli ficationem, quæ possunt cum phlegmatico, & bilioso, saltè ad tempus, consistere, & sic si peculiariter chylo ductus pro semine datur, patet, antecedens supradictum verificari, & per consequens ad intentum nostrum conclusionem elici.

Septima ratio ob auctoritate.

Vltimò semen è sanguine confici, vniuersa ad huculque Medicorum, Philosphorumq; Schola tenuit cū Principibus suis Hippocrate, Galeno, & Aristotele. Sed quia Pallierius omnia sua ex Hippocratis doctrina stabilire contendit, reliquis prætermisiss, in hoc solo insistam. Is ergo „ lib. de hom. stru. num. 6. sic loquitur: Lac autem, & eodem modo „ genitale semen hominis ex sanguine gignuntur; & hoc certum est: si „ enim homo genitalli plus nimio vtatur, sanguinem pro semine emit „ tet. Similiter autem, & fæminæ si plus nimio lactare cogantur, san „ guis elicitur. Quid clariùs dici poterat? Quo commento hic opus? Eadem est materia lactis, & seminis, nisi quod alia ad semen, alia ad lac opus est elaboratione, aliaq; parte concoquente. Hucusque acquiescit Pallierius: sed (inquit) lac ex chylo fieri, probatum; ergo & semen. At cur dimidiare auctoritatem? Is non solum dixit, eandem esse materiam seminis, & lactis; sed è sanguine utrunq; fieri perhibuit. Testis dictum diuidi non potest, vt communiter Iurisperiti tenent, & in specie *Surdus lib. 2. conf. 173. num. 68., & Giurba consil. 23. num. 3. Inciuile* „ enim est (ait lex 24. ff. de leg., & *Senatusconsult. lib. 1. tit. 3.*) „ nisi tota „ lege perspecta, vna aliqua particula eius proposita, iudicare, vel „ respondere.]

Vera Hipp. sententia.

„ Sed videamus nunc, quid dicat *Hipp lib. de genit. num. 1.* Genitu „ ra Viri, (inquit) provenit ab omni humido, quod in corpore existit, „ itaut id, quod robustissimum est, secernatur. Argumentum autem „ eius, quod robustissimum secernitur, est, quod à Veneris vsu, paucu „ la ad eò re emissã, imbecilles redduntur. Stabat autem res hoc modo: „ Venæ & nervi ab omni corpore in pudendum vergunt, quibus, dum „ aliquantulum teruntur, & calescunt, ac implentur, velut pruritus in „ cidit, & ex hoc toti corpori voluptas, ac caliditas accedit. [num. 4. „ viam designans, sic ait: Atuerò pueris venulæ tenues, & repletæ „ existentes, genituræ transitum impediunt, & pruritus ipsis non simili „ ter accedit, & propterea neque conquassatur in corpore humidum ad „ genituræ secretionem. Quin & Virginibus, quo vsque iuuenulæ „ fuerint, menses non procedunt propter eandem causam. Postquam „ autem adoleuerint & virgo, & puer, venæ in pudendum pueri ten „ dentes, itèmq; virginis in vterum amplæ sunt præ augmento, & of „ cula ipsarum, aperiuntur, & via, ac transitus per angustias contin „

Quid dicat Hipp. lib. de genit.

Idem expli-
atur senten-
tia.

git. J Ex his apertè patet, quid ex Eo sit semen, nempe quid robustissi-
mum; ex quo in genere fiat, hoc est ab omni humido; & per quam
viam, ad testes ducatur, scilicet per venas. Annui & proportionem,
analogiam, & similitudinem, quam semen Viri cum mulieris mensibus
possidet, tùm iuxta ætatem, fluxus causam, ductus, ac per consequens
originem: Vnde ex hoc loco verosimile est, Aristotelem, qui multa ab
Hipp. mutuauit, suam desumpsisse opinionem, quæ insinuat loco cit.
p. de gen. ani. 19. circa vtraque hæc vtilia excrementa. Reliquum er-
go est, ut quod in genere dixit Hipp. specificè declaratur: Eset enim
anceps nimis oratio tam vniuersalis, nempe ab omni humido: sic enim
ritè quis potuisset suspicari, etiam à sero, chylo, mucò, semen exire. Sed
,, suspicio omnis tollitur per ea, quæ 5. subiungit, & sunt hæc: Porro
,, genituram dico à toto corpore secerni, & à solidis, & à mollibus,
,, partibus, & ab humido omni in toto corpore. Sunt autem humidi
,, species quatuor sanguis, bilis, aqua, & pituita: tot enim species con-
,, genitas homo in seipso habet, & ab his morbi fiunt, aut etiam ex
,, morbis discreationes. J quid autem aliud est in corpore sanguis ge-
neraliter sumptus, quam massa illa cruenta constans ex sanguine stri-
ctius sumpto, pituita, & vtraque bile, nempe flaua, & atra? hi enim
congeniti in nobis dicuntur humores, qui elementis vniuersalibus, &
annitemporibus respondent, & ex quibus tùm gignimur, formamur.
nutrimurq; ut tradit Gal. 8. de placit. Hipp. & Plat. 4. hic autem per
aquam intelligi melancholiam ob ichor. s. seriq; copiam ipsi ingentiam,
siuè annexam, constat ex alio Hipp. loco, nempe lib. de hom. nat. num.
,, 5. & 8. vbi sic loquitur: Atuerò corpus hominis habet in seipso san-
,, guinem, & pituitam, & bilem duplicem, flauam videlicet, & ni-
,, gram, atque hæc sunt ipsi corporis natura, & per hæc, & egrotat,
,, & sanus est. J Sicuti, & hos homini esse congenitos humores, fusè
ibi idem explicat.

Quid per om-
ne humidum
intelligat
Hippocr.

In vanum ergo Pallierius extorquere conatur ab Hippocrate, & se-
men, & lac ex chylo fieri: illam namque propositionem, semen ab
omni corporis humido secerni declarauit, quando, quid pro illo omni
humido intelligat, subiunxit: notum enim est, per speciem derogari ge-
neri; Et inclusionem vnius esse exclusionem alterius. Quis autem
dixerit rectè, chylum, qui propriè in via alimentum est, & proxima
sanguinis materia, esse humidum corpori congenitum? Aut quis alius
sperabit talem ex Hippocrate deducere conclusionem?

Non firmatur
alia Hipp.
auctoritate.

Quod si vel his ipse non acquiescat, audiat alium eiusdem Auctoris
,, locum lib. 4. de morb. num. 1. vbi hæc sunt verba. Ad hominis ge-
,, nationem de omnibus, & Viri, & mulieris partibus semen progres-
,, sum, & in vterum muliebrem illapsum condensatur, temporeq; ve-
,, niente, natura hominis formam referens producit. Habet autem
,, & mulier, & Vir quatuor species humorum in corpore à quibus mor-
,, bi fiunt, qui non violentia fiunt. Sunt autem species hæc pituita, san-
guis,

CAPVT DVODECIMVM. 277

„guis, bilis, & hydrops, siue aqua; & de his non minima, neque debiliſſima in ſemen procedit portio. Ex hoc tamen loco aliquid ad ſui fauorem videbitur ſibi trahere Pallierius, dum parum infra dicit Hipp., quod Venterculus dum plenus eſt, omnium horum humorum corporiſons eſt. Sed quomodo intelligi hoc debeat, declarat, dum dicit, in omnibus cibis, ac potibus, & biliſi quid eſſe, & aquoſi, & ſanguinei, & pituitoſi; quæ dum comedit, ac bibit homo, corpus omne per venas trahit è ventriculo. Conceditur autem, ſanguinem venoſum gigni ex chylo, & ex hoc eodem omnes emanare humores: At ex eo ſemen produci, antequam iidem geniti fuerint, nec dixit Hippocrates, nec ex dictis deducitur. Mediatè hoc fieri, iam inter nos conuenit: ſed ſic improprie loquemur, & non ad propoſitæ quæſtionis incudem: hoc verò modo, & ſemen à pane, vino, & carnibus fieri, etiam dici poſſet; cum ab his chylus fiat, inde ſanguis, & hinc alimenti ſuperfluum in quaque parte: At ſimilis impropria locutio hic non habet locum, ubi diſputatur, num ſemen ex ſanguine, vt voluit ex Hippocrate Galenus: num verò ex chylo, vt quidam Neoterici ſentiunt, qui vellent ſe Hippocr. vmbra tueri, immediatè producat.

Nec verò rursus diſputo de legitimitate eorum librorum, cum res mihi ſit cum Viro, qui ſibi hanc legem præfixit, quæcunque Hippocrati Opera adſcribuntur, tamquam eius propria acceptandi; neque ob id viro de improprietate nominis aquæ humori atro attributi, vt colligitur ex adſcriptione ſplenis pro eius fonte facta: ſufficit enim mihi monſtraſſe, chylum non includi inter humores homini congenitos, niſi priùs per venas toti corpori diſpenſetur, quod lingua noſtra ſonat niſi priùs in chymum, ſeù in ſanguinem latè ſumptum, fuerit verſus: Sed quid ad nubila currimus, ſi clara habemus? Quæ ex libro de hom. ſtruct. allata ſunt, nulla indigent interpretatione.

CAPVT DVODECIMVM.

Proponuntur in eodem ſubieſto contraria pro chylo rationes, & diſiuntur.

HÆC, & alia, quæ poſſent ex ijs, quæ de lacte ſupra diximus, addi adminicula, in claram nos ducere veritatem videntur de ſeminis geneologia, & origine, quam nimis deicere mihi viſus eſt Vir doctiſſimus, dum natalia adeo rudia ei aſſignauit. Is attamen, ne omnino ſeminis decori detraheret, voluit in alio illud nobilitare, excrementi nomen, quod ab Ariſtotele, & Galeno iuſtè ei inuſtum fuerat, extirpare ſtudens: promulgaui enim, incongruere ſic nobilis ſpeciei reparatori cognomen faciibus, & inquinamenti commune. Scrupuloſa conſcientia, quæ ſtudet quolibet alteri illatos defectus compenſare: Inanis verò compenſatio, & manca, quæ pro re detracta titulos, & accidentia reponit.

Nomina ge-
nerica spe-
cierum nobi-
liati non ob-
stant.

ponit. Nè tamen hoc illum sollicitet: generica enim nomina non obesse solent claritati specierum, quæ per differentiam additam ab alijs inferioribus distinguuntur, suumq; dignum recuperant, imò retinent locum. Quid leoni derogat nomen corporis, quod, & lapidibus, & luto competit? Adiuncto animati cognomento, tota iactura refarcitur. Quid hominem obscurat animalis nomen, quod cum tot feris, obsce- nisque animantibus commune obtinuit? ipsi rationale additum totum refundit honorem. Patiatur ergo Pallierius, & quivis alius, semini no- men excrementi inditum fuisse, cæteris inquinatis excretionibus etiam appositum: utilis namque cognomine iuncto, omnis reponitur digni- tas, & ea, quæ superinutilla alia excrementa sublimat; Veram autem ex altera ei ex generis à nobiliore sanguinis, & spirituum parte manan- tem, vt ex supra allatis constat rationibus, restituat, & sic competens detractioni restitutio fiet.

Excrementi
nomen semi-
nis dignita-
tè, vtili ad-
dito, non mi-
nuit.

Prima ratio
ab Hipp. au-
thoritate.

Ijs autem non sic facillè acquiescet ipse, aut alius aliquis novitatum amans, nisi prius contrariæ rationes, quæcunque sint, diluantur. Suam igitur Virisse intentionem in Hippocratis auctoramento repo- nens, præter allatam ab ipso auctoritatem lib. de genit., cui abundè satisfecimus nos, eam contra afferentem contorquentes, nonnullas alias in medium affert, è quibus vel antiquam prosternere, vel novam eleuare propositionem satagit. Ex libro igitur de alimento num. 8.

Ex lib. de
alim. num. 8.

hanc extraxit positionem. Lac, & sanguis alimenti sunt redundan- tia] per quam innui videtur, aliam esse lactis genesim præter san- guinem: si enim ambo ex alimento superfluum; ergo neutrum illo- rum ex altero: sed nulla alia materia aptior chylo ob mutuam simi- litudinem, ergo è chylo lac fiet: Eadem autem est materia semi- nis, & lactis, vt alibi dixisse Hippocratem, supra allatum est: Ergo & semen ex chylo. Alter locus ex eodem libro num. 1. desumptus est,

Ex eod. lib.
num. 1.

vbi Hipp. dixit Alimentum, & alimenti species vnum, & multa: vnū quidem, quatenus vnum genus est: species verò humiditate & siccitate finitur.] Cum ergo diuersum sit alimentum partium, non ex sanguine omnes alentur, & sic plures ex chylo, & inter illas testes glandularum æmuli; Ergo & semen, quod eorum superfluum est, ex chylo gignitur. Tertius locus ex eodem pariter libro num. 2. extractus est;

Ex eodem
lib. num. 2.

quod & ad sanguinem peruenit alimentum, sicuti, & ad pituitam &c.: non ergo sanguis ipse alimentum est, & sic nec ex eo semen, cum & hoc sit ex alimenti superfluo. Verba Hipp. sunt. Facultas alimenti per- uenit & ad ossa, & ad omnes partes; & in neruum, & in venam, & in arteriam, & in musculum, & in pelliculam, & carnem, & pingue- dinem, & sanguinem, & pituitam, & medullam, & cerebrum &c.] Sed nimis à longe petitur consequentia talis: Nam de genuina Hip- pocratis mente sat ex dictis in proximè anterioris capitis sine constat: quare sufficiat solum monstrare, eum à contradictionibus esse immu- nem. Et circa primò allatam auctoritatem hoc facillè fiet, si hic adap- tetur

Prima hæc
ratio refel-
litur.

tetur Galeni sententia, quam statim in primo Operis capite articulatus ex lib. 6. de placit. Hipp. & Plat. cap. 8., ubi quomodo chylus ventriculi, sanguis autem iecoris sit alimenti superfluum, declarat his verbis: „Sicuti igitur ventris reliquæ iecori accommodæ sunt; eodem modo quod a iecoris alimenti superuacaneum est, reliquis omnibus utile efficitur.] Quo exemplo, atet dubij solutio: sicuti enim ex eo quod chylus, & sanguis dicantur alimenti superfluum, non ideo benè negatur, sanguinem ex chylo, & hunc ex ^{mammis} mammarum, ac potatis fieri, ita quamuis lac, & sanguis dicantur ambo alimenti redundantia, non ob id tollitur, quin lac, quod è mammarum alimento superest, sanguini, qui iecori alito superabundat, sua debeat natalia, sicuti & semen. Id enim comparatum natura est, ut vnaquæque pars alteri successiue, ac vicissim inferuiat, quamuis pro se ipsa tantum laborare videatur. Imò ex hac Hipp. testificatione discere poterat Auctor hic, non benè ab ipso mammas tamquam foueas, & lactis retinacula tantum statui, cum lac sit ipsarum gratiosum opificium, quod quæ suo iecori prodigo dispensatori ob sui imbecillitatem reddere nequeunt, alijs infantum iecoribus liberalliter retribuunt: nam nil naturale iners, nil inutile, nil ingratum in Natura.

Minus ex secunda auctoritate contra sanguinis dignitatè alimentitia concluditur, quæ imò in eius redundat fauorem: Etenim sanguis, si propriè loquamur, num alimentum genere est, totiq; aptè corpori commune; plura verò specie, cum sit substantia propriam quidem formam retinens, sed varijs composita succis, secundum quos cuilibet parti proprium subministrat alimentum, vel pituitosum, vel biliosum, vel melancholicum, vel purè sanguineum, vel aqueum, vel mixtum iuxta diuersitatem partium, quæ quod sibi magis simile, natura ducente, trahunt, sibiq; verè assimilatum addunt. Sed (quod ad radices penetrat) extra rem illa facit auctoritas: ibi enim nil aliud intendit Hippocrates, quam primam alimenti diuisionem facere in humidum, & siccum, quasi dicat, alimenti aliud comestibile, aliud potabile: num verò ex chylo, vel ex sanguine contingat immediata alitio ne quidem ibi per somnium. De hoc autem in sequentibus disquiretur capitibus.

Ad tertiam auctoritatem dicendum est, dupliciter intelligi posse aliquid nutrir, scilicet propriè, vel impropriè, siuè similitudinariè & equiuocè. Si de prima nutritione agatur, ea solis viuentibus, & animatis partibus, corporibusq; competit, ut quæ sit alimenti conuexio in eandem aliti substantiam, quod dissoluta instaurentur, & viuificæ operationes exerceantur; Et hæc nullo modo sanguini competit nutritio; nam nec viuit ille, nec stabilimentum possidet ad viuificas in se actiones exercendas; nec nutriendi corporis proprias dimensiones, secundum quas omnes quid ali dicitur, à natura obtinuit; & in summa quia succus, seu liquor est, cuius proprium est alieno termino terminari, non terminare, prout competit viuenti; ut propterea is tantum sit proximum viuientis

animæ

Respondetur
ad primam
auctoritatem

Non benè
mammas di-
cuntur foueæ

Respondetur
ad secundam
auctoritatem
Sanguis ali-
mentum vni
& plura di-
poteat

Respondetur
ad tertiam
auctoritatem
Vera nutritio
solis viuenti-
bus compe-
tit.

Sanguis nec
nutritur, nec
viuit propriè

Impropria
nutritio cuius
bet rei potest
adaptari.

animæ instrumentum ad omnes obeundas actiones aptum. Si de secundo nutriendi modo agatur, qui unicuique corpori, siuè fluxili, siuè solido, siuè viuenti, siuè non conuenire potest; æquiuocè enim dicimus, ignem ali oleo, lignis, escas, flumina fontibus &c.. Hoc inquam modo sanguinè quoque, & pituitam, & serum nutriri, dici potest. (Hæc etiam euocari potest & alijs alendi modis, scilicet metaphorice dictus, qui & accidētibus ipsis aptè attribuitur, vt si quis afferat, rixas susurrationibus, irasquè nutriri minis.) De ambobus autem ijs modis nutriendi ibi loqui Hippocratem, constat, cum dicat, alimentum attingere & solida, & succos, & spiritus, & calidum, & humidum. Quare, cum diuersimodè sumatur, & alitio, & alimentum, patet, posse quid simul dici & alens, & alitum; alens, nempe propriè, alitum verò per similitudinem, vt in casu nostro sanguinis. Ex ipso enim vniuersum corpus alitur, is verò à cibus, ac potibus, varijs tùm ventriculi, tùm venarum, tùm iecoris intercedentibus alterationibus, instauratur. Nisi cum ijs sentiremus, qui sanguinem quoque viuere, & ali, ac alere, opinantur, sed absontè.

Quomodo
quid possit
& alens, &
alium dici,

Secunda ratio
Pallierij
ab istis, quæ
semen augent,
vel dissoluitur.

Est, & semen,
quæ augent,
& quomodo.

Quæ semen
gignunt sanguinis
sunt præparata.

Altera ratio, qua vtitur Pallierius, est, quod multa passim remedia ad incrementum, vel decrementum seminis exhibentur (sicuti & pro lacte fit), quæ non videntur respicere sanguinem: Atuerò huic facillius est responsio, si cum Galeno *lib. 5. de simpl. med. facul. cap. 21.* dixerò, „Lactis, & seminis effectrices facultates esse partim in medicamentis, „partim in alimentis. In medicamentis, cum, succos pituitosos ex- „calescentes, in sanguinem vertimus; in alimentis autem, secundum „substantiæ totius similitudinem, vbi videlicet boni sunt succi, & moderatè humida, ac tepidè calida, cetū ipsum lac.] Sed peculiarius de „semine cap. 23 vbi sic legitur: Vt lactis, & seminis quædam generare „dicuntur, & quæ his sunt contraria, extinguere: tùm quædam pro- „uocare, & ipsis contraria suppressere &c. Igitur semen generant cibi „quidem, qui benè nutriunt, & flatuosi sunt, totisq; substantijs fami- „liares: medicamenta verò flatuosa, & calida: Extinguunt autem „desiccantia, & refrigerantia omnia, & quæ totis substantijs sunt „contraria. Porro prouocant, quæcunque calida sunt, & flatuosa „absque desiccatione; suppressunt verò contraria.] Ex quibus constat, quæ semen gignunt, si alimenta, optimi nutrimenti esse, & sic sanguinis feracia, si medicamenta, etiam temperie sua sanguinem ipsum imitari: quæ verò semen interimunt, siuè alimenta, siuè medicamenta sint, frigida, & sicca esse, & ad sanguinem ineptissima. Hæc quiuis experiri potest in seipso: nam si quis per plures dies carnes, ouaq; relinquens, edat pisces, fructus, olera; locoq; vini aquam bibat, manifestè sentiet, in se Veneris ictus retundi; qui alioqui carnibus, ouis, ac vino vtens, carnis stimulos persentiet acutiores: Cætera autem, quæ vel prouocare, vel frænare coitum dicuntur, ad nostram rem non faciunt, cum aliud sit semen affluere, aliud ad Venerem incitari; Vel si facere quis velit, manifestum est, multo facilius sanguinem calidum, spirituosumq;

sumq; moveri, quàm chylum, eius respectu frigidam, ac segnem, sicuti, & calida, non frigida, ciere.

Facilius mo-
vetur rãgus,
quàm chylus

CAPVT DECIMVM TERTIVM.

Alia adducuntur rationes pro chylo facientes, & dissoluntur.

Quoniam verò quò magis impugnatur veritas, eò magis elucescit, non erit incongruum hùc alias quasdam ad idem asserre rationationes.

Iis igitur addatur, quod qui nimio coitu vtuntur, in primis, & ante omnia ventriculi imbecillitatem magnam contrahunt: Signum ergo, ex effusione seminis læsum fuisse, quod non esset, nisi ab ipso peculiariter procederet semen.

Prima pro
chylo ratio
ab immoderati coitus
effectu de-
sumpta.

Ad eam re-
spondetur.

Respondetur, non magis lædi ventriculum, cæteris coquentibus partibus, iecore, corde, cerebro &c., solummodò verò facilius, citiusq; eius læsionem sentiri, vt qui non solum naturali coctioni, velut cætera, sed & animali appetitui præest. Argumento sit, non minus facile sentiri oculorum languorem, nervosarumq; partium debilitatem, quæ in sensationis actu elucet facillimè; ex altera verò, quamvis non minus lædantur reliquæ partes, non tamen sic promptè illarum percipi notas. Respondetur vterius, ex eo non argui seminis immediatam originem à ventriculo; sed propriè natui caloris imbecillitatem: sicut enim illius robur præcipuè in coctionibus vniuersalibus innotescit, ita & debilitas: Sic enim &, si sanguinis fluxerit multitudo, quamvis eius immediata coctio fiat in iecore, ventriculus tamen læditur quamprimùm, vt desumitur ex *Gal. 4. aphor. 27.* multò ergo magis ex immodico coitu, in quo magna sit dissolutio spirituum, non solum ob excretionem seminis, sed & ob actionis ferè tensivam violentiam, & voluptuosam cutis ab incallescencia rarefactionem.

Ad idem probandum tendit ventriculi cruditas à coitu proximè post cibum initio proveniens, propter quam sanitatis tuendæ consultores non nisi in paucissimis quibusdam casibus, illum hora simili permittunt. Quid autem arguet, nisi magnum seminis cum chylo, & testiu cum ventriculo consensum? Veruntamen (non negato interim damno, quod ab educto semine, vbi maximè illius aliqua penuria subit, toti, & ventriculo provenit, de quo in proximè antecedenti solutione dictum est), nunc dicimus, alias esse causas hic adductæ cruditatis, præter seminis cognitionem cum chylo; nempe spirituum, & natui caloris distractionem a coquente ventriculo ad pudenda, ac ad omnes partes exteriores; veluti si quis ebullienti leberi flammam detrahat; qua ratione etiam importunæ vigiliæ, cerebri; profundæ meditationes statim a cibo eidem obfunt eximè; Et violentum alui, clunium, & vniuersi corporis motum, à quo cibi, potusue e ventriculo intempestivè trahuntur: nam etiam vio-

Secunda ra-
tio à crudita-
te ob inter-
pestium ec-
litum orta.

Solutur;

Quæ sint ve-
ræ causæ cru-
ditatis ex co-
itu post cibum.

lentæ tunc temporis exercitationes non parum coitioni officine.
Vbi autem causa clara est, ad quid confugere ad sympathicam, & occultam?

Tertia ratio
à ieiunio, &
crapulæ effe-
ctu circa Ve-
netem.

Soluitur.

Sed & si quis sanguinis copia seu plenitudine mediocri polleat, ieiunium verò seruet, semen ei deficit; & è contra si quis opipare viuat, quamvis plenus non sit, ad coitum incitatur. Ergo ex chyli, non sanguinis abundantia fit semen. Soluitur autem argumentum hoc, detecta propositionum fallacia: in priori enim adducitur plenitudo, sed additur mediocritas, quod tamen additæ plenitudinis energiam destruit, per quam supponitur sanguinis excessus, quo existente, dubium non est, si ex tolerabili ieiunio destrueretur semen, dicendum fore, non ex sanguine, sed ex chylo semen produci: Verum sic sumpta plenitudine, falsa propositio est: nam imò, sicuti plenitudo nutritioni obest; & ob id talem habitum statim soluere iubet Hipp. p. aphor. 3. ut rursus nutrirî incipiat; ita & productioni seminis oberit, ut propterea ieiunio potius propagari, non minui censeatur: At si de mediocri sanguinis quantitate intelligatur, vera quidem propositio est; patet enim tunc ex ieiunio defuturum semen: sed consequentia fallit: quia tunc rationabiliter deficit semen, cum eius materia, nimirum sanguis deficiat: in ieiunio namque magna fit dissolutio sine reparatione, & sic citò ex mediocritate parcitas inducitur. Ventriculus item, dum plenus est, omnium humorum corpori, fons est: verum vbi vacuus, corpore fruitur colliquefcente, (ait Hipp. lib. 4. de morbi. num. 2.) Quare cum semen ex superfluo sit, cessante superfluo, necessario cessabit & ipsum.

Altera item propositio amphibologiam continet, quæ soluta, soluitur & vis rationis: Dicitur enim dicitur, si quis opipare viuat, quamvis plenus non sit, incitari ad coitum, sub illa conditione plenitudinis potest intelligi vel sanguinis mediocritas, vel penuria. Si mediocritas intelligatur, currit propositio, non consequentia: quia in vita opipara cum sanguinis mediocritate facillimè superfluum in sanguine inducitur, & sic apparet, tunc rationabiliter semen redundare, absque chyli aduentu: At si intelligatur sanguinis penuria, curreret quidem consequentia; Sed non admittitur propositio: quia, ut in anteriori capite diximus, antequam ad mediocritatem sanguinis corpus perveniat, non erit superfluum, & sic nec seminis superfluitas fiet. Quod si contendatur, nonnunquam sine sanguinis mediocritate aliquem ad coitum incitari, ut in melancholicis, & convalescentibus accidit non raro animaduertendum est, aliud esse seminis redundantiam, aliud incitamentum ad coitum: incitatur enim quis vel ob turgentiam affluentis seminis, vel ob imaginationis vim, vel ob aliquam irritantem qualitatem in spermaticis ductibus existentem. Et sic quisquis semine superabundat, ad Venerem inclinatur, non autem è contra quisquis incitatur, semine affluit: furit enim in sathyrîasi homo, & in insano amore, etsi semine careat; melancholici, ac hypochondriaci sunt salaces ob flatuum copiam;

&

CAPVT DECIMVM TERTIVM. 283

& conualefcens nonnunquam, vel cibo venereo vtens ex acrimonia feminis vel noctu polluitur, vel ad venerem prolicitur. Sicq; patet alia amphibolici & litima præmiſſarum, dum dicitur ſine ſanguinis redundantia quandam ad coitum incitari, quod quid diuerſum eſt ab intentâ feminis affluentia.

Non minus facit, quod quæ ad Venerem proliciunt, paucarum horarum ſpatio ad turgentiam deducunt; verſimile ergo, ex illo cibo, non è ſanguine, qui antea venas occupabat, illam luxuriæ incitationem, & cõſequenter feminis affuſionẽ prouenire: Sed reſpondetur, nil impedire, quin medicamenti, vel alimenti viſ horarum ſpatio per venas una cum ſanguine iam exiſtente deuehatur ad locum, quò naturaliter inclinât, ibiq; naturam ſtimulando tentiginem inducat multò meliùs quàm per inconſpicuos meatus: proprietates enim remediorum ineffabiles ſunt, & mirabiles eorum effectus, vt in hoc tempus terere non ſit opus. Non benè autem à medicamento ad alimentum arguitur: illud enim abſque quod in chylum abeat, operatur; hoc non niſi coctum, in chyliq; ſubſtantiam mutatum in venas rapitur, nec niſi ſanguis fiat, alit, aut ſuperfluum gignit.

Quarta ratio
ab incitantibus
ad Venerem.

Soluitur.

Urget quoque id, quod aliquando experimur, nonnullos gonorrhœa correptos quotidie excernere ſemen, & tamen, ſi iuuenes ſint, & viuunt opiparè, non valde vires imbecillitari; quod arguit, non adeo egregiam, nobilemque materiam eſſe ſemen, quin poſſit ex chylo facile generari, addita vi teſtibus a ſpiritibus, qui copioſi illuc per arterias deſluunt: Dicitur tamen, non parem eſſe rationem feminis cocti, ac laudabilis cum ſemine vel crudo vel vitiati humoribus commixto; item & diſferre colationem, quæ ſine vlla vi, & ſine adiumento ſpirituum, ſed ſpontè, fit, ab emiſſione viuida, & robuſta, in qua copioſi, & concurrunt, & diſſoluuntur, & educuntur ſpiritus; & tandem non valere argumentum à præternaturali ad naturalem excretionem. Patet autem, magis multò imbecillitari corpus ab educatione congenitorum forti, ac violenta, quàm ab educatione extraneorum, demiſſa, aut ſuperabundantium. Ad quod etiam in gonorrhœa ipſa experimur, in qua quidem, ſi verum ſemen educatur, ſummè vires fatiſcere, corpufq; contabefcere videmus; ſi verò virulenta, aut pituitofa, crudaq; exeat, parum debilitari corpus, conſpicimus.

Quinta ratio
à gonorrhœa.

Soluitur.

Tandem ſi plantas conſideremus, videbimus, ab ipſis adeo aliquando copioſum erumpere cum fructu ſemen, vt ipſa ſola vnita totam plantam ſerè pondere æquent, idq; nec ſemper, ſed ſola anni parte Veris, æſtate, vel Autumno: Arguit hoc ergo, nec ſic egregiam illius eſſe materiam, nec à congenito, ſed à nouiter affluente generari ſucco; aliter nec ſic copioſa eſſent, & ſemper erumperent. Hoc etiam de plurimis animalium conſtat, quæ quadam ſola anni tempeſtate ad Venerem ſeſuntur, cum cæteris non minus ſanguine ſcateant.

Sexta ratio
plantarum,
& animalium
exemplo.

Soluitur.

Soluuntur autem dubia hæc ſequenti modo. Pauciſſimam in primis eſſe

esse proportionem inter plantarum, cæterarumq; animalium, ac hominis ipsius generationem (quicquid de nutritione, ac tu purè naturali sit) ex hoc constat, quod; vt in homine perfecta, ita in plantis nulla, in animantibus imperfecta datur eiusdem electio: illæ enim purè naturales, terræq; affixæ cum sint, non possunt nisi cum terræ statu, ac cæli constitutione regi; Et sic; dum hyeme terra quiescit, & alget, Sol verò longius abest, nec possunt plantæ nutriri superflue, sed sola ijs vitæ sustentatio datur. Verè autem cum Sol vigeat magis, terra autem moderate caleseat, humescatq; datur quoque, illas copiose ali posse, & sic germina, ac frondes vndique exsudent, quæ postmodum fructus suos, ac semina simul emittunt, ea copia, quæ naturæ suæ terræq; succositati competit. In quo quoque aduertendum, aliud esse totum fructum, aliud semen in eo reconditum: quantumcunq; enim fructus copiosissimi sint, (qui fætibus respondent quodammodo, seu veriùs ouis), semen tamen pusillum est, & longè minus, vt ideo materiæ prætiositati neque in his copia præiudicet.

Animalia quoque, etsi, vt i terræ non affixa, loca mutant, prout alimenta suppetunt commodiora, & sanior anni tempestas sint aptè Solis, radijs, & aeris clementia frui: non vsque tamen adeo ea cerebri iuuat imaginatio, quin omnino tùm cæli influentiæ, tùm terræ vel defectui, vel affluentiae subiaceant non parùm: quare solum cum talis anni regnat temperies, quæ illorum naturæ congruit, & alimenta quoque suæ complexionis congruentia affluunt, tùm concipiunt, tùm pariunt. Aliàs in Cæli in clementijs latitant, vel alimentis carent, vel non ijs, quæ ad superfluum congerendum commoda sint, potiuntur; Sicq; quædam hyeme (quæ nempe frigidò gaudent), quædam Vere, & quædam æstate, vel autumnò generant. Homo autem cæterorum animantium dignissimus, quiq; à Deo relictus in manu consilij sui, omnium creaturarum, & creatorum dominans, non potest quidem se prius à cæli influentijs custodire, multos tamen habet se tuendi ab illius terræq; iniurijs modos, suaq; alimenta prudenter eligit, seruat, perficit; quolibet anni tempore, dummodo sanus sit, & coire (ac per consequens gignere), & si mauult abstinere assolet; cum non minus in electione hominis concubitus sit, quàm cæteræ omnes actiones voluntariæ. Vt hinc hæresiarcarum manifestè redarguantur diætaria, quibus probare nituntur, hominem fornicando non peccare ex eo, quod opus naturale exercent: quia, si sic esset, quomodo Addam, veritum edendo pomum peccasset? patet autem, non magis in hominis electione esse in cibis, quàm in Venere temperantiam, quæ multis quoque modis, & auxilijs propagari, & custodiri potest.

Sed verò quicquid sit, nil impedit, quò minus dicatur, & in plantis, & in animantibus, sicuti, & in homine ipso, semen à congenitis fieri succis etiam si in ijs solo determinato tempore redundet, ac turgat: quia vtrunque sit, nisi succus nouiter affluens priùs in congeum plantæ,

CAPVT DECIMVMQVARTVM. 285

ac animalis succum degeneret, fructus, factusq; minimè producentur.

Ex eo igitur opposito argumento nil magis de chyli, quàm de sanguinis concursu ad feminis propagationem concluditur. Sed quid dico? multò magis de sanguine conijcitur quando ex generationis cuique animanti naturali, ac determinato tempore elucet, generandi principium intrinsecum, ac ingentum esse, non aduentitium; cum alioqui non minus alijs temporibus edant, quibus nec turget, nec affluit semen.

Generandi,
principium
intrinsecum,
non aduenti-
tium.

CAPVT DECIMVMQVARTVM.

*Num è sanguine alantur omnia corporis membra, disceptatur,
& pro affirmatiua arguitur.*

Sanguinem esse commune omnium partium alimentum, adeo apud omnes Veteres innotuit, vt aliud determinare, vel solum annuere, pro Medica aliàs hæresi habitum sit: Quamuis etenim nonnulla inter Philosophos, Medicosq; aliquando insurrexerit altercatio ijs solo sanguine, his non eo solo, sed alijs humoribus commixto, corpus totum enutrirî tenentibus: ea tamen verbalis, non essentialis contentio fuit: primi enim sanguinem pro tota massa sanguinea, & prout in venis moratur, sumentes, iussè pro solo sanguine concludebant: Alij verò sanguinem stricte, pro quarto scilicet totius massæ humore ponentes, veridicè quoque negabant, ipsi soli totam deberi nutritionis gratiam; cum clarè affirmare posse crederent, omnes congeneos humores, pro partiu diuersitate, plus minusuè ad earum nutritionem concurrere. Et verò in priori illo sensu hic sanguis à nobis sumitur, cum dicimus, sanguine omnia membra enutrirî.

Multa autem, eaq; non inualida, argumenta sunt, quæ sanguine cunctas ali partes, ostendunt; sumpta quidem alia ex parte sanguinis alia ex parte ipsarum alendarum partium; Et hic ea annexere volui, ne gratis Antiquis assentiri, ab alijs verò dissentire malè videar.

Et primo illud suadet mira illa venarum, & arteriarum in vniuersas particulas ramificatio, adeo ut etiam in ossa ipsa quælibet aliqua ex ijs (licet inconspicue) insinuetur, vt optimè ex Gal. & alijs docet locis allegatis Deusingius; vixq; minima cutis particula incidatur sine sanguinis effusione; Quod non esset, si simplici sanguis tota partes singulæ fuisset afficiendæ: sufficisset enim ad hoc arteriarum diramatio, vel venarum contiguitas.

Ratio prima

Secundò sanguinis tum venosi, tum arteriosi copia, quæ in viuente homine obseruatur, & cuius si dematur quantitas considerabilis, continuo dissoluitur, demacrat, & consumitur corpus; si verò minuatur excessus, florescit idem, ac renutritur; quorum neutrum esset, si ad nutritionem is non concurreret, nec requireretur succus: Id enim, quo præsentè, aliquid fit, & quo absente cessat, causam esse, apud omnes homines

Ratio secunda.

mince

mines in confesso est . Quod si reponat quis, posse esse causam, verum non materiale, sed efficientem, quatenus suo calore fouet, viuificat, & spiritus adducit; respondetur, frustra duplicem causam requiri, vbi vnica sufficit pro vtraque: si ergo chylus ex se non sufficit, vt partes alantur, cur ad eas concurret? & cur sanguini additur chylus, si hic ex se potest sufficere?

Ratio tertia; Tertiò diuturnum ieiunium pleno corpori innoxium, ac facillimum, quod nec esset, si aliunde, quàm à sanguine, corporis alitio, quæ continens est, proveniret: vnde enim refarciretur, quod continuè digluit, & in auras, ac spiritus abit, nisi superflueret alens succus; qui dissoluti loco succedat? alioqui, si chylus nutriret, cessante solita cibatione, cessaret nutritio, & hac cessante, vires labescerent.

Ratio quarta; Quartò ipsius sanguinis moderata temperies, quæ cunctis partibus plus minusue congruit: nam ipsius qualitates tùm in calore, tùm in humore temperatæ sunt, & sic faciliè ad omnia potest adaptari; quod non fieret, si vel frigidior, vel calidior, siccior, aut humidior esset: quia tunc contrarijs partium temperamentis incongrueret, difficiliùsq; euinceretur.

Ratio quinta; Quintò ipsius substantiæ mediocritas ad omnia faciliùs aprabilis, quam si in aliquo excederet: videtur autem sanguis tùm in visciditate, tùm in crassitie, tùm in densitate, ac illorum contrarijs moderatam seruare qualitatem, quæ ideo vtriusque excessibus proximior est; vel opposita minus.

Ratio sexta; Sextò ipsius quantitatis cum appetitus intensio in sanis hominibus conuersio eo modo, quo si quantitas copiosa adsit sanguinis, appetitus modicitas, si illius penuria, huius intensio subsit. indicium, quod inter assumptionem, & alimoniam partium sanguis intercedat, à cibis, ac potibus augendus, vel non, prout competens eius copia renuit, vel deficiente requirit.

Ratio septima; Septimò ipsius sanguinei coloris viuacitas, splendorq; , culus intuitus in sine sanguinis effusione occisus, & adhuc magis in actu enutritis, viuentibusq; apparet, quibus nec ossa, nec nerui, nec cutis ipsa (quamuis alba natura sint, & permatica) sic pallida cernuntur, vt in mortuis, & nutritione priuatis. Signum, ea rubro, & splendente succo enutrir, qui tamen à partium natura euincatur, & ad albedinem roseam reducatur; ideoq; mortuo homine, & corrupto calore, pallor, & fulgoris languor succrescunt.

Ratio octaua; Octauò color, statusq; nutriti corporis similis naturæ, & qualitati sanguinis in eodem redundantis: nam si sanguis naturalis, & laudabilis sit, ac mediocris, color vniuersi corporis, vt nunc dictum est, ex rubedine, & albedine mixtus; si biliosus, ad flauitiem, si pituitosus ad albedinem; si melancholicus, ad fuscum, & luidum vergens cernitur; nec solum quoad cutem, & carnes, sed & quoad pinguedinem, medullam, solidaq; ipsa (quantum scilicet illorum proprius, & naturalis color patitur)

titur) quod esse non posset, nisi è sanguine eadem nutrentur partes.

Nonò partium enutriendarum dignitas, quæ non imperfecto, sed perfectiori succo indigent, vt dignè refocillentur. Nemo enim ritè dixerit, solidas, ac spermaticas partes non esse digniores carne ipsa, vtpotè cum hæc sit, potiùs tamquàm pars compaginaus, vniens, vestiens, & ab iniurijs extrinsecis muniens, quàm quid aliud; solidæ autem partes sint fons actionum, passionum subiecta, & animalis domicilia vitæ. Si ergo ad carnem alendam, Neotericorum iudicio, sanguis, & probè coctus, requiritur; quomodo ad alenda solida chylus, qui quid imperfectius est, sufficiet? & cur non potiùs elimatior succus, qui semch æmuletur, exposcitur? Gignitur autem huiusmodi ab ipsismet partibus sanguinem vltteriùs coquentibus, & in sibi similem, congeneramq; naturam vertentibus.

Vltimò quia ex semine, & sanguine vniuersum corpus, ex sanguine vero semen ipsum constructum est, vt hætenus ostensum est: Ergo & ex sanguine, ac semine alentur cuncta, si modò eadem generationis, & nutritionis materia est, vt sæpè inculcauimus.

Ratio decima.
Nec per se, nec per lymphaticas, aut rosifera vascula chylus in solas potest idissuari partes,

Quæ omnia opposito modo de chylō se habent, & concludunt: Nam circa primum, siuè Pecqueti inuentis lacteis, quæ per ipsum, ad solas subclauias venas, & nonnullas glandulas pertingunt; siuè lyphaticis Bartholini vasculis, quæ truncum non possident, sed per abdomen, & thoracicum tubulum repentia, in aliquibus solummodò artubus patent; insistentem sit; siue ad Bilij rosiferos ductulos sit recurrendum, nullibi inueniemus pro chylō viam, quæ in solidas partes omnes, nempe ossa, neruôs ligamenta &c. inferatur, & per quam chylus in abdomine depuratus (vt aiunt) possit ad omnia pertingere, ac intimiùs insinuari: Si verò via venarum cum Pallicio eligatur, tunc, vel supponimus, chylum transire in Cavam per hepar, vel non. Si per hepar, iam ille non amplius chylus, sed chymus, siuè sanguis nominatur, scò Antiquis, scò hodiernis stetur Auctoribus, & is ille est, qui vel cum His ad Cor deferatur perficiendus, indeq; per arterias in totum corpus dispergendus; vel cum Ijs per Venas omnes ad alendum corpus, sicuti, & ad Cor, vt sæpius dictum est, commigrat: Si autem per lacteas ipsas in Cavam, in subclauias, cæterasq; venas chylus dispergatur, iam ex circulationum mente per venas omnis earum succus dirigitur ad Cor in sanguinem vertendus; vlex Platonis traditis à venis ipsi in sanguinem conuertitur; vel saltè ex miscella sanguinis longe vberioris corrumpitur, & in sanguinem abit non secus, ac pauca aqua copioso mero admixta. Et sic non apparet, quomodo succus is, qui venas peruat, chyli nomen, vel essentiam retineat; aut quomodo pars sanguis fiat, pars remaneat intacta in iisdem ductibus, & in fontibus ipsi: Nisi forsan auctumat Pallierius quicquid chyli siuè hepatis, siuè cordis coctionem subterfugit, chylum esse appellandum, (quem succum pituitam omnes cordati Medici cum Principe Galeno dicerent): sed sic improprie chyli nomen

nomen assumetur, & confundentur auditorum ingratia. Si autem tandem cum Bakio ad nervos confugiamur, plures multò inuenta novitas patietur defectus, de quibus adamussim à Deusingio differitur in citatis opusculis; siuè ipsorum nervorum spectetur sine cavitate conformatio, saltem visibili, sicquè chyli per ipsos ad cerebrum, & illinc ad universas partes dimanatio impossibilis; siuè eorum attendatur progressus, qui nec ad ossium intima penetrant, nec cum alijs solidis partibus, aut vasculis conspicuas anastomoses possident.

Chyli quantitas modica, & post aliquot horas evanescens.

De ieiunio
Chylus deficit, & quid evanidi solium repetitur in lacteis

Circa secundum, si de chyli, siuè roris, siuè lymphæ (vt cum Neoterico loquar) agamus copia, in lacteis contenta, clarum est, ex Inventorum ipsorum mente solummodò in benè pastis per aliquot horas pauculam adinueniri; item exillima esse illa vascula, itaut oculos intuentium, etiam acutissimos, perunquè effugiant; & sic minimum illud esse, quod ab his potest deducendo suggeri.

Quinimò (quod pro tertio ponebatur argumento) si per vim, vel mentis deliberationem quis in ieiunio detineatur per duos, vel tres dies, unde chylus ad membra cursitabit? Et tamen nutritio ex plurium mente continua est, & solummodo in excretionem pravi, & inutilis interturbata.

Chyli temperies frigida.

De Chyli autem temperie (quod quartum erat pro sanguine argumentum) quid dicendum, nisi quod, siuè spectetur coquentis ventriculi, intestinorum, ac pancreatis temperamentum; siuè actualis eorum, quæ pro potu, ciboque ordinariè assumuntur, vel virtualis totius in sano corpore assumpti pastus qualitas attendatur; siuè sapor, qui à studiosè durante ventriculi coctione, elicitis rudibus percipitur; siuè substantiæ tenuitas, & aquositas eorum, quæ in lacteis reperiuntur; frigidus, & ipse sit, & aquosus? quomodo ergo calidis faciliè adnectetur, ac vnietur partibus? & quomodo frigidas concaléfaiet, ac attemperabit? Vtpotè Natura continuè quidem excessui attemperationem exposcit, ac appetit, eotamen modo, quo alimentum, in principio dissimile, faciliè assimilari, indeque apponi, & agglutinari possit.

Chyli in lacteis suppositi substantia tenuis, & aquosa.

Quoad substantiæ modum, nulli dubium, quin, siuè chylus, siuè ros, siuè lymphæ sit id, quod in repertis duëtibus (ex Auctorum ipsorum dictis) moratur, pertenuè sit, fluxile, & aquosum; vt propterea à Bilsio, Glissonio, & Pallierio ipso ad attemperandum cor, & os irrorandum aptum natum esse, statuatur: huiusmodi autem qualitates ad nutriendum partes crassas, duras, solidas, ac tenaces, nisi per multas intermedias alterationes assimilantur, habiles esse, quis rationabiliter dixerit? quæ præterea alterationes non omnes ab ipsa possunt alenda parte provenire, cui sat est, vt ultimam possit ijs dedere manum; Et ideo Natura commodas, & ordinatas iure instituit coctionum officinas ventriculum, secur, venas, cor, ac partes ipsas, vt scilicet pedetentim cibi, potusque alterentur, & excrementis depositis, in substantiam alendæ similem, & eandem convertantur.

Circa

CAPVT DECIMVMQVARTVM. 289

Circa sextum argumentum videre est, chylum vel album, vel pallidum omnino esse, & coloris extremi (album enim, & nigrum sola contraria sunt, cæteri verò colores mediam dispositionem nanciscuntur), & potius morientis animalis, excrementorumq; vel affluentiam, vel excernendorum colori analogum: quomodo ergo Aethiopum cutis, & pupilla nigricans ritè nutriuntur ex eo? cum e contra viuacitas, ac igneitas viuents corporis purpureitatem spirent, vel temperatum ruborem à sanguinis colore manantem præferant, qui facillimè in nigrum quoque nigrorem voluitur, vt in sanguine ipso extracto, & Soli exposito agilis experientia docet.

Nec chyli penuria cum appetitu coincidit, nisi & sanguinis simul penuria subsistat: videre enim est, permulta corpora tum sana, tum ægra, quæ, si sanguine nimis abundant, per dies integros, & plures nonnunquam, sine appetitu, & ieiuni consistunt, in quibus tamen chylum affluere, ex anatome, & ratione nec constat, nec datur.

Pro octauo argumento, cui potissimum inhæret Pallierius, qui super albedine partium ossæarum, neruofarumq; chyli colori congenæ fundatur egregiè, iam supradictum est, albedinem illam, viuente animali, rubedine quadam effulgere, quæ in mortuis pallida magis cernitur. indicium, non ex omnino albo, sed ex aliquo mixto ali. Item facilius est, partes albas rubro, spiritofo, ac vitali nutrirî succo, quàm rubras albo, aquoso, & spiritibus vacuo, prout iam superioribus capitibus ostensum fuit: conueniens autem vniformitati naturæ vniforme quoque alimentum esse, dicitur ad satietatem in sequente capite.

Addatur (quod pro nono, & ultimo argumento contra chylum reputatur) partes solidas vulgo dici spermaticas, eo quia ex semine (quamuis reluctetur ad sanguinis fauorem Aristoteles) potissimum formantur: Sed semen ex sanguine, sicuti, & lac, non autem ex chylis produci, iam supra abundè probatum est: quare rationabile quoque est, non hoc, sed illo easdem ali partes.

CAPVT DECIMVMQVINTVM.

Contraria Pallierij rationes afferuntur.

Contigit autem huic, quod & cæteris Artis dogmatibus multis, quorum paulatim mutatio in omnino aduersam tandem degenerauit credulitatem: Cæpit enim Entius (quod sciam) de huiusmodi multa dubitare subiecto. Accessit Giffsonius, qui seriosius contra sanguinem pugnavit: cum hoc tamen vt adhuc reliquis id iudicandum relinqueret. Ultra postmodum progressus Charletonus non solum sanguinem à solidarum partium enutritione reiecit, eiq; chylum ad cerebrum, & spinalem medullam per sextum per neruorum ascendentem, ac inde per alios neruos ad vniuersas subiectas partes distributum, su-

Chyli color albus, vel pallidus est, & potius emorientium quàm viuentium coloris affinis.

Eiusdem penuria appetitum non excitat, nisi sanguinis penuria concutiat.

Albedo solidarum partium in viuente quoddam rubedine fulget.

Partes spermaticæ ex semine hoc, vtrò ex sanguine gignantur.

brogauit; sed imò iniurijs, derisionibusq; multis temerè in scriptis suis affecit eos, qui pro Veteribus sentientes, huiusmodi suam non amplecterentur sententiam. Hos tamen Antònius Deusingius in suis Opusculis de Sanguinis usu, & de nutritij succi commento nouo Groningæ editis anno 1661. mihiq; ab Excellentissimo Hercule Marchello liberaliter commodatis, adeò solidè, & clarè depreffit, vt alia contra eos repastinatione, vel discussione non sit opus. Sed ecce nouissimis his diebus semimortuam illam opinionem aliquid subleuare visus est iam supra nominatus Paulus Franciscus Pallierius in suo libello de vera Lactis genesi, & usu: in eo enim probare nititur cap. 14. 19., & 21., chylum, non sanguinem partibus exanguius, seu solidis dictis verum alimentum elargiri; in hoc solo à supradictis dissentiens, quod ipse non per neruvs, sed vel per lacteas, vel per sanguineas venas chylum ad partes deferri statuit.

Pallierij opinio de nutritione solidarum partium ex chyl.

Is ideo, quibusdam rationibus præmissis, adeo euentem sibi visus est conclusionem pro suo chylò elicere, vt citra vllum dubium constare, in fine decimi quarti capitis asserat, sanguineis quidem partibus, nempe carni, musculo, cordi, iecori, lieni &c. sanguinem, exanguius verò, ossi, neruo, cerebro, venæ, arteriæ, ligamento, cartilagini &c. chylum præstare alimentum. Eas verò examinare, operæ prætium fuerit, quòd veritas, obiectis nubibus eliminatis, candidior, lucidiorq; appareat; Et quamuis ipse indistinctè, & cumulatè comprobet; nos tamen, vt clariùs ipsis satisfiat, in partes ordinatas suam partiemur probationis seriem.

Prima Pallierij pro chylò ratio.

Præmittit ergo, ex primæua diuersarum partium constitutione, earum vario usu, & diuersa temperie, satis constare, non vnam omnibus esse nutritionis rationem: nam, cum aliæ partes ex sanguine dicantur constitutæ; aliæ verò sint, quæ cum sanguine nullam seruant similitudinem, non videtur consonum, vtræque eodem sanguine ali, si modò à simili nutritio prouenit. Vsus quoque varius variam structuram, & sic variū etiam nutrimentum exposcit, si verum est, nutrimenta actiones prouehere; & in hoc quantam euariant à carne ossa, ab his nerui, & membrorum reliqua, non est, vt in medium (cum cuique hoc pateat) afferatur. Temperies item diuersa diuersum arguit alimentum, si modò orta suis attestantur principijs: Sed quantum hæ partes ab illis, & illæ ab ijs differant, dubium apud quemquam non remanet. Quibus sic stantibus, nullus chylò videtur esse pro exanguium partium alitione aptior succus.

Ratio secunda.

Sed & ex partium alimenti superfluo idem statui posse, videtur: nam vbi cum sanguine nullam illud habet similitudinem, quæ nos ratio cogit, vt sanguine illas ali, existimemus?

Ratio tertia.

Amplius si idem omnibus esset alimentum partibus, opus non foret, vt natura sic multiformiter alimenta elaboraret, ac ijs deducendis sic multiplices, & diuersos instrueret ductus; quemadmodum videmus, chy-

CAPVT DECIMVMQVINTVM. 291

lorehendo chyliſeros, lymphæ lymphaticos, ſicuti & cruori ſanguiferos præſeciſſe canales.

Nec ulla eſſet partium diſtinctio, nulla diuerſitas, ſed vna omnium temperies, vna conformatio, vnus calor, ſi modò vnum daretur omnium alimentum: ſi enim ab vno vnum indicatur, ita & ab vno, quantum in ſe eſt, vnus procedit effectus.

Ratum quoque apud omnes eſt, corporis noſtri partes congeneo alimento nutriri: ergo quæ partes ſanguineæ ſunt, ſanguine, quæ ſpermaticeæ alio ipſis ſymbolo ſucco enutriti, ſtatuumdum; Et quoniam nullus à ſanguine dari poteſt in corpore humor, qui chylo magis ipſi familiaris & ijs partibus ſimilior ſit, hic conſequenter ſolidioribus, ac albis partibus alendis deſtinandus eſt.

Videmus inſuper in Atrophis, ſi chyli deductio intercepta ſit; quamuis partes ſanguine abundant, non nutriri, ſed chylo deſtitutas tabeſcere.

Superfluus etiam ille circuitus eſt, vt ex albo rubrum, & deinde iterum album quid fiat, cum poſſit album perſiſtere.

In eandem ſententiam trahitur Hippocrates, qui *lib. de can. num. 13. & de alim. num. 1.* alimenti facultatem ad partes peruenire, & partibus congeneum apponi alimentum, diſtauit; nullibi autem protulit, ad omnia idem alimentum valere; Qui imò aliquando dixit, ſicuti variorum arbores à terra ſibi ſingulæ ſimilem vel amarum, vel dulcem, vel falſum attrahere ſuccum videntur, ita vnamquæque partem in homine à ventre, qui terræ officio fungitur, quod ſibi magis ſimile eſt, allicere.

Hæcque potiora illa ſunt, quibus innixus Pallierius, ſuam pro chyloſa partium enutritione anno præterito 1663. Genuæ ſententiam publicis literis commendauit.

CAPVT DECIMVMSEXTVM.

Vnicum ſuccum ad totum corpus alendum, non plures requiri, probatur, & ad rationes ſupra poſitas reſpondetur.

VT autem fundatè poſſimus ad contrarias hæſce rationes, pro chylo allatas, reſpondere, & noſtras fulcire validius, ſatius fuerit hic annectere huiusmodi propoſitionem; Naturæ ſcilicet, ritè omnia gubernantis, prudentiæ congruere magis vniſormitatem alimenti communioris, quod poſſit ritè omnibus adaptari membris, quam cuique membro varium pro naturæ ſuæ varietate alimentum deberi. Et ea probabitur tum ratione, tum Naturæ conſuetudine ab exemplis, & ſimilibus petita. Ratione ergo probatur ſic.

Vna eſt natura totum corpus gubernans, vna eſt facultas nutriendi; ergo & vnicum debet eſſe obiectum. Probatur antecedens; quod, ſiue

ossa, siue cartilago, siue caro, siue quid aliud in corpore sit, omnia ab vnica natura, seu forma reguntur; aliter dicendum esset, in homine varias formas, varias naturas reperiri. Ea autem non potest nisi vni-
formiter agere: nam cuiusque naturæ, seu formæ determinata est actio, & determinata facultas, eo tamen modo, quo diuersarum partium in vnum compaginatio postulat; vt scilicet vnaquæq; sibi assimilet, & inde agglutinet alteratum, & à se euictum alimentum. Consequentia est euident, quod vniuscuiusque facultatis, sicuti vna est actio, ita & vnum debet esse obiectum: quod tamen aptum natura sit, vt facillimè a diuersis euincatur partibus, itaut sicuti facultas vna varias partes regit, ita & vnum eius obiectum varijs quoque adaptetur partium temperaturis: Sed si quædam partes chylo, quædam sanguine nutrentur, non vnicum, sed duplex esset nutritiue facultatis obiectum. Et hoc probatur, quia chylus vel propria formalitate differt à sanguine, vt Galtrucchius cum plurimis opinatur; vel potius quid imperfectius est ipso sanguine, cum sit in via ad illum, vt alij sentiunt, arbitantes vnâ-
quantque generalem coctionem procedere, ab imperfectiori ad perfectius, vsquequod forma propria introducatur, itaut per Hos sola fiat in primis coctionibus accidentium correctio. Si dicatur ergo, quid imperfectius chylum esse, & in via ad sanguinem, manifestum, quod antequam nutriat, in sanguinem transibit, & sic nulla pars chylo nutrietur: Si verò dicamus, formaliter differre, partemq; huius non in sanguinem, sed in nutritium rorem à pancreate, alijs glandibus, & alendis partibus verti, prout & à cæteris mutatur sanguis; idem esset, ac si duo fierent nutritiue facultatis obiecta varia, nempe sanguis, & ros ille, quod naturæ, vti diximus, vnitati incongruit.

Altera ratio
ab vnitatē
compaginatio-
nis

Vna etiam est totius hominis, & membrorum omnium compaginatio: siue enim caput, siue collum, siue manus siue pes consideretur, omnia ex iisdem, & eodem plus minusue modo constructa sunt, tantummodò figura dissidentia, vel quantitate, aliouè accidente, prout varius omnium vsus, ac finis: Quare prudentissimè Sanctus Iob dicebat Pelle, & carnibus vestisti me, ossibus & nervis compegisti me; cum ad hæc cunctæ compaginantes referantur partes: nimirum venæ arteriæ, fibræ, tendones, ligamenta, membranæ omnes nervi aræ nature sunt, sicuti, & cartilaginee, vnguesq; ossæ. Ergo vna, & eadem omnium erit nutritio, ex vno nempe eodemq; succo, qui mixtæ naturæ sit, & cunctis similiabus partibus facillè assimilabilis, & qui loco deperditi reponatur si modò viuentis corporis eadem est generandi, vti & restaurandi facultas, sicuti & eadem est conseruandi, & acquirendi in Polliticis norma, & conditio; vtpotè cum ambo iisdem instrumentis, & regulis perficiantur, quamuis die versus finis, & diuersa oculis actio in huiusmodi offeratur non raro.

Tertia ratio
ab vnitatē
cremoris in
quem cum
cibus tum
potus redu-
citur.

Natura etiam frustra vniuersum tum cibum, tum potum in vnicum cremorem alteraret, si postmodum in duplicem succum deberet is diuidi,

di, ac dimidiari; Sic & frustra per plura fieret, quod per pauciora æquè benè fieri potest: At natura nil frustra facit; & sicuti non deest in necessarijs, ita nec superabundat in superfluis.

Talem quoque Naturæ esse in proposito negotio consuetudinem arguunt nonnulla, quæ ex arboribus sumuntur indicia: Vnicum enim succum vnicuique plantæ à terra suggeri, manifestum est, & depræhenditur à qualitate eius, qui in radicibus inuenitur vniformis; Et eo ali constat etero geneas arboris partes omnes iuxta cuiuslibet earum naturam, corticem nempe, ligauum, medullam, frondes, flores, & fructus; Itaut diuersitas in colore non exigat, nec arguat diuersitatem succi, sed is idem per radices attractus in cuiuslibet earum opportunum alimentum euadit. Et quod magis est, ex eodem per truncum attracto succo variæ quoque plantarum naturæ aptè aluntur, vt cognoscitur in arbore supra truncum insita, vel etiam varijs in ramis fructuum varietate fecundata: Hanc enim certum est, eodem, quo prius, succo imbui; & tamen fructus, frondes, ac flores diuersos progignit: Signum ergo, à varietate coloris, ac naturæ partium non argui varietatem succi ad eas alendas requisiti, sed sufficere, vt is in suis qualitatibus non sit omninò dissimilis; quia sic ab earum singula in sui naturam faciliè vertitur. Ita etiam diuersitas coloris partium vniuscuiusque plantæ non arguit diuersitatem naturæ, vel temperamenti, nisi secundum aliquid accidentium magis vel minus intensorum, prout substantiæ modus in duritie, soliditate, & his contrarijs requirit, & magis, vel minus efficaciter operatur: Quare videmus, in qualibet planta, vel arbore eiusdem qualitatis in sapore odore, & virtute alterandi esse radices, frondes, germina, flores, thyrsum, ramos &c., vt quotidie in medicinalibus parandis experimur: itaque nec mirum, si eodem succo aluntur omnia; sicuti autem se habet aliturus succus ad plantam, & eius partes, ita & ad hominem alimentum: Est enim homo planta quædam animata, sola animæ, ac rationalis formæ specie à germinantibus dissidens plantis, vegetatiua verò potentia similis, ac vni-formis: Quare, & in homine vnus succus pro variarum partium, siuè albarum, siuè rubrarum, siuè nigrarum alitione sufficit, & eò magis, quò excellentius vnaquæque superior natura (vt humana est respectu arboreæ) sua inferiore operatur.

Item, sicuti se habet naturalis facultas in vna parte, ita se habet in alia: Sed in ventriculo omnia siuè rubra, siuè alba, siuè viridia &c. in colorem vnicum, & illi similem alterantur, nec habetur respectus, quod albo ventriculo alba sola competant, nec iccori sola rubra: Ergo sic in alijs partibus non à colore partis arguitur alimenti debiti color, sed qualiscunque sit eius, quod ad eam pro alendo peruenit, in alijs similitudinem alteratur, & transit. Probatur autem antecedens; quia omnia naturalia semper eodem instinctu insito, & vniiformiter operantur, & adhuc magis in vno, & eodem subiecto.

Probatur
alentis succi
vniiformitas
à plantarum
enutritione
huiusmodi,

Probatur
etiam ex em-
pio costio-
num ventri-
culi, & icco-
ris.

Tertium
exemplum
ab Aethiope
petitum.

Insuper, si ex diuersitate coloris partium diuersa quoque alentis succi qualitas exposceretur, in Aethiope non duplex, sed triplex requireretur succus: albus scilicet pro ossibus, & neruaceis partibus, ruber pro carne, & parenchymatibus viscerum, niger autem pro cute. Videmus tamen in eo nullum alium vel atrum, vel nigrum succum, præter illum album lactearum, & rubrum sanguinem, qui in cæteris omnibus hominibus conspiciuntur, per peculiare ductus, ac seiunctim in cutem irruere. Et sic constat, ac satis probatum est, non requiri diuersitatem succi alimentosi pro variarum hominis partium enutritione, sed vnicum pro omnibus satis esse.

Respondetur
ad primam
pro chylo ratio-
nem.

His itaque positis additamentis, sat videntur rationes pro sanguine productæ emicare, itaut ad rationes Pallierij pro chylo in præcedenti allatas nunc respondere tempus sit. Ad primam ergo, à diuersitate partium constitutionis petitam dicitur, diuersitatem illam solum in qualitatibus non in formalitate substantiæ, obseruari: ideo, sicuti ab vno semine sanguinis adiumento, omnia corporis membra, quamuis aspectu varia, formantur, ita & vno alimento, è sanguine emanante, eadem omnia nutriri, quid mirum? Nil naturæ inconuenit, ab vnica re plures elici rerum species. Imò hæc Illius summa prudentia est, qui è limo terræ hominem formauit, & ab humo animalia, & germinantia cuncta produxit; qui semini vim genito simile procreandi insinuauit sine scrupulo, aut dubio, quin ex eodem, & ossa, & nerui, & venæ, & arteriæ, & pancreata, & cuncta, quæ in corpore organizant, generentur; cui nec impossibile fuit efficere, vt eodem cibo, (si velit quis) alatur homo, canis, equus, bos, gallina, veruex &c., quæ tantopere inter se non aspectu, magnitudine, & temperamento solum, sed & forma, seu natura differunt tantoperè: Minus ergo mirandum, eodem succo, nempe sanguine, omnes partes, solis qualitatum gradibus dissidentes, enutrir, cum præcipue in illo varij à natura commixti succi alligentur, sanguis nimirum strictè sumptus, pituita, & vtraque bilis. Quin, & eundem succum varijs plantarum generibus (vt inferorum exemplo probauimus) pro alimento inferuire constat: quidni ergo vnus etiam succus varijs eiusdem corporis membris, ab eadem forma rectis, satis erit?

Nec varia partium temperies huic officit positioni: ea siquidem non in alimentum ipsius diuersitatem, sed in a liti naturam referenda est: nam, vt alimentum alat, alitiq; naturam induat, ab eodem debet euinci, ac immutari; & sic eodem alimento tum calidæ, tum frigidæ naturæ (dummodò substantiæ similitudine polleant) commodè aluntur. Nonnè ex eodem floris succo formant varia animantia mel, & venenum? Eodem prorsus terræ succo, si contigua ex semine nascantur, fruuntur lactuca, & petroselinum; allium & acetosa, ruta, & portulaca, quæ contrarijs inter se temperamentis gaudent: Neque enim a diuersitate attracti succi diuersitas simplicium, sed à simplicium diuersitate succi diuersitas generatur. Et sic videmus, eundem panem, eandem escam in homine

homine bilioso biliosum sanguinem, in pituitoso pituitosum generare; nonnegata interim aliqua alimento aliti temperiem aliquatenus immutandi virtute. Nisi dicamus, omnia mixta in se quoque mixta temperamenta continere, & sic ab vno eodemq; succo tūm calidum, tūm frigidum quid elici posse; cui sententiæ, vt Hippocraticæ, non reluctamus: sed, hoc dato, non infringitur vis rationis nostræ, imò ampliatur, confirmaturq; ex sanguine posse varias partes varios elicere succos, cum ipse sit ex quatuor elementis, imò & ex quatuor humoribus compositus, itaut in se calidum, frigidum, humidum, & siccum optimè contineat.

Respondetur ad secundam pro chylo rationem

Ad alteram rationem, ab alimenti superfluo deductam, facilis responsio est, dicendo, diuersam esse naturam euicti alimenti ab adhuc euincendo: vnde sicuti ob chyli albedinem non possumus vini rubri, panis atri, & viridis herbæ mansæ negare, vel albi lactis asserere assumptionem; ita neca superflui lactis, feminis, cambij, vel roris pallore ritè possumus rubri sanguinis pernegare, nec chyli immediatum arguere accessum.

Respondetur ad tertiam

Ad tertiam, à diuersitate ductuum, ac elaborationum multiplicitate deductam, dicimus, alios ductus ad alimenti delationem, alios ad spirituum, vel vitalium, vel animalium, pro vita manutenenda, exercendaquè deportationem, & alios ad excrementorum seiunctionem, excretionemquè optimè à Natura in humano plasmate institutos fuisse: Vnde ab illorum multiplicitate non quidem alimenti deferendi, sed vsuum vtilem multipliciter argui. Sic etiam multas fieri alimentorum elaborationes, & eas quidem necessariò ad hoc, vt res insensibilis, inanimatumq; corpus assumptum transeat in viuientis corporis substantiam, nō bene arguit diuersitatem specierum alimenti adhuc euincendi.

Ad quartam de partium distinctione iam satisfactum, cum diximus, optimè & prudentissimè ex eadem re varias partes, & progigni, & alii, vt varijs quoque ad vitam necessarijs vsibus inseruire; sicuti è terræ vel aque limine cuncta formauit Deus animalia, & ex ipsidem, earumquè succis eadem cuncta gubernat.

Respondetur ad quartam

Ad quintam de succo congenito aptè dicitur, multò magis partibus viuentibus congenitum esse alimentum, quod e chylo in sanguinem versum, ac arterioso sanguine, spiritusq; per arterias anastomoses vndique perfuso desumitur, quàm quod è succo in venulis omnium excrementorum ductui propinquis, & communibus incluso possit expectari: quippe cum ille sit, ex quo semen emanauit, e quo embrio traxit originem, e quo ros, cambium, gluten, omnibus proficua, constat: hic verò rudis adhuc sit materia, & ni sanguinis formam, excrementis sepositis, adipiscatur, ad nutritionem inuicilis.

Respondetur ad quintam

Ad sextam de fame pereuntibus nonnè clara ratio est, tabescere corpus, non ex defectu chyli immediatè, sed ex sanguinis ob illius penuriam adustione, crassitie, & terretate? Nisi enim sanguis determinat

Respondetur ad sextam

tis vicibus instaretur, dissoluitur, vitritur, crassescit, spiritibus orbatur, itaut non solum non sufficiat pro omnibus partibus, sed & ineptus tùm nutritioni, tùm vitalitati reddatur. Videmus autem, pro horum confirmatione, corpus plethoricum diutius fami, & chyli defectui superefse. Alioqui, si illa valeret ratio, ritè quoque diceremus, corporis partes nonnullas immediatè ali pane, vino &c., eo quia, nisi quis cibetur, breuibus interit diebus.

Responde-
tur ad septi-
mam.

Ad importunum circuitum idem, quod supra de lacte, reponimus; gaudere scilicet hisce circuituibus Naturam, & ab his cunctas generationes, & illius mirandas pulchritudines, quæ varietatibus gaudent, provenire; quæ minimum de accidentibus curat, dummodò substantia perficiatur: videmus propterea, sumptum in ventriculo vinum rubicundum albescere, cum tamen successivè in iecinore rubescere iterum debeat, & ad cerebrum, mammaeque delatum rursus candicare cogatur.

Hippocratis
conciliatio.

Ad Hippocratem dicimus, imò ipsius sententiam esse, cuncta nutrire eo succo, qui per venas excurrit et quatuor humoribus conflatus, sicuti, et ossa ipsa; præcipuè autem *cit. lib. de carn. num. 13.* ibi enim hæc habet: Dictum autem à me prius est, quod solæ ex ossibus maxillæ ipsæ, in seipsis venas habent, & ob id alimentum amplius in ipsas, quàm in alia ossa trahitur. Sic etiam *num. 12.* dixerat. In maxilla venæ sunt, & hæc huic ossi soli inter omnia ossa, ex inferno ventre alimentum præbent. Vbi etiam, venas e ventre tenuissimum trahere, asseruit. Ipsum autem non alias agnouisse venas, quàm, quarum radicatio iecur est, vel arterias, quarum radicatio in Corde, manifestè dixit *lib. de alim. num. 7.* ubi per eas sanguinem, ac spiritum in totum corpus migrare, dixit. Quemadmodum & *lib. de off. nat. num. 13.* alimentum in corpus à ventre distribui per venas edocuit. Qui, si aliquando asseueravit, alimentum partibus congenium deberi, nullibi tamen aperuit, id de chylo edixisse, sed benè vnamquamque partium ad se allicere per venas, quod sibi magis simile est; prout & in responsione ad primum argumentum dictum fuit.

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

Non malè, imò rectius per vetera, quàm per nova dogmata multa enucleantur arcana Naturæ.

Reliquum nunc est, ut quædam, quæ corollarij vice sunt, hic addantur: Neque enim in adhucque disputatis consistit ob dicta inuenta vasa tùm lactea, tùm lymphatica confictarum ab his Auctoribus positionum numerus: sed quasi solaris hinc lux Medico ruluxerit Orbis, præter hucusque agitaras disceptationes, multa, quæ alijs difficillima cognitu videbantur, faciliè harum adinventionum medio nunc cognosciorumque causam tradi posse, ostendunt: quotum tamen non minus, imò

Imò magis erat facile verisimiles assignare causas iuxta vetera dogmata, quàm iuxta eorum noua. Age, experiamur.

Dicunt ergo, mediantibus his nouis ductibus, sciri, quomodo tam citò ex cibo, vinoq; ac alijs cordialibus assumptis, refocillantur vires; cur ex immodico cibo, vel potu pulsum inæqualitates, ex cruditateq; synopes obuenant; qua de causa tam citò corriuentur ad lotium nimij potus, itaut res ebibitæ eadem, qua antea, qualitate imbutæ, meiantur; quomodo ad mammas, ac ad vrinam pili poti, aut alia, quæ historiæ referunt, aliquando per ipsas exiisse, deducantur: Omnia enim hæc, & alia inferius afferenda, inquirunt, per lacteas inuentas venas faciliè posse conspici, dignosci, & enucleari.

Ego verò non minus, imò veriùs, & faciliùs per Antiquorum dogmata eadem dubia posse dissolui, contendo: Etenim, dum scire volumus, quomodo ex assumptione cibi, ac potissimum vini, & cordialium statim refocillantur vires fatiscentes, considerare debemus, quod vel vires patiebantur ex sola spirituum subita dissolutione, vel ex defectu solidioris, ac adæquati alimenti; illud quidem in breui inedia, ventriculi mordicatione, aut aliquotùm animi, tum corporis inopinato tristi sensu; hoc verò ob magnas sequutas vacationes, alimenti longam subtractionem, vel prauitatem, nimios labores, & importunas ægritudines. Ad primum defectum sola spirituum instaurantia, lenientia, vel tristitia soluentia sunt satis, & ideo breuissima via id consequi non raro licet. Ad secundum verò, cum continentium, contentorum, & impetum facientium refocillationes requirantur, non sic citò, nec sic subito datur instauratio. Ad primum ergo sine his nouiter inuentis vijs aptissimè, ac citissimè posse per os assumptis ferri subsidium, hæc consideranti patebit; quod scilicet spiritus instaurant, quæ spirituosa sunt, & halituum instar ad Cor, cerebrumquæ, in quibus vitales, animalesq; spiritus fabrefiunt, ascendere quàm celerrimè valent. Huic autem halitui via præbetur latissima per gulam recta ad fauces, & ab his per manifestos meatus ad cerebrum pergit; Ad Cor verò per eandem viam, quæ Aortæ, & Cauæ contigua per varias inconspicuas arteriarum, & venularum anastomoses cordi facillimè communicat, & melius lacteis venulis, quæ retrò ad tubum thoracicum propè spinam abeuntes, in axillares venas insinuantur, sicq; longius, & minus cordi communicans iter ostendunt. Tollitur autem dissolutio, si ex ore ventriculi patiente, & mordicato oriatur, immediato tum cibo, tum potu assumptis, qui & morsum temperent, & ventriculo voluptatem suis instaurantibus, & lenientibus qualitatibus inducant, & acres eluant succos: Si verò in animo tristitia subsit, fugatur halitibus tum vini, quod cor exhilarare, etiam sacræ literæ testantur, tum cordialium, quæ sympathica spiritali symetria operantur, quibus supradictus patet aditus. Quæ autem viget in corpore, anodinis vel intus, vel extra adhibitis lenitur. Neque mirum, sic citò in talibus refici vires assumptis, cum & per simplicem odoratum alen-

*Vires vel off
spirituum,
vel ex ali-
menti defe-
ctu patiun-
tur.*

*Cuius ad spi-
rituum de-
fectum citis-
simè per os
assumptio
succurrat.*

tium, & olentium hoc fieri, tradat Hippocrates *lib. de alim. anno 11.*, & & in dies experiamur in lypothimis, per vini, ac aceti osculum profrigidandis.

Altera viris
imbecillitas
citius per vi-
as veteres,
quàm per
novas emen-
datur.

Ad alteram verò virium imbecillitatem requiritur ipsius alimenti non sola assumptio, sed & concoctio, ad cor, & totum corpus deductio, eiusque congrua agglutinatio, quæ citra temporis intercapedinem promoveri non possunt: Sed citius quidem, & per breviorē viam deductio ad hepar, Cor, & totum corpus fiet per oscula ventriculi, quæ & Portæ ramulis in ventriculum, vel intestina inhiant, quàm si per os, nam chylum in intestina primò, deinde in glandulas, & Receptaculum, inde in lacteas thoracicas, post in axillares venas abire, & exinde ad Cor circulantis sanguinis ope coquendus retrogrèdiatur, ac inde idem ad hepar colandus incedat: Siquidem, si viam metiamur, longior, & minus comunicabilis hæc longè erit, quàm illa: Agglutinatio autem, & securius & citius quidem fiet è probè cocto, ac laudabili sanguine, quàm ex imbecillo, seroso, frigidoq; chylo, & abundanter in antecedentibus probatum extat. Adde, quod, sicut tristanti, famescentiq; æsophago totum corpus comparitur, viresq; enervantur; ita ipsi epulanti, ac in lætis epulis voluptuari omnia congaudent, atque assurgunt membra: voluptuatur autem appetens ventriculus moderatò tum cibo, tum potu assumpto. Ergo quovis modo vires instaurare sit opus, citius, ac melius per veteres, quàm per novæ inventas vias assequimur.

Cur cibo nimio assumpto, pulsus inæqualis fiat, & aliquando syn-
copes, a liquando mors inopinata succedat, quàm inuenter Artis docu-
menta facerent; quandoquidem promptius de hoc reddere rationem
imò via antiqua datur, quàm novissima: Neque enim ad hosce casus
quicquam chyli ad lacteas traductio facit, cum non statim, assumpto
cibo, chylus infumatur in ipsas; sed vel post descensum ad intestina,
vel si per æsophagi lacteum ramulum (quantis nec hic à Bartholino
potius lacteus, quam lymphaticus autumetur), non ante coctionem
ventriculi saltem imperfectam: Dato autem, quod infumeretur statim,
non eo furore, copiq; infumi posset, quæ valeret Cor obstruere, tum
quia dictus ramulus vix visibilis, tum quia in thoracicum tubulum, à
Corde seiunctum, abire, tum quia impelleretur in ipsum solum id, quod
possit recipi, aut attrahet ipse tantundem; à quo cum paululum sit, &
in tubulis à Corde non manantibus, nil timentum. Iam verò dictum
est, patentiorē esse viam ab Antiquis monstratam, quàm quæ noviter
indicata est, siue à stomaco, siue ab æsophago, siue ab intestinis ponatur
chylus irruere.

Ad ea non
facit chyli
in lacteas
eductio.

Dictorum
symptomatum
& necis ve-
ritates causæ.

Atuerò ad hanc causam reducenda non est dictorum symptomatum, siue necis aggressio, sed benè ad ventriculi tensionem nimiam, quæ, septum dilatari, prohibet, & Aortam premit; præterquam quod si in gulam, vel statum copia eleuetur, vel cibi humiditas regurgitet, potest & asperam

asperam arteriam comprimere, & pulmones constringere, & Cor per meatus tum patentes, tum inuisibiles obruere, & offuscare. Adde etiam, à nimia copia, vel frigidiore assumptorum, calorem ventriculi nauium vel suffocari, vel etiam extingui posse: ubi verò in una parte extinguitur, statim omnes alias in consensum trahi, si inter celebres illa sit, & Cordi propinqua, ut est ventriculus. Nec inter causas huiusmodi infimum locum tenet oris ventriculi summa sensibilitas, propter quam sicuti in cruditatibus, quæ ipsum affligunt, lypothimias enasci, & aliquando mortem ex maximo consensu cum Corde, ac cerebro per arterias, ac nervos, conspiciamus: ita & in ingurgitatorum copia similia aduenire, non est mirandum.

Et quamvis quis semel scripserit, in mortuo Viro circa cor inuentum esse concretum sanguinem multum, non ideo dicendum est, id euenisse ob crassitudinem inductam sanguini ex carentia subtilioris chyli ob lactearum obstructionem enata: sed imò vel ob frigiditatem ab inuincibili succo inductam, ut de argento viuo largius assumpto testatur *Matthiol. in 6. lib. Dioscorid. cap. 28.*, vel ob torrefactionem ab animi ingenti calore, seu inedia longa, productam hoc euenisse, dicendum est.

Cur in mortuo inuentus sit circa Cor concretus sanguis.

Neque minus imbecilla est assertio, ex lactearum inuentione patere viam, qua siccitò ab ingurgitato nimio potu per urinam exbrigentur bibacissimi potatores, & qui diabete laborant, si ea sam dederimus sufficientem, absque quod ad nouas has vias recurramus. Abnuat Bartholinus, cui ferè impossibile videtur, dictum potum sic festinanter per aliam viam pertransire, quia deberet, ut ait ipse, per hepar, cor, & arterias emulgentes, ad renes deferri, quod nec sic citò, nec sic inalteratè, ut videmus quandoque fieri posset: Sed mirari desinat: nam famosi hi potatores, & qui diabetici sunt, iecore, ac renibus calidissimi sunt, itaut pro sui refrigerio non solum potum attrahant, sed & velocissimè furentur, ac rapiantur, iecur quidem per venas stomacho insinuat, ac intro hiantes; renes verò tum per venas emulgentes à Caua, & iecore, tum ab intestinis ipsis, & mesenterio contiguas, per alios cæcos ductus, & per continuitatem substantiæ, per quam quælibet pars ab altera vicina, & attrahit, & acceptat humores: nulle enim nexibus partes partibus contiguas, venæ venis, arteriæ arterijs conspirant, & annectuntur ubique. Neque opus est pro mictu, ut serum totum ad Cor perueniat; sed iecur cum sanguine prætergressum, facillimè per emulgentes venas ad renes diducitur, & sic non longior hæc via est, quàm alia, quæ supponit, potum à ventriculo ad intestina descendere, ubi his in lacteas, à lacteis in Receptaculum, & hinc ad renes. Sed præterea hi illi forsan meatuli sunt, quos inuisibiles Antiqui nuncupabant.

Cur & quomodo diabetici & bibacissimi sic citò potum mingant.

Quod autem à iecoris gibba citra cordis iter possit, ac soleat serofitas per Cauam, & emulgentes venas ad renes deuenire, nouum non est, sed vtitissimum, ac vetustissimum; & hæc causa est, cur, gibba iecoris affecta, Galenus, cum cæteris Practicantibus laudet in declinatione

phlegmones diuretica, sicuti, Caua parte læsa, per aluum purgantia; Huncq; venarum emulgentium esse vsum, hancq; renum propriam actionem attractricem, itaut facillimè serum à Caua in ijs eximijs portatoribus separent, idem tradit *Gal. lib. 4. de vsu part. cap. 13.* Et propterea ren dexter sinistro sublimior, & in plurimis iecur contingens, à natura constitutus est, vt idem testatur *lib. 5. de vsu part. cap. 5.* quicquid è contra doceant cum eodem Bartholino ceteri Circulationis amatores, omnia vetera naucentes, ac inuertes, qui putant, emulgentes venas, pro referendo ad Cor renum sanguine inferuire: quorum tamen ratio in fallacissimis experimentis consistit: quid enim referent, si quicquid ab arterijs deportatur (si vera sint Circulantium supposita) pro ipsi alendis renibus, & pro sanguine à fero depurando per Vteres, vix sufficit? quomodo insumetur in venas, si in vrinarios meatus sese exonerant? Apage ergo has nouitates, & renum traditioni stetur cum Veteribus; tùm si quæ lacteæ, vel lymphaticæ huc pertingant, sint vel venarum ipsarum propagines, vel ex cæcis ductibus, vbique apud Ipsos admissis.

Nec meliùs soluet Bartholinus suis his Venis albis eos per mammarum papillas, & per vesicam exitus pilorum, surculorum, acuum, muscarum, & aliorum, qui in mirandis Auctorum historijs canuntur, quàm facient veteres hucusque alij Doctores: nam, si conferantur viæ hæ nouæ cum veteribus, ex eiusmet ore intelligemus, non minus, imò multò magis exiles, & inconspicuas esse lacteas venas, quæ in glandulas lumbarès, & ab his in renes, quàm quæ è meseraicis in iecur, & ab eo in emulgentes sanguiferæ feruntur. Sed quod omnem tollit lapidem, illud est, quod sæpè multa miranda canuntur, quæ non esse credenda, duxerim; cuius generis esse, puto, quæ ex varijs Auctoribus narrantur per miætum aliquando exiisse, vt sunt radices apij, muscæ, fungi, anisi &c.: facilis enim potest in similibus fieri cernenti Medico impostura, vel à casu, vel à scurris; in matulam scilicet ante miætum, vel post similia proijciendo, vt Medicum ad diuinationem causæ perducant, & irri-sionem; quæ postmodum à corde leuibus credita, scriptis pro mirabilibus mandantur.

De pilis quoque per vrinam excretis in magna copia, quomodo putare quis potest, huiusmodi per potum, vel cibum ab homine esse assumpta? Si vnicus pilus esset, credi posset, per inadvertentiam deglutiri; Sed de multis, ridiculum est hoc putare: quare statuendum est de huiusmodi pilorum quantitate, si excernantur, vel non esse veros pilos, sed quamdam eorum similitudinem æmulari, ab humoribusq; adustis, vt Auctores fideliter tradunt, gigni; vel ex aliquo supernaturali affectu, nimirum maleficio, prouenire, sicuti nonnunquam, & clauos, & pilos, & alia per vomitum excerni, ab Exorcizantibus fertur.

Similis ex parte habenda sententia est de ijs, quæ per mammæ excerni quandoque, literis aliqui tradidere: Etenim vel credulo Medico talia è mammis

Auctoris opinio circa
ea, quæ
vris reſide
re nonnulli
Attingunt.

Quid de pi-
lis per vrinā
excretis sen-
tietur.

è mammis emanasse, persuasum fuisse, vel si verè emanarunt (quod mihi tamen adhuc videre non contigit, sicuti nec in urinis), non eadem verè, quæ deglutita fuerint, sed quid ijs simile in mammis ipsis a natura ludente genitum eo modo, quo tophos, lapides, neruulos, pilos, ac similia nonnunquam in varijs corporis partibus gigni, non ambigitur, statuendum est. Quippè, præterquàm quod rarò, putandum est, pilos, herbarumq; surculos inconcisos deglutiri, hoc etiam dato, incredibile mihi videtur, posse ad mammas similia corpora perducì: siue enim per attractionem, (vti tenendum est), siue per impulsum, aut compressiōnem, vt vult Pecquetus, chyli perductio fiat, nunquam arbitrari licet posse dicta corpora in venas infumi, tùm propter attrahentis facultatis naturam, quæ non nisi similia, ac familiaria exsugit, cæteris relictis, tùm propter osculorum (quæcunque vel lactea, vel mearica sint) exiguïtatem, quæ non nisi liquida, ac tenuia admittunt; Et sic commentatur Vesalius similem Aristotelis pronunciationem de mammarum pilo, vt putat, per potum, vel cibum deglutito *lib. 7. de hist. ani. cap. 11.* (in quo potius vulgarem opinionem, quàm rationem, ac experientiam propriam videtur insequutus); scribens *lib. 5. de corp. hum. faber. cap. 18.* nò esse credendum per tot venarum ambages tale corpus ad mammas peruenire posse, cum alioqui non sit irrationabile, sicuti, & in renibus, & urinarijs meatibus, ita & in mammis posse pilos enasci, & inde egredi. Ait enim *Hipp. lib. de gland. num. 2.* Vbi glandulæ sunt, ibi & pilos enasci, colligentes id, quod in extremitates redundat, & efferuescit. Quæ verba, etsi propriè de externis pilis audiantur, quid vetat eadem concurrente causa, in internis quoque eosdem procreari?

Eiusdem census omnia alia problemata à Bartholino, his asis lacteis mediantibus soluta, benè consideranti videbuntur, cur scilicet diuretica ebibita nonnunquam proprium suum odorem in mictu conferuent (quod & de allio, & de alijs olidis edulij testatur Hippocr. *lib. 4. de morb. num. 32.*) & cur tam citò post frigidum potum aliquando hydrops, seu ventris ingens tumefactio succedat: Illud enim non ob breuiorem viam inuentam (quæ talis non est, vt visum supra); Sed ob vim à remedio, ciboq; naturæ illatam, propter quam inalteratum remansit, & ad exitum, quicquid assumptum est, citò perductum fuit; hoc verò nò ob serum in peritoneo imbibitum simpliciter, ex quo parua procul dubio fieret ventris eleuatio; Sed potius ob flatum multum à calore nativo imbecillitato eleuatum, qui in omnibus ventris cavitatibus occlusus, nullumq; inueniens exitum, aluum distendit, ac tumefacit. Et huius demonstratiua ratio est, quod, si a simplici potata substantia tumefactio produceretur, cum solum ad sesqui libram, verbi gratia, aqua deglutita sit non magis eleuaretur venter, quam sit aqua ebibita moies, quæ abdominis cavitatum respectu minima est; videmus autem ad triplum & quadruplum aliquando augeri, & sic etiam quandoque breuissimè solis calefacientibus, ac discutientibus adhibitis remedijs, citra manifestam vacuationem

Eiusdem opinio de ijs quæ per mammas quandoque exiisse, scripserit alij, qui.

Cur quandoque per urinam cum proprio odore excreantur.

Cur aliquando aqua ebibita, statim venter intumescat.

vacuationem detumescere. Quod si sustineatur, à solo sero (ut in vera Ascite) fieri tumefactionem, nulla patentior via per lacteas, quam per alias venas, vel præferetur; dum inter peritoneum, & intestina aqua præter naturæ consuetudinem colligitur, quod per præternaturalē quoque exitum potius, quam per naturales ductus eructatur.

Quid de vrinæ lacteis di-
scendum.

Sed nec magis nunc apparet, cur aliquando visæ fuerint vrinæ lacteæ, quam alias: neque enim melius putabitur id evenire ob lacteas venas, succum suum copiosius effundentes ob obstructionem aliquam in renes, quam vel ex iccoris imbecillitate, quæ immutatum chylum ad emulgentes perducit sinis, (& hoc non nisi in pessimis morbis videbitur); vel in fæminis à lacteo succo à mammis ad uterum demandato, qui inde cum vrina exeat. Sed &, quod melius dicitur, huiusmodi vrinæ non chylum propriè, sed potius crudum succum, in malis habitibus acervatum, aut alba menstrua in fæminis, muliebri fluxu laborantibus, aut crassi, incoctiq; spermatis in gallica lue involuntarium proventum arguunt.

Quid de se-
ro lacteo in
phlebotomi-
is extracto
sentien.

Sic prorsus etiam solui potest exitus albi, & ferè lactei seri in sanguine per phlebotomiam extracto raro adinuenti, quod quidem non ex diducto per lacteas chylo produci, à nobis creditur; sed potius ex pituitoso succo in improspere coctionibus cum sanguine in venis coactuat; sicuti & ipsemet postmodum Bartholinus in alio lib. defens. proficitur.

Nonnulla
pro lactea
Diui Pauli
decollati ef-
fusione di-
scuntur.

Quare non nisi per quandam hæresim hic Auctor lib. de lact. thorac. cap. 13. illud miraculum in Diui Pauli decollatione visum, nimirum lactis ex iugulatione profluuium, in dictas lacteas thoracicas, chylum propriè iugulares venas effundentes, retorsit: cum omnino id naturaliter sit impossibile: quia, etiamsi, ut ipse ait, non nihil chyli per angustissima foraminula in axillares venas duceretur, manifestum est, statim à sanguinis in ijs commorantibus rubore tinctum, ac à copiosiore illo euidum iri. Tantoq; magis contra euincitur, quod ipse cap. 12. prius dixerat, ad venas iugulares chylum nullo modo posse ascendere ob quasdam valvulas, quæ tale iter ad superiora impediunt, sicuti & idem alibi confirmavit; venas autem subclavias, seu axillares, in quas chylum à thoracica lactea effundi, ipse, & Pecquetus astruunt, infra collum esse, & propriè claviculas, manifestum est. Sicq; in decollatione nec poterat naturaliter chylus exire, nec vnquam id accidisse in rerum natura, nisi ex miraculo, (in Sanctæ Catharinæ quoque decollatione viso), credo, cuilibet historias profanas decollatorum relegenti constare. Sed & leuitas causæ à dicto Bartholino adductæ pater ex eo, quod dixit, facile in Viro defatigato, imbecillo, & in carceribus detento id potuisse accidere; cum e contra hæ causæ potius lacti gignendo (ut quod nutrimenti vbertas est), obstant: aliud enim est serosum, albumq; exire sanguinem, aliud lacteum pro cruore succum effundi.

Hiscæ exemplis facile cuique est cæteras omnes soluere ambiguitates,

CAPVT DECIMVMSEPTIMVM. 303

tes, quas per hæc inuenta vascula, & per introductam circulationem tollere iactant Inuentores, quas lubens prætereo, ne tempus frustra conteram, & quia tantum non daturotium: facturus tamen, ubi ansa aliunde detur, aut necessitas cogat. Nunc vero hic pedem sisto, & fatiscenti calamo anchoram pono.

Tu interim, benignissime Lector, si quicquam tibi senseris hosce meos arridere conceptus, ne putes Operæ meæ, sed proprio nostrorum Ve rerum honori hoc esse adscribendum. Quippè is sum, qui sac laudis ex eo mihi euenturum spero, quod nostros semper habuerim in honore magistros, à quibus non secus. ac à Matribus lac, omnis nostra virtus, omnis scientia, & ars dimanarunt. Sin forsan tibi hæc mea scripta ob vetustatem subiecti, & contentorum assuetudinem mucida, & nauseosa videbuntur, meos tamen saltèm nouos non aspernere labores.

FINIS.



1776
The following is a list of the names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Council.
The names are arranged in alphabetical order.
The names of the persons who have been admitted to the membership of the Society since the last meeting of the Council are as follows:
[Illegible text]

MEMBERS

[Illegible text]











